

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Hextril® 1 mg/ml mondspoeling

hexetidine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Hextril en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Hextril en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Wegens zijn werking gericht tegen bacteriën en schimmels is Hextril aangewezen:

- Als ontsmettingsmiddel van de mondholte (voor kortdurende toepassing).
- Ter voorkoming van infectie na het trekken van tanden en kiezen.
- Bij ontstekingen van het mondslijmvlies, tandvlees en de tong.

De werking houdt in veel gevallen 10 tot 12 uur aan.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- Bij kinderen jonger dan 3 jaar, want Hextril bevat menthol.
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Niet langer dan 14 dagen of veelvuldig gebruiken zonder uw (tand)arts te raadplegen.

Na het spoelen niet inslikken.

Kinderen

Niet toedienen aan kinderen die nog niet kunnen gorgelen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Hextril nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing. Hextril wordt best gebruikt na het tandenpoetsen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hextril heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hextril bevat azorubine

Hextril bevat de kleurstof azorubine (E122). Deze kan allergische reacties veroorzaken.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is:

Onverdund gebruiken met behulp van bijgeleverde maatbeker. 's Ochtends en 's avonds gedurende een halve minuut de mond spoelen met 15 ml **onverdunde** Hextril®.

De oplossing niet inslikken maar uitspuwen na gebruik

Het spoelen dient te geschieden na het ontbijt en na de avondmaaltijd, waarbij voor het spoelen eerst tanden en tandvlees geborsteld moeten worden.

Gebruik bij kinderen

Kinderen van 3 jaar tot 12 jaar mogen Hextril enkel gebruiken na advies van een arts. De mondspoeling maximaal 3 maal per dag aanbrengen met een wattenstaafje aangezien de slik reflex nog niet volledig ontwikkeld is.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Inslikken van grote hoeveelheden leidt tot braken. Indien niet spontaan wordt gebraakt, dient de patiënt te drinken en geactiveerde kool (Norit) in te nemen. Waarschuw bij overdosering altijd uw arts.

Een acute alcoholvergiftiging is zeer onwaarschijnlijk. Het is echter theoretisch mogelijk dat het inslikken van voldoende grote hoeveelheden van dit medicijn bij een klein kind kan leiden tot symptomen van alcoholvergiftiging.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Geen bijzonderheden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Volgende bijwerkingen worden zeer zelden waargenomen:

- Overgevoeligheid
- Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong)
- Ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
- Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten)
- Verminderde smaakfunctie
- Verstoring van de smaakfunctie
- Hoest
- Kortademigheid
- Droge mond
- Slikstoornissen
- Misselijkheid
- Braken
- Vergroting van de speekselklier
- Irritatie van de mond- en keelslijmvliezen
- Waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen in de mond zonder dat daar aanleiding voor is (orale paresthesie)
- Verkleuring van de tong
- Verkleuring van de tanden
- Ontsteking, aften en zweren.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl).

Door bijwerkingen te melden, help u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaren beneden 30°C en tegen het licht beschermen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is hexetidine, in een hoeveelheid van 1 mg/ml.

De andere stoffen in dit medicijn zijn: polysorbaat 60 – ethanol 96 % - citroenzuur monohydraat – natriumsaccharine – eucalyptusolie – levomenthol – natriumcalciumedetaat – natriumhydroxide – azorubine (E 122) – gezuiverd water.

Hoe ziet Hextril eruit en wat zit er in een verpakking

Hextril is een mondspoeling, een heldere rode vloeistof met muntsmaak, en bestaat als glazen fles van 200 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikantVergunninghouder

Johnson&Johnson Consumer B.V.
Stadsplateau 27-29
3521 AZ Utrecht

Fabrikant

Delpharm Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans, Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 06512

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2023.

V8.0_b7.0