

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tetrabenazine SUN 12,5 mg tabletten Tetrabenazine SUN 25 mg tabletten

tetrabenazine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Tetrabenazine SUN en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TETRABENAZINE SUN EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN GEBRUIKT?

Dit medicijn is een medicijn dat behoort tot de groep medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van centraal zenuwstelselaandoeningen.

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van aandoeningen die krampachtige, onregelmatige, ongecontroleerde bewegingen (hyperkinetische bewegingsstoornissen bij de ziekte van Huntington) veroorzaken.

2. WANNEER MAG U DIT MEDICIJN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U gebruikt reserpine (een medicijn voor de behandeling van hoge bloeddruk en psychotische aandoeningen).
- U gebruikt MAO-remmers (medicijnen voor de behandeling van depressie).
- U heeft de diagnose parkinsonisme en hypokinetisch rigide syndroom gekregen. De symptomen van parkinsonisme zijn trillende handen en trekkende bewegingen van armen en benen.
- U heeft een depressie en dit is niet behandeld of is moeilijk te behandelen.
- U bent suïcidaal (heeft zelfmoordneigingen).
- U geeft borstvoeding.
- U heeft een leveraandoening.
- U heeft een feochromocytoom (een tumor van de bijnier).
- U heeft prolactine-afhankelijke tumoren, bijvoorbeeld tumoren van de hypofyse of borstkanker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt

- als u een langzame tot middelmatige metabolisatie (omzetting in de stofwisseling) van het enzym CYP2D6 heeft; dan kan een andere dosis op u van toepassing zijn
- als u een hartaandoening heeft die bekend staat als het lange-QT-syndroom of als u hartritmestoornissen heeft of heeft gehad
- als u onlangs last heeft gehad van pijn op de borst of een hartaandoening
- als u ooit last heeft gehad van trillingen in uw handen en trekkende bewegingen van armen en benen, bekend als parkinsonisme. Als u psychische problemen krijgt zoals verwardheid of hallucinaties, of als zich bij u stijfheid in de spieren en een verhoogde temperatuur voordoen, kan het zijn dat zich bij u een aandoening ontwikkelt die het Maligne Neuroleptisch Syndroom heet. Als u deze symptomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts
- als bij u de diagnose depressie is gesteld, of als u weleens zelfmoordgedachten heeft of een zelfmoordpoging heeft gedaan
- als u ooit een depressie heeft gehad
- als u de neiging krijgt tot boos of agressief gedrag
- als u moeite heeft om rustig te blijven en stil te zitten
- als u een gevoel van slaperigheid of sufheid krijgt
- als u bij opstaan plotseling duizelig of licht in het hoofd wordt
Een plotselinge daling van de bloeddruk kan onder bepaalde omstandigheden optreden bij mensen die tetrabenazine gebruiken (bijvoorbeeld bij opstaan uit een liggende houding). Vertel het uw arts als u een lage bloeddruk heeft (dit gaat vaak gepaard met duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen of flauwvallen).
- als u lijdt aan hyperprolactinemie (verhoogde bloedspiegels van het hormoon prolactine – het hormoon dat zorgt voor melkproductie in de borsten)
- als u slikproblemen krijgt
- als u reageert met draaiende, wormachtige bewegingen van uw tong of andere ongecontroleerde bewegingen van de mond, tong, wangen of kaken, die zich kunnen uitbreiden naar de armen en benen (tardieve dyskinesie)
- als u mentale veranderingen ondergaat zoals verwardheid of hallucinaties (waarnemingen (zien, horen, ruiken, voelen) van dingen die er niet zijn), of als zich bij u stijfheid in de spieren en een verhoogde temperatuur voordoen; het kan dan zijn dat zich bij u een aandoening ontwikkelt die het Maligne Neuroleptisch Syndroom heet. Als u deze symptomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
- als u problemen heeft met het verteren van bepaalde suikers, zoals galactose.

Omdat tetrabenazine of haar metaboliëten zich binden aan melanine bevattende weefsels, zou tetrabenazine zich na verloop van tijd kunnen ophopen in deze weefsels. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat tetrabenazine bij langdurig gebruik schade toebrengt aan deze weefsels. Alhoewel er geen specifieke aanbevelingen zijn voor periodieke oogcontrole, dienen voorschrijvers van tetrabenazine rekening te houden met de mogelijkheid van effecten op het oog na langdurige blootstelling.

Geen klinisch relevante veranderingen in labparameters zijn gemeld tijdens studies met tetrabenazine. In gecontroleerde klinische studies veroorzaakte tetrabenazine een kleine gemiddelde toename in ALT en AST labwaarden in vergelijking met placebo.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Tetrabenazine SUN nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Tetrabenazine SUN niet samen met reserpine.

De behandeling met MAO-remmers (medicijnen voor de behandeling van depressie) dient 14 dagen voor de start van de behandeling met dit medicijn te worden gestopt, en MAO remmers dienen niet te worden gebruikt tot minimaal 14 dagen na beëindiging van de behandeling met dit medicijn.

Vertel het uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gaat gebruiken naast

- levodopa (een medicijn voor de behandeling van de ziekte van Parkinson)
- bepaalde soorten antidepressiva (medicijnen tegen onder andere een depressieve stemming), opioïden (groep van sterke pijnstillende medicijnen), bètablokkers (medicijnen die worden gebruikt bij de behandeling van hart- en vaatandoeningen), antihypertensiva (medicijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk), hypnotica en antipsychotica (medicijnen voor de behandeling van psychotische stoornissen)
- zogenaamde CYP2D6-remmers (bijvoorbeeld fluoxetine, paroxetine, duloxetine, terbinafine, moclobemide, kinidine, amiodarone of sertraline). Gelijktijdig gebruik van deze medicijnen en tetrabenazine kunnen tot verhoogde plasmaconcentraties van de actieve metaboliet dihydrotetrabenazine leiden. Voorzichtigheid is daarom geboden wanneer deze medicijnen gecombineerd worden met tetrabenazine. Het kan noodzakelijk zijn de dosering van tetrabenazine te verlagen.
- medicijnen die erom bekend staan het hartritme te verstoren (het zogenaamde QTc-interval op een ECG te verlengen), inclusief sommige medicijnen die worden gebruikt om psychische aandoeningen te behandelen (antipsychotica), bepaalde antibiotica (bijvoorbeeld gatifloxacine, moxifloxacine) en sommige medicijnen die worden gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen (bijvoorbeeld kinidine, procaïnamide, amiodaron, sotalol).

Waarop moet u letten met alcohol?

Het drinken van alcohol in combinatie met het gebruik van dit medicijn kan leiden tot abnormale slaperigheid.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat uw dit medicijn gebruikt.

Uw arts beslist na alle risico's en voordelen tegen elkaar afgewogen te hebben, of dit medicijn gebruikt mag worden tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn mag niet gebruikt worden door moeders die borstvoeding geven. Wanneer behandeling met tetrabenazine noodzakelijk is moet de borstvoeding worden gestopt.

In dierstudies met tetrabenazine werden geen effecten waargenomen op zwangerschap of op in utero overleving. De cyclusduur bij vrouwtjesdieren was verlengd en een uitstel van de vruchtbaarheid werd waargenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn kan slaperigheid veroorzaken en daardoor invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Tetrabenazine SUN bevat lactose

Dit medicijn bevat lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit medicijn gebruikt.

Tetrabenazine SUN bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. HOE NEEMT U DIT MEDICIJN IN?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij volwassenen

De geadviseerde startdoserings is 12,5 mg een- tot driemaal daags. De dosering kan indien nodig elke drie of vier dagen verhoogd worden met 12,5 mg, afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling.

De maximale dagelijkse dosering is acht 25 mg tabletten of zestien 12,5 mg tabletten (een totaal van 200 mg).

Als u de maximumdoserings gedurende een periode van zeven dagen heeft ingenomen en uw toestand is niet verbeterd, is het onwaarschijnlijk dat verdere behandeling met het medicijn zinvol is voor u.

Slik de tablet(ten) met water of een andere niet-alcoholische drank.

Gebruik bij ouderen

De standaarddoserings werd toegediend bij ouderen zonder dat duidelijke bijwerkingen werden gezien. Parkinsonachtige effecten komen echter vaak voor bij deze patiënten.

Gebruik bij kinderen

Gebruik bij kinderen wordt niet aanbevolen.

Gebruik bij patiënten met een leveraandoening

Patiënten met een milde tot matige leveraandoening dienen de behandeling te starten met 12,5 mg per dag. Patiënten met een ernstige leveraandoening moeten extra voorzichtig zijn.

Gebruik bij patiënten met een nieraandoening

Gebruik van dit medicijn wordt niet aanbevolen bij deze patiëntengroep.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Als u teveel tabletten heeft ingenomen of iemand anders uw medicijn per ongeluk heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Symptomen van overdosering zijn: oncontroleerbare spiertrekkingen van ogen, hoofd, nek en lichaam, ongecontroleerd rollen met de ogen, bovenmatig knipperen met de ogen, misselijkheid, overgeven, diarree, zweten, duizeligheid, koud gevoel, verwardheid, hallucinaties, slaperigheid, roodheid/ontsteking, en tremor.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem gewoon de volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn

U mag de behandeling met dit medicijn niet stopzetten, tenzij uw arts u dit aanbeveelt. Optreden van het maligne neurolepticasyndroom (MNS) is gemeld na het plotseling stopzetten van de behandeling met tetrabenazine (zie rubriek 4, "Zelden voorkomende bijwerkingen").

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Als u de volgende bijwerkingen ondervindt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde spoedeisende-hulpdienst van een ziekenhuis:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Tetrabenazine SUN kan een depressie veroorzaken, en dit kan bij sommige mensen leiden tot zelfmoordgedachten. Als u zich neerslachtig of erg verdrietig voelt kan dit overgaan in een depressie. Deze stemmingsverandering moet u aan uw arts melden.
- als u last krijgt van trillende of ongecontroleerde bewegingen van uw handen, armen, benen en hoofd, van kwijlen, slikproblemen, of van evenwichtsstoornissen, dan is het mogelijk dat u parkinsonisme heeft. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

- als u psychische problemen krijgt zoals verwardheid of hallucinaties, of als zich bij u stijfheid in de spieren en een verhoogde temperatuur voordoen, kan het zijn dat zich bij u een aandoening ontwikkelt die het Maligne Neuroleptisch Syndroom heet. Als u deze symptomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- als u een zelfmoordpoging hebt gedaan
- als u zichzelf met opzet pijn heeft gedaan of gedachten heeft over het pijn doen van uzelf.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- als u een ernstig verhoogde bloeddruk heeft (hypertensieve crisis)
- als u moeite heeft om rustig te blijven en stil te zitten, lijdt u mogelijk aan akathisie. Als u dit ervaart, neem dan contact op met uw arts.

Overige bijwerkingen

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- slaperigheid (bij hogere doses)
- tremor
- speekselvloed.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- verwardheid
- angst
- slapeloosheid
- agitatie (onrust)
- verminderde eetlust.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- longontsteking (pneumonie)
- daling van het aantal witte bloedcellen (leukopenie)
- boosheid
- agressie
- uitdroging
- onbeheersbare spierspasmen van de ogen
- gevoeligheid voor zonlicht
- uitslag
- jeuk
- rode bultjes (netelroos)
- gewichtsverlies
- vallen.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- desoriëntatie
- zenuwachtigheid
- nerveuze rusteloosheid
- slaapstoornissen
- onhandigheid en gebrek aan coördinatie, met als gevolg problemen met balans en tred, verstoorde beweging van ledematen en ogen en/of spraakstoornissen (ataxie)
- onbeheersbare en soms pijnlijke spierspasmen (dystonie)
- duizeligheid
- geheugenverlies
- te trage hartslag (bradycardie)
- lage bloeddruk
- plotselinge duizeligheid en flauwvallen bij opstaan (posturale hypotensie)
- dysfagie (moeilijk kunnen slikken)
- misselijkheid
- braken
- diarree
- obstipatie (verstopping)
- pijn in de bovenbuik
- droge mond
- overmatig zweten (hyperhidrose)
- onregelmatige menstruatiecyclus
- vermoeidheid
- zwakte
- verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie)
- toegenomen eetlust
- gewichtstoename.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van een van de bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. HOE BEWAART U DIT MEDICIJN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

12,5 mg tabletten

- De werkzame stof in dit medicijn is tetrabenazine. Elk tablet bevat 12,5 mg tetrabenazine.

- De andere stoffen in dit medicijn zijn lactose anhydraat, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, talk, silica, colloïdaal watervrij en magnesiumstearaat.

25 mg tabletten

- De werkzame stof in dit medicijn is tetrabenazine. Elke tablet bevat 25 mg tetrabenazine.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn lactose anhydraat, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, ijzeroxide geel (E172), talk, silica, colloïdaal watervrij en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Tetrabenazine SUN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tetrabenazina SUN 12,5 mg tabletten: Dit medicijn ziet eruit als een witte tot gebroken witte, ronde, platte, niet-omhulde tablet met schuine randen, met aan de ene zijde “1” ingeperst, en glad aan de andere zijde.

Tetrabenazine SUN 25 mg tabletten: Dit medicijn ziet eruit als een gele, ronde, platte, niet-omhulde tablet met schuine randen, met aan de ene zijde “179” ingeperst, en een breuklijn aan de andere zijde. Deze tablet kan in gelijke helften verdeeld worden.

Tetrabenazine SUN wordt geleverd in plastic tablettencontainers met elk 112 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 117367 - Tetrabenazine SUN 12,5 mg tabletten
RVG 117369 - Tetrabenazine SUN 25 mg tabletten

Dit medicijn is geregistreerd in de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) onder de volgende namen:

Duitsland:	Tetrabenazin-neuraxpharm 12,5 mg/ 25 mg Tabletten
Italië	Tetrabenazina SUN 12,5 mg/ 25 mg compresse
Nederland:	Tetrabenazine SUN 12,5 mg/ 25 mg tabletten
Spanje:	Tetrabenazina SUN 25 mg comprimidos EFG
Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland):	Tetrabenazine 12.5 mg/ 25 mg tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2025.