



Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten honing & citroen zuigtabletten

amylmetacresol en dichloorbenzylalcohol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten zijn zuigtabletten die desinfecterende stoffen bevatten. Deze stoffen doden bacteriën en voorkomen ontstekingen.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten worden gebruikt bij beginnende keelpijn.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

RXT
RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg
keelpijntabletten honing & citroen zuigtabletten
RVG 120834



Module I Algemene gegevens
1.3.1 Bijsluiters
Datum: 03-2025

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Als u lijdt aan of last heeft van andere keelproblemen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Keelpijn kan over het algemeen geen kwaad en gaat meestal binnen één week vanzelf over. Neem contact op met uw huisarts als u langer dan 3 dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken of als u naast keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt. Er kan namelijk sprake zijn van een bacteriële infectie die op een andere wijze behandeld dient te worden.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten dienen niet langdurig te worden gebruikt. Indien geen verbetering optreedt of als uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Kinderen

Vanwege de grootte van de zuigtablet, kunnen jonge kinderen zich in RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten verslikken.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten kan niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend kan RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten in combinatie met andere medicijnen worden gebruikt.

Patiënten bij wie de nieren en/of lever niet goed werken:

Er zijn geen gegevens beschikbaar over gebruik van dit medicijn bij patiënten bij wie de nieren en/of lever niet goed werken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

De veiligheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Borstvoeding

De veiligheid van RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten tijdens de periode van borstvoeding is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over het effect van gebruik van amylmetacresol en dichloorbenzylalcohol op de vruchtbaarheid.

RXT
RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg
keelpijntabletten honing & citroen zuigtabletten
RVG 120834



Module I Algemene gegevens
1.3.1 Bijsluiter
Datum: 03-2025

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van het gebruik van RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten zijn geen nadelige effecten op de rijvaardigheid en het bedienen van machines bekend.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten bevat zonnegeel (E110)

Deze stof kan allergische reacties geven.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten bevat maltitol vloeistof en isomalt

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Isomalt kan een licht laxerende werking hebben.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: Om de 2 à 3 uur een zuigtablet langzaam opzuigen.

Maximaal 3 dagen gebruiken.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Gezien de aard van het medicijn lijkt een overdosering onwaarschijnlijk en zou daarom geen aanleiding tot problemen moeten geven anders dan maagdarmlachten die als zodanig behandeld moeten worden.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Als u merkt dat u overgevoelig voor dit product bent, stop dan met het gebruik ervan en overleg met uw arts of apotheker. Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking krijgt die niet in deze bijsluiter staat, vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): allergische reacties, buikpijn, misselijkheid,

RXT
RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg
keelpijntabletten honing & citroen zuigtabletten
RVG 120834



Module I Algemene gegevens
1.3.1 Bijsluiter
Datum: 03-2025

onaangenaam gevoel in de mond (o.a. een brandend of tintelend gevoel en vochtophoping in de mond of keel) en huiduitslag.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: pepermuntolie, chinolinegeel (E104), natriumsaccharine (E954), wijnsteenzuur (E334), zonnegeel (E110), citroenessence, honingsmaakstof, isomalt (E953) en maltitol (E965).

Hoe ziet RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten er uit en wat zit er in een verpakking?

RXT amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg honing & citroen zijn gele, dubbelbolle, ronde zuigtabletten met honing- en citroensmaak met een doorsnee van 19 mm.

PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking. Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48 zuigtabletten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

RXT
RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg
keelpijntabletten honing & citroen zuigtabletten
RVG 120834



Module I Algemene gegevens
1.3.1 Bijsluiter
Datum: 03-2025

RXT
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Nederland

Fabrikant:
Lozy's Pharmaceuticals S.L.
Campus Empresarial
31795 Lekaroz (Navarra)
Spanje

MAE Holding B.V.
Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch
Nederland

Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstraße 1
29439 Lüchow
Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 120834

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2025.