

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

OctaplasLG 45-70 mg/ml oplossing voor infusie ABO-bloedgroepspecifieke humane plasma-eiwitten

Lees goed de hele bijsluiters voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiters. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiters:

1. Wat is OctaplasLG en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is OctaplasLG en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

OctaplasLG is samengevoegd humaan (menselijk) plasma dat een behandeling heeft ondergaan voor inactivering van virussen. Humaan plasma is het vloeibare gedeelte van het humaan bloed dat de cellen bevat. Het bevat humane plasma-eiwitten, die belangrijk zijn om de normale stollingseigenschappen in stand te houden, en wordt op dezelfde wijze gebruikt als normaal vers bevroren plasma (FFP, *fresh-frozen plasma*).

OctaplasLG helpt in geval van complexe tekorten aan stollingsfactoren, die kunnen worden veroorzaakt door ernstig leverfalen of massale transfusie. OctaplasLG kan ook worden gegeven in noodsituaties als er geen stollingsfactorconcentraat (zoals factor V of factor XI) voorhanden is of als de vereiste laboratoriumdiagnose niet mogelijk is.

Het kan ook worden toegediend om de effecten van via de mond in te nemen antistollingsmiddelen (cumarine of indanedione type) snel te herstellen, wanneer er een vitamine K insufficiëntie (vitamine K tekort) bestaat vanwege een verzwakte leverfunctie, of in noodsituaties.

OctaplasLG kan toegediend worden aan patiënten die plasma-uitwisseling ondergaan om de balans tussen de stollingsfactoren te herstellen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- als u weet dat u antistoffen hebt tegen immunoglobuline A (IgA).
- als u vroeger reacties hebt vertoond op een of ander preparaat van humaan plasma of FFP.
- als u weet dat u een laag gehalte aan proteïne S hebt (een vitamine K-afhankelijk eiwit in uw bloed).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.
Vertel uw arts als u eventuele andere ziekten heeft.

Wees extra voorzichtig met OctaplasLG?

- als u een laag gehalte aan immunoglobuline A heeft.
- als u vroeger reacties heeft vertoond op plasma-eiwitten met inbegrip van FFP.
- als u aan hartfalen of vocht in de longen (longoedeem) lijdt.
- als u een bekend risico loopt op complicaties door bloedstolling (trombose) gezien het mogelijk verhoogde risico op veneuze trombo-embolie (stolselvorming in de aders).
- coagulatieremming (fibrinolyse).

OctaplasLG wordt doorgaans niet aanbevolen voor de behandeling van de ziekte van von Willebrand.

Virale veiligheid

Als geneesmiddelen worden bereid uit humaan bloed of plasma, worden bepaalde maatregelen genomen om te voorkomen dat infecties zouden worden overgedragen op patiënten. Die omvatten een zorgvuldige selectie van de bloed- en plasmadonoren, zodat donoren die een infectie zouden kunnen dragen worden uitgesloten, en onderzoek van elke donatie en van plasmapools (plasmamonsters) op tekenen van virussen/infecties. De fabrikanten van die producten lassen bij de verwerking van het bloed of het plasma ook stappen in om virussen te inactiveren of te verwijderen. Ondanks die maatregelen kan de mogelijke overdracht van een infectie niet volledig worden uitgesloten als geneesmiddelen worden bereid uit humaan bloed of plasma. Dat geldt ook voor eventuele onbekende of opkomende virussen of andere types van infectie.

De genomen maatregelen worden doeltreffend geacht tegen virussen met een enveloppe zoals het humane immunodeficiëntievirus (hiv), het hepatitis B- en het hepatitis C-virus.

Het zou kunnen dat de maatregelen maar van beperkte waarde zijn tegen bepaalde virussen zonder enveloppe (omhulsel), zoals het hepatitis A-virus, hepatitis E-virus en het parvovirus B19.

Het wordt sterk aanbevolen dat telkens als u een dosis van OctaplasLG krijgt u de naam en het lotnummer van het product opschrijft, zodat wordt bijgehouden welke partijen van het geneesmiddel zijn gebruikt.

Uw arts kan u aanraden om vaccinatie tegen hepatitis A en B te overwegen als u regelmatig/herhaaldelijk uit humaan plasma afgeleide producten toegedient krijgt.

Kinderen

Er zijn enkele gevallen van een laag calciumgehalte, mogelijk veroorzaakt door citraatbinding, waargenomen gedurende therapeutische plasma-uitwisseling bij kinderen. Controle van calcium tijdens dergelijk gebruik van OctaplasLG wordt aanbevolen.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

In klinische studies werd OctaplasLG toegediend in combinatie met diverse andere geneesmiddelen, en er werden geen interacties waargenomen.

Met de toediening van OctaplasLG kunt u ook stoffen (bijv. zwangerschapshormoon) binnenkrijgen die kunnen leiden tot vals-positieve testuitslagen (bijv. positieve zwangerschapstest ook al bent u niet zwanger).

OctaplasLG mag niet worden vermengd met andere intraveneuze vloeistoffen of geneesmiddelen behalve rode bloedcellen en bloedplaatjes.

Om de mogelijke vorming van bloedstolsels te voorkomen, mogen oplossingen die calcium bevatten niet via dezelfde intraveneuze lijn worden toegediend als OctaplasLG.

Er zijn geen reacties bekend met andere geneesmiddelen.

Gebruikt u naast OctaplasLG nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er werden geen effecten waargenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U krijgt dit middel alleen als uw arts dat voor u belangrijk vindt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er werd geen effect waargenomen op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. U moet zelf beslissen of u zich voldoende goed voelt om met een voertuig te rijden of andere taken te verrichten die meer concentratie vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van OctaplasLG

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.

Dit middel bevat maximaal 920 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per zak. Dit komt overeen met maximaal 46% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

OctaplasLG wordt toegediend door een arts of verpleegkundige. Het wordt gegeven als een infuus in uw aders.

Uw dosering hangt af van uw klinische situatie en uw lichaamsgewicht. Uw arts zal bepalen wat de juiste hoeveelheid is die u moet krijgen.

- Voordat OctaplasLG aan u wordt gegeven via een infuus, moet een ABO-bloedgroepcompatibiliteitstest worden uitgevoerd.
- In noodgevallen kan OctaplasLG bloedgroep AB worden gegeven aan alle patiënten.

Het is belangrijk dat de infuussnelheid niet hoger is dan 1 ml OctaplasLG per kg lichaamsgewicht per minuut. Calciumgluconaat kan in een andere ader worden gegeven om de negatieve effecten van het citraat dat in OctaplasLG aanwezig is te verminderen.

U moet tijdens en minstens 20 minuten na de toediening worden geobserveerd, voor het geval u een allergische reactie (anafylactische reactie) of shock zou ontwikkelen. In dat geval moet het infuus onmiddellijk worden stopgezet.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er zijn beperkte gegevens beschikbaar bij kinderen en jongeren (0 - 16 jaar).

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Hoge doseringen kunnen leiden tot vochtverbelasting, vocht in de longen en/of hartproblemen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Uw arts is verantwoordelijk voor hoe dit middel aan u wordt toegediend en moet uw laboratoriumwaarden binnen de gespecificeerde waarden houden.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Op grond van laboratoriumwaarden beslist uw arts wanneer de toediening van OctaplasLG mag worden stopgezet, en zal hij de mogelijke risico's bepalen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de op het etiket vermelde uiterste houdbaarheidsdatum.

Er zijn meerdere opties voor het ontdooien van bevroren OctaplasLG:

- Waterbad:

Ontdooi met de buitenzak gedurende ten minste 30 minuten in een circulerend waterbad tussen +30°C en +37°C. Er kan indien nodig een 'overwrap-zak' (beschermende buitenzak) worden gebruikt voor extra bescherming van de inhoud.

Voorkom contaminatie van de ingangspoort door water. De minimale ontdooitijd is 30 minuten bij 37°C. De temperatuur van het waterbad mag nooit hoger zijn dan +37°C en nooit lager dan +30°C.

De ontdooitijd is afhankelijk van het aantal zakken in het waterbad. Indien meerdere plasmazakken tegelijkertijd worden ontdooid, kan de ontdooitijd worden verlengd, maar mag niet langer zijn dan 60 minuten.

- Gebruik van een droog opwarmsysteem zoals de SAHARA-III:
Plaats de OctaplasLG zakken op de schudplaat volgens de instructies van de fabrikant en ontdooi het plasma d.m.v. de snelle opwarmfunctie. Wanneer op het temperatuurscherm “temperatuur bloedcomponent: + 37°C” verschijnt, dient u het opwarmproces te beëindigen en de zakken te verwijderen.
Bij het ontdooien van OctaplasLG aan de hand van een droog opwarmsysteem is het aanbevolen om de protocol-printer te gebruiken om het verloop van de bloedcomponenttemperatuur en, bij defect, de foutmeldingen te registreren.
- Andere ontdooisystemen:
Andere ontdooisystemen voor bevroren OctaplasLG kunnen worden gebruikt op voorwaarde dat de methodes gevalideerd zijn voor dat doel.

Laat de inhoud van de zak opwarmen tot ongeveer +37°C vóór infusie. De temperatuur van OctaplasLG mag +37°C niet overschrijden. Verwijder de buitenste zak en onderzoek de zak op scheurtjes en lekken.

Vermijd schudden.

Na ontdooien is de oplossing helder tot enigszins melkachtig ('opaalachtig') en vrij van vaste of gelatineachtige deeltjes.

Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of zichtbare deeltjes en/of verkleuring vertonen.

Ontdooid OctaplasLG mag niet opnieuw worden ingevroren. Ongebruikt product moet worden vernietigd.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Overgevoeligheidsreacties worden zelden waargenomen. Dit zijn gewoonlijk milde allergische reacties bestaande uit gelokaliseerde of gegeneraliseerde roodheid van de huid, netelroos of jeuk. Ernstigere vormen kunnen worden gecompliceerd door bloeddrukverlaging of opzwellen van gezicht of tong. Ernstige allergische reacties over het hele lichaam kunnen zeer snel optreden en ernstig zijn. Symptomen zijn bloeddrukverlaging, verhoogde hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, hoesten, kortademigheid, misselijkheid, braken, diarree, buik- of rugpijn. Ernstige reacties kunnen overgaan tot shock, bewusteloosheid, ademhalingsfalen en zeer zelden zelfs de dood. Bijwerkingen kunnen worden veroorzaakt door het citraat in OctaplasLG en het hiermee verband houdende lage calciumgehalte, vooral als de infusiesnelheid hoog is, als u leverfunctiestoornissen heeft of als u plasma-wisseltransfusies krijgt. U kunt symptomen als vermoeidheid, tintelingen (paresthesie), bevingen en een laag calciumgehalte.

OctaplasLG kan het risico op bloedstolsels verhogen in de aderen van:

- de armen en benen, met als gevolg pijn en zwelling van de armen en benen;
- de longen, met als gevolg pijn op de borst en kortademigheid;

- de hersenen, met als gevolg zwakte en/of verlies van het gevoel aan één zijde van het lichaam;
- het hart, met als gevolg pijn op de borst;

Bij alle patiënten met het risico op verhoogde bloedstolling dient men extra voorzichtig te zijn en dienen geschikte maatregelen te worden overwogen.

Zelden kan onverenigbaarheid tussen antistoffen in OctaplasLG en antigenen in uw bloed leiden tot vernietiging van uw rode bloedcellen (hemolytische transfusiereacties). Symptomen zijn rillingen, koorts, een niet-productieve hoest, ademhalingsmoeilijkheden, huiduitslag en bloeding in het lichaam.

Een infuus van OctaplasLG kan leiden tot de vorming van antistoffen tegen specifieke stollingsfactoren.

Hoge doseringen of een hoge infuussnelheid kunnen het bloedvolume verhogen, vocht in de longen en/of hartfalen veroorzaken.

Tijdens klinische onderzoeken met de voorloper van OctaplasLG en het gebruik ervan na goedkeuring zijn de volgende bijwerkingen vastgesteld:

Systeem/orgaanklassen	Vaak (≥ 1/100, < 1/10)	Soms (≥ 1/1000, < 1/100)	Zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000)	Zeer zelden (< 1/10.000)
Bloedstelselaandoeningen				<ul style="list-style-type: none"> • tekort aan rode bloedcellen • verhoogde bloedingsneiging
Immuunsysteemaandoeningen			<ul style="list-style-type: none"> • overgevoeligheid 	<ul style="list-style-type: none"> • ernstige allergische reactie en shock
Psychische stoornissen				<ul style="list-style-type: none"> • angst • opwinding, onrust (agitatie) • rusteloosheid
Zenuwstelselaandoeningen		<ul style="list-style-type: none"> • verminderde tastzin of verminderd gevoel 		<ul style="list-style-type: none"> • duizeligheid • tintelend gevoel
Hartaandoeningen				<ul style="list-style-type: none"> • hartfalen • onregelmatige hartslag • verhoogde hartslag
Bloedvat- en bloedsomloopaandoeningen				<ul style="list-style-type: none"> • stolsel in bloedvaten • bloeddrukverlaging • bloeddrukverhoging • bloedsomloopfalen • rood worden van de huid
Ademhalingsstelselaandoeningen		<ul style="list-style-type: none"> • zuurstofgebrek 		<ul style="list-style-type: none"> • ademhalingsfalen • longbloeding • verkrampen van de spieren rond de luchtpijp • vocht in de longen • kortademigheid • ademhalingsmoeilijkheden
Maagdarmstelselaandoeningen		<ul style="list-style-type: none"> • braken • misselijkheid 		<ul style="list-style-type: none"> • buikpijn
Huidaandoeningen	<ul style="list-style-type: none"> • netelroos • jeuk 			<ul style="list-style-type: none"> • uitslag • overmatig zweten
Skeletspierstelselaandoeningen				<ul style="list-style-type: none"> • rugpijn
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen		<ul style="list-style-type: none"> • koorts 		<ul style="list-style-type: none"> • pijn op de borst • vervelend gevoel op de borst • rillingen • plaatselijke zwelling • algemeen ongemak • reactie op de toedieningsplaats

Systeem/orgaanklassen	Vaak (≥ 1/100, < 1/10)	Soms (≥ 1/1000, < 1/100)	Zelden (≥ 1/10.000, < 1/1000)	Zeer zelden (< 1/10.000)
Onderzoeken				<ul style="list-style-type: none"> • positieve antistoffentest • minder zuurstof in het bloed
Letsels, vergiftigingen en verrichtingscomplicaties				<ul style="list-style-type: none"> • hoger bloedvolume • citraatvergiftiging • vernietiging van rode bloedcellen

Afhankelijk van het type en de ernst van de bijwerkingen moet de infuussnelheid worden verlaagd of moet de toediening worden stopgezet. Uw arts zal de geschikte actie ondernemen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen

Gedurende plasma-uitwisselingsprocedures kan een laag calciumgehalte worden waargenomen bij kinderen, voornamelijk bij patiënten met leverfunctiestoornissen of bij hoge infusiesnelheden. Controle van calcium tijdens dergelijk gebruik van OctaplasLG wordt aanbevolen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP.

Bevroren bewaren en transporteren ($\leq -18^{\circ}\text{C}$).

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na ontdooien is de chemische en fysische stabiliteit gedurende 5 dagen bij 2-8°C of 8 uur bij kamertemperatuur (20-25°C) aangetoond.

Na openen dient het product om microbiologische redenen onmiddellijk te worden gebruikt, tenzij de methode van opening het risico van microbiële contaminatie uitsluit. Als het product niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de bewaartijden en -omstandigheden tijdens gebruik onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de oplossing troebel is of zichtbare deeltjes en/of verkleuring bevat.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn ABO-bloedgroepspecifieke humane plasmaproteïnen. Elke zak van 200 ml bevat 9-14 g (45 - 70 mg/ml).

- De andere stoffen zijn:
natriumcitraatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, glycine

Hoe ziet OctaplasLG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

OctaplasLG wordt aangeboden als een oplossing voor infusie.

200 ml in elke zak.

Verpakt per 1 en 10.

De bevroren oplossing is (enigszins) geel.

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 25407

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

OCTAPHARMA GmbH

Elisabeth-Selbert Str. 11

40764 Langenfeld

Duitsland

Fabrikant

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

SE-112 75 Stockholm

Zweden

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2024.

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Dosering en wijze van toediening

Dosering

De dosering is afhankelijk van de klinische toestand en de onderliggende aandoening, maar 12-15 ml OctaplasLG/kg lichaamsgewicht is een algemeen aanvaarde aanvangsdosering. Hierdoor zou het niveau van de plasmastollingsfactoren van de patiënt met ongeveer 25% moeten stijgen.

Het is belangrijk de respons te volgen, zowel klinisch als door bepaling van bijv. de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT), de protrombinetijd (PT) en/of specifieke stollingsfactoranalyses.

Dosering voor stollingsfactordeficiënties:

Normaliter wordt een voldoende hemostatisch effect bij mindere en gematigde haemorrhagie of bij chirurgie met patiënten met stollingsfactordeficiëntie bereikt na infusie van 5-20 ml OctaplasLG/kg lichaamsgewicht. Hierdoor zou het niveau van de plasmastollingsfactoren van de patiënt met ongeveer 10-33% moeten stijgen. In geval van ernstige haemorrhagie of bij chirurgie moet een haematoloog worden geraadpleegd.

Dosering voor TTP en haemorrhagie bij intensieve plasma-uitwisseling:

Voor therapeutische plasma-uitwisselingsprocedures moet het deskundig advies van een hematoloog worden gevraagd.

Bij TTP patiënten moet het volledige verwijderde plasmavolume vervangen worden door OctaplasLG.

Wijze van toediening

De toediening van OctaplasLG moet gebaseerd worden op de specifieke bloedgroepen. In spoedgevallen kan OctaplasLG bloedgroep AB worden beschouwd als een universeel plasma daar het aan alle patiënten kan worden gegeven, ongeacht hun bloedgroep.

OctaplasLG moet worden toegediend via een intraveneuze infusie na het ontdooien, gebruikmakend van een infusieset met filter. Een aseptische techniek dient te worden aangehouden tijdens de infusie.

Er kan zich citraatvergiftiging voordoen, wanneer meer dan 0,020-0,025 mmol citraat per kg per minuut wordt toegediend. Daarom mag de infusiesnelheid niet hoger zijn dan 1 ml OctaplasLG per kg per minuut. De toxische effecten van citraat kunnen worden geminimaliseerd door toediening van intraveneus calciumgluconaat in een andere ader.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:

In geval van een anafylactische reactie of shock moet het infuus onmiddellijk gestopt worden. Bij de behandeling moeten de richtlijnen voor de behandeling van shock worden gevolgd.

De patiënten moeten na de toediening gedurende ten minste 20 minuten geobserveerd worden.

Gevallen van onverenigbaarheid:

- Het product OctaplasLG kan worden gemengd met rode bloedcellen en bloedplaatjes, indien de preparaten ABO-compatibel zijn.
- OctaplasLG mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen daar inactivatie en neerslag kunnen optreden.
- Om de mogelijkheid van klontervorming te voorkomen, mogen oplossingen die calcium bevatten niet met de dezelfde intraveneuze leiding worden toegediend als OctaplasLG.

Belemmering van serologisch onderzoek:

Passieve overdracht van plasmacomponenten van OctaplasLG (bijv. β -humaan choriogonadotropine; β -HCG) kan resulteren in misleidende laboratoriumuitslagen bij de ontvanger. Er is bijvoorbeeld melding gemaakt van een vals-positieve uitslag van een zwangerschapstest na passieve overdracht van β -HCG.