

## BIJSLUITER

### **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Mucodyne Adult 50 mg/ml, hoestdrank**

Carbocisteïne

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Mucodyne Adult 50 mg/ml en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Mucodyne Adult 50 mg/ml en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Bij vastzittende hoest. Het medicijn kan vastzittend slijm in de luchtwegen dunner maken, zodat het gemakkelijker kan worden opgehoest.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zijn. Deze stoffen kunt u in rubriek 6.

Als uw kind jonger is dan 2 jaar.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Als u een maag- of darmzweer heeft, of hiervan een voorgeschiedenis heeft.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, dient er rekening te worden gehouden met het suikergehalte van de drank: 6 g sucrose (saccharose) per dosis van 15 ml.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Mucodyne Adult 50 mg/ml is niet geschikt voor gebruik bij kinderen onder 18 jaar.

**Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Mucodyne Adult 50 mg/ml nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden nog gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

**Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Het medicijn kan voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en bij borstvoeding.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend over een effect op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

**Mucodyne Adult 50 mg/ml bevat sacharose**

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt. Bevat 6 g sucrose per dosis. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

Kan schadelijk zijn voor de tanden.

**Mucodyne Adult 50 mg/ml bevat methylparahydroxybenzoaat**

Kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

**Mucodyne Adult 50 mg/ml bevat ethanol**

Dit medicijn bevat 0,17 mg alcohol (ethanol) per dosis. De hoeveelheid per dosis in dit medicijn komt overeen met minder dan 3,4 ml bier of 1,36 ml wijn.

Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit medicijn. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

**Mucodyne Adult 50 mg/ml bevat natrium**

Dit medicijn bevat 98 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per dosis. Dit komt overeen met 4,9% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

**3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen (vanaf 18 jaar): 3 maal daags 15 ml NB: 15 ml komt overeen met één eetlepel.

Module 1

1.3.1.3 Product Information – Package Leaflet

Versie: March 2025

---

Mucodyne Adult 50 mg/ml niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

Mucodyne Adult 50 mg/ml is niet geschikt voor gebruik bij kinderen onder 18 jaar.

De opgegeven dosering niet overschrijden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, uw arts raadplegen.

De drank dient ingenomen te worden met de bijgeleverde maatbeker.

**Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

**Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In sommige gevallen kunnen zich maagklachten voordoen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket van de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de fles nog 1 maand houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is carbocisteïne, 50 mg per ml drank.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn: methylparahydroxybenzoaat (E218), sacharose, aromatisch elixer (bevat ethanol), kaneel essence, natriumhydroxide, gezuiverd water, kleurstof karamel (E150).

### Hoe ziet Mucodyne Adult 50 mg/ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fles met 125 ml, 200ml en 300 ml drank.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

*Voor correspondentie en inlichtingen:*

[productNL@cooperconsumerhealth.com](mailto:productNL@cooperconsumerhealth.com)

### Fabrikant:

Delpharm Bladel B.V.

Industrieweg 1

5531 AD Bladel

**In het register ingeschreven onder**

RVG 33153.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2025.**