

TRIAMCINOLON TEVA 1 MG/G
crème

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Datum: 14 juli 2017
Blad: 1

ALGEMENE KENMERKEN

Naam van het geneesmiddel
Triamcinolon Teva 1 mg/g, crème

Samenstelling
Werkzame stof: 1 mg triamcinolonacetonide per gram crème.
Hulpstoffen: cetomacrogolwas (BP), vloeibare was (decyloleaat), sorbitol, sorbinezuur (E200), rijstzetmeel, water.

Farmaceutische vorm
Crème in tubes à 15 en 30 gram.

Geneesmiddelen groep
Triamcinolon behoort tot de groep van bijnierschors hormonen (corticosteroiden). Triamcinolon werkt ontstekingsremmend en vermindert roodheid, zwelling, jeuk en andere irritatie van de huid.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Teva Nederland BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

In het register ingeschreven onder
RVG 51531

GEBRUIKEN BIJ

Oppervlakkige, niet door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten of schimmels) veroorzaakte huidaandoeningen, die gevoelig zijn voor corticosteroiden maar onvoldoende reageren op zwak werkzame producten, zoals:

- psoriasis (schilferende, droge, niet besmettelijke huidziekte)
- bepaalde huidaandoeningen, die gepaard gaan met een gezwollen huidoppervlak (lichen ruber, lichen sclerosus et atrophicus)
- bepaalde, uit korrelig weefsel bestaande, ringvormige zwelling van de huid (granuloma annulare)
- zéér hardnekkige uitslag met puisten aan handpalmen en voetzolen (ziekte van Andrews-Barber).

VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT

Niet gebruiken bij

TRIAMCINOLON TEVA 1 MG/G
crème

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Datum: 14 juli 2017
Blad: 2

- overgevoeligheid voor triamcinolon of één van de andere bestanddelen van de crème
- huidinfectie
- zweertjes, acne of wonden
- visschubbenziekte (ichthyose)
- verschrompelde en dunne huid
- tere bloedvaten in de huid (haarvaatjes)
- huidaandoeningen ten gevolge van bijnierschorschormonen
- bepaalde op jeugdige leeftijd voorkomende huidaandoening aan de voetzool (juvenile dermatosis plantaris).

Nodige voorzorgen bij gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Speciale waarschuwingen met betrekking tot hulpstoffen van dit geneesmiddel

Dit product bevat sorbinezuur, waardoor soms irritatie en ontsteking van de huid kunnen optreden.

Wisselwerking

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Voor zover bekend treedt er geen wisselwerking op bij gelijktijdig gebruik van deze crème met andere (genees)middelen.

Waarschuwingen en voorzorgen

De crème niet toepassen op de oogleden.

Bij kinderen mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken op voorschrift van de arts.

Pas het preparaat uitsluitend toe bij aandoeningen waarvoor uw arts het heeft voorgeschreven. Houdt u daarbij aan de aanbevolen gebruikstermijn.

Als bij gebruik de klachten niet verdwijnen of zich herhalen moet u advies vragen aan uw arts.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering en wijze van gebruik

Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

De crème 2 maal per dag (=24 uur) dun op de huid aanbrengen, na enkele dagen 1 maal per dag. Na

TRIAMCINOLON TEVA 1 MG/G
crème

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Datum: 14 juli 2017
Blad: 3

verbetering is 2-3 maal per week dun aanbrengen meestal voldoende. Niet meer dan 30-60 gram per week gebruiken.

Na gebruik de handen wassen, behalve wanneer de crème voor uw handen is bedoeld.

Het verdient aanbeveling om, na reiniging van de huid met alcohol of zeep, deze goed te laten drogen, alvorens de crème aan te brengen.

Overdosering

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt gebruikt, dient u uw arts te raadplegen.

BIJWERKINGEN

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- dun en bleek worden van de huid
- rode huiduitslag rondom de mond en in het gezicht
- huidstriemen
- onderhuidse bloedinkjes
- wazig zien.

Zelden komen overgevoeligheidsreacties voor. De huidaandoening lijkt dan niet te genezen maar te verergeren.

Met name het gezicht, de behaarde huid en de huid van de geslachtsorganen zijn bijzonder gevoelig voor bovengenoemde bijwerkingen. Tevens neemt de kans op bijwerkingen toe bij toepassing van de crème op grote huidoppervlakken, onder plastic of in huidplooien.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of indien u de bijwerking als ernstig ervaart.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaren in de goed gesloten verpakking bij 15-25°C. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding "Exp." op de verpakking betekent: "niet te gebruiken na".

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2017

0717.2v.RS