

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Triamtereen Accord 50 mg, tabletten

Triamtereen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Triamtereen Accord 50 mg behoort tot de groep van diuretica (plasmiddelen). Deze middelen zorgen ervoor dat overmatige vochtophoping in de lichaamssweefsels (oedemen) verdwijnen.

Dit middel wordt gebruikt:

- bij vochtophoping (oedeem) ten gevolge van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis)
- bij vochtophoping ten gevolge van een verminderde werking van de nieren
- bij behandeling met andere plasmiddelen, wanneer deze alléén onvoldoende effect heeft
- bij langdurige behandeling van hoge bloeddruk met plasmiddelen, om kaliumtekort te voorkomen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als uw kaliumgehalte in uw bloed te hoog is;
- wanneer tijdens de behandeling de werking van uw nieren vermindert
- Als u andere kaliumsparende geneesmiddelen gebruikt;
- Als u lijdt aan een ernstige stoornis van de lever- of nierfunctie;
- wanneer u lijdt aan een ernstig verminderde werking van de nieren,

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt of als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

- wanneer u last krijgt van hartritmestoornissen; U dient contact op te nemen met uw arts
- wanneer u last heeft van hartritmestoornissen; de hoeveelheid kalium in uw bloed dient regelmatig gecontroleerd te worden
- wanneer u een geneesmiddel gebruikt tegen hartritmestoornissen (digitalis) en de werking en bijwerkingen van dit geneesmiddel sterker worden; u dient contact op te nemen met de arts
- wanneer uw nieren of lever onvoldoende werken; uw bloed dient regelmatig gecontroleerd te worden
- wanneer u last heeft of krijgt van jicht; triamtereen kan dit verergeren
- wanneer u last heeft gehad van nierstenen; triamtereen kan de groei van nierstenen bevorderen.

Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Triamtereen Accord 50 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Triamtereen Accord 50 mg, tabletten kunnen met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen geven. Dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met:

- middelen die kalium bevatten of andere kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, amiloride); deze middelen mogen niet tegelijk gebruik worden met triamtereen/hydrochloorthiazide omdat de hoeveelheid kalium in uw bloed te hoog kan worden
- andere plasmiddelen (thiazide-diuretica); bij langdurig gebruik van een hoge dosis of wanneer u een zout-arm dieet volgt dienen uw bloedzouten in de gaten gehouden te worden
- disopyramide (middel bij hartritmestoornissen); dit middel kan de effecten versterken van een verhoogde hoeveelheid kalium in uw bloed
- insuline (middel bij suikerziekte); de hoeveelheid insuline die u nodig heeft kan veranderen
- bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers); gelijktijdig gebruik dient met voorzichtigheid te gebeuren
- lithium (middel bij psychische stoornissen); de hoeveelheid lithium in uw bloed kan toenemen

- bepaalde pijnstillers (NSAID's, zoals indometacine); u dient voorzichtig te zijn bij gelijktijdig gebruik aangezien de werking van uw nieren hierdoor kan verminderen

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van triamteren tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit geneesmiddel niet schadelijk gebleken. Aangezien triamteren wel de placenta kan passeren, dient u uw arts te raadplegen zodra u een zwangerschap vermoedt of een kinderwens heeft.

Tijdens zwangerschap mag u Triamteren Accord 50 mg alleen gebruiken in overleg met uw arts.

Borstvoeding

Triamteren kan terecht komen in de moedermelk. Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Triamteren Accord 50 mg invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Echter, duizeligheid is als bijwerking gemeld. In dat geval dient u voorzichtig te zijn met het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Bevat lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

Wanneer u alleen Triamteren Accord 50 mg gebruikt

De gebruikelijke dosering is 3 tot 4 tabletten per dag, verdeeld over twee doses ('s morgens en 's avonds). De maximale dosering is 6 tabletten per dag. Wanneer u gelijktijdig een ander plasmiddel gebruikt kan de arts de dosering verlagen. Het wordt aangeraden te stoppen met het gebruik van andere middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen.

Wanneer u Triamteren in combinatie met een ander plasmiddel (een thiazide-diureticum) gebruikt

Bij vochtophoping (oedeem)

Het wordt aangeraden met een lage dosering te beginnen. De arts kan de dosering langzaam verhogen. Zonder dringende reden mag dagelijks gebruik niet langer dan een week duren, de arts zal u een doseringschema voorschrijven.

Bij een verhoogde bloeddruk

De dosering van het plasmiddel dat u al gebruikt kan door de arts verlaagd worden wanneer u Triamteren erbij krijgt. De begindosering met Triamteren is 1 tablet per dag. Daarna kan uw arts de dosering aanpassen.

Gebruik bij kinderen

Er is onvoldoende informatie over het gebruik van Triamteren Accord 50 mg bij kinderen.

Als u merkt dat Triamteren Accord 50 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De duur van de behandeling is afhankelijk van het verloop van uw klachten en zal worden bepaald door uw arts.

Wanneer en hoe u dit middel moet innemen

Neem de tabletten in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) door te slikken. Het wordt aanbevolen om Triamteren Accord 50 mg tabletten na de maaltijd in te nemen om misselijkheid te voorkomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel Triamteren Accord 50 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Triamteren Accord 50 mg heeft ingenomen, zijn braakneigingen en braken, maagdarmsstoornissen, zwakte.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Neem *nooit* een dubbele dosis van Triamteren Accord 50 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Neem de volgende tablet op het eerstvolgende voorgeschreven tijdstip en ga vervolgens op de voorgeschreven wijze door.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Op eigen initiatief stoppen met Triamteren Accord 50 mg wordt afgeraden, raadpleeg altijd uw arts als u wilt stoppen met uw geneesmiddel. Als u te vroeg stopt is het mogelijk dat de verschijnselen die u had voor het gebruik weer terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Triamteren Accord 50 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen:

- zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
- zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Bloedafwijkingen zoals tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie, leukopenie, trombocytopenie of aplastische anemie) of tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose). Stoornissen in de samenstelling van de zouten in het bloed, jicht. Wanneer u een tekort heeft aan foliumzuur, kunt u bloedafwijkingen ontwikkelen.

Immuunsysteemaandoeningen

Sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (analfylaxie), huiduitslag.

Zenuwstelselaandoeningen

Slapte, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond.

Maagdarmstelselaandoeningen

Misselijkheid, braken, diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeditstoringen.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Spiërkrampen.

Nier- en urinewegaandoeningen

Verminderde werking van de nieren, ontsteking van het bindweefsel van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), nierstenen. De kans op nierstenen is groter wanneer uw nieren al niet voldoende werken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Triamtereen Accord 50 mg buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C, in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of flacon achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".> Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. Aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

Triamtereen

De andere stoffen in dit middel zijn:

Lactose

Avicel

Aardappelmeel

Primojel

Kollidon K 30

Calciumhydrogenfosfaat

Talk

Magnesium Stearaat (E470b)

Precirol

Hoe ziet Triamtereen Accord 50 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking

De tabletten zijn rond en hebben de inscriptie "5/0" op de ene zijde en "triamtereen" op de andere zijde.

Tabletten verpakt in stripverpakking (PVC/PVDC-AI), 10 tabletten per strip.

Flacons (HDPE) met PP schroefdop inhoud 30 en 90 stuks.

PP flacon met PE deksel (securitainer, inhoud 30 tabletten).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht

Fabrikant:

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

In het register ingeschreven onder

Triamteren Accord 50 mg, tabletten RVG 55951

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2021.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG
(www.cbg-meb.nl)