

**Deze herinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan je op de hoogte moet zijn vóór en tijdens de behandeling met zoledroninezuur (*Zoledroninezuur Synthon 4 mg/5 ml, steriel concentraat*) injecties voor kankergerelateerde aandoeningen.**

Uw arts heeft aanbevolen dat u zoledroninezuur (*Zoledroninezuur Synthon 4 mg/5 ml, steriel concentraat*) injecties toegediend krijgt om botcomplicaties te voorkomen (bv. breuken) veroorzaakt door botmetastasen of botkanker, of om de hoeveelheid calcium in het bloed te verlagen wanneer deze te hoog is ten gevolge van de aanwezigheid van een tumor.

Een bijwerking genaamd osteonecrose van de kaak (ONJ) (botbeschadiging van het kaakbeen) werd gerapporteerd zeer zelden bij patiënten die behandeld worden met zoledroninezuur (*Zoledroninezuur Synthon 4 mg/5 ml, steriel concentraat*) injecties voor kankergerelateerde aandoeningen. ONJ kan ook na het stoppen van de behandeling optreden.

Om het risico op het ontwikkelen van osteonecrose van de kaak te verminderen, dienen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen te worden:

#### **Vóór het starten van de behandeling:**

- Vraag uw arts om informatie over ONJ voordat u start met de behandeling.
- Vraag uw arts of een tandheelkundig onderzoek aan te raden is voordat u start met een behandeling met zoledroninezuur (*Zoledroninezuur Synthon 4 mg/5 ml, steriel concentraat*).
- Vertel uw arts/verpleegkundige (beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg) als u problemen ervaart met uw mond of tanden.

Patiënten die tandheelkundige operaties (bv. tandextracties) ondergaan, die geen routine tandheelkundige verzorging krijgen, tandvleesaandoeningen hebben, die roken, die verschillende kankerbehandelingen krijgen of die vroeger met een bisfosfonaat behandeld werden (als behandeling of preventie van botaandoeningen), kunnen een hoger risico lopen op ONJ.

#### **Tijdens de behandeling:**

- U moet een goede mondhygiëne aanhouden, ervoor zorgen dat uw kunstgebit goed past en routinematige gebitscontroles ondergaan.
- Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige operatie (bv. tandextracties) moet ondergaan, informeer dan uw arts en vertel aan uw tandarts dat u behandeld wordt met zoledroninezuur (*Zoledroninezuur Synthon 4 mg/5 ml, steriel concentraat*).
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u problemen ervaart met uw mond of uw tanden zoals losse tanden, pijn of zwelling, het niet genezen van zweren of wondvocht, aangezien dit tekenen kunnen zijn van osteonecrose van de kaak.

Lees de bijsluiter voor verdere informatie.