

## **ZOLEDRONIC ACID 4 MG/100 ML OPLOSSING VOOR INFUSIE**

Zoledroninezuur

### **BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE PATIENT – GELIEVE TE LEZEN**

#### **HERINNERINGSKAART VOOR DE PATIENT**

**Deze herinneringskaart voor patiënten bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens uw behandeling met zoledroninezuur-injecties voor kanker-gerelateerde aandoeningen.**

Uw arts heeft u zoledroninezuur-injecties (een bisfosfonaat) voorgeschreven, die u krijgt om ernstige botcomplicaties (bijv. botbreuken), veroorzaakt door botmetastasen of botkanker, te voorkomen, of om de hoeveelheid calcium in het bloed te verlagen wanneer deze te hoog is ten gevolge van de aanwezigheid van een tumor.

Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak ) is een bijwerking die soms (bij 1 op de 100) voorkomt bij patiënten die zoledroninezuur-injecties krijgen. Botbeschadiging in de kaak kan ook optreden na het stoppen van de behandeling.

Het is belangrijk om botbeschadiging in de kaak zoveel mogelijk te voorkomen, omdat het een aandoening is die mogelijk pijnlijk kan zijn en moeilijk is te behandelen. Om het risico op botbeschadiging in de kaak te verminderen kunt u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

#### **Vóórdat u de behandeling krijgt:**

- Vraagt u uw arts of hij/zij een tandheelkundig onderzoek aanraadt voordat u start met de behandeling met zoledroninezuur.
- Vertel uw arts (of verpleegkundige / zorgverlener) als u problemen heeft met uw mond of gebit.

Patiënten die tandheelkundige ingrepen ondergaan (bijv. het trekken van een tand of kies), die niet regelmatig op controle gaan bij de tandarts, die tandvleesaandoeningen hebben, die roken, of die verschillende soorten kankerbehandelingen krijgen of die eerder behandeld zijn met een bisfosfonaat, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van botbeschadiging in de kaak.

### **Tijdens de behandeling:**

- Dient u ervoor te zorgen dat u een goede mondhygiëne heeft en regelmatig voor controle naar de tandarts gaat. Als u een kunstgebit draagt, moet u ervoor zorgen dat deze goed past.
- Als u een tandheelkundige behandeling of een tandheelkundige operatie moet ondergaan (bijv. het trekken van een tand of kies), informeer dan uw arts en vertel uw tandarts dat u behandeld wordt met zoledroninezuur.
- Raadpleeg onmiddellijk uw arts en tandarts als u problemen krijgt met uw mond of gebit zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, niet-genezende zweren of pusafscheiding. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak.

Lees de bijsluiter bij uw geneesmiddel voor meer informatie.