Risicominimalisatiemateriaal voor voorschrijvers over de risico's van selexipag.
Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico's van selexipag voor patiënten te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Selexipag is beschikbaar als tabletten van 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400 en 1.600 microgram.

TITRATIEKAART SELEXIPAG VOOR DE VOORSCHRIJVER

TITRATIEFASE:

Het doel van de titratie is om voor elke patiënt individueel de meest geschikte dosis te bereiken. Dit gebeurt gewoonlijk binnen 8 weken. Om u te helpen tijdens het titratieproces, en om het risico van medicatiefouten te verminderen als gevolg van de noodzaak om tijdens het optitreren meerdere tabletten van maximaal 2 verschillende sterktes (200 en 800 microgram) te gebruiken is onderstaand schema opgesteld.

2 200 microgram tablet

8 800 microgram tablet

TITRATIEVERPAKKING[1)]

Start met 200 microgram tweemaal daags elke 12 uur[4].
Laat de patiënt de tabletten innemen met voedsel om de verdraagbaarheid te verbeteren.
De eerste tablet moet 's avonds ingenomen worden

TITREER MET ZO WEINIG MOGELIJK TABLETTEN[2)]

Bij een benodigde dosis hoger dan 800 microgram ontvangt de patiënt:

Nog een titratieverpakking van 200 microgram tabletten

+

Een verpakking van 800 microgram tabletten

BIJ CONTROLE VAN DE PATIËNT

Verhoog de dosis tot bijwerkingen optreden die niet verdragen worden[3)] of niet behandelbaar zijn

MAXIMALE DOSIS

De maximale dosis die aan een patiënt gegeven mag worden is tweemaal daags 1.600 microgram

OPTITREREN

Verhoog de dosis met 200 microgram tweemaal daags. Elke dosisstap duurt ongeveer 1 week. Bij elke stap moet de eerste dosis 's avonds ingenomen worden

STAP TERUG

Verlaag de dosis naar het voorgaande niveau als een patiënt de dosis bereikt die niet wordt verdragen of de ontstane bijwerking niet behandelbaar is

ONDERHOUDSFASE

De hoogste verdraagbare dosis wordt de persoonlijke onderhoudsdosis en kan vervangen worden door tweemaal daags één enkele tablet met overeenkomstige sterkte. De dosis mag nooit hoger zijn dan tweemaal daags 1.600 microgram

(Tabletten zijn niet op ware grootte)

1) De titratieverpakking bevat 140 filmomhulde tabletten van 200 microgram. Dit zijn voldoende tabletten om tot en met 800 microgram tweemaal daags op te titreren.
2) De 2 verpakkingen bevatten voldoende tabletten om tot en met 1.600 microgram tweemaal daags op te titreren.
3) De meest voorkomende bijwerkingen die uw patiënt kan ervaren tijdens het gebruik van selexipag zijn: hoofdpijn, diarree, misselijkheid en braken, kaakpijn, spierpijn, pijn in de extremiteiten, gewrichtspijn en overmatig blozen. Voor een volledige lijst van bijwerkingen, zie de SmPC.
4) De dosering van Uptravi moet worden verlaagd naar eenmaal daags bij patiënten met matige leverfunctiestoornis of indien gelijktijdig toegediend met matige CYP2C8-remmers, bijvoorbeeld clopidogrel, deferasinox en teriflunomide. De doseringsfrequentie van Uptravi moet weer terug naar tweemaal daags als de gelijktijdige toediening met de CYP2C8-remmer wordt gestopt.

Raadpleeg de volledige Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voor de dosering, dosisaanpassingen en overige informatie.

HET BEGIN VAN DE BEHANDELING

Behandeling met selexipag mag alleen worden ingesteld en gecontroleerd door een arts die ervaren is in de behandeling van PAH

DE TITRATIEVERPAKKING BEVAT:

- 200 microgram filmomhulde tabletten (140 stuks).
- Een titratiegids voor de patiënt met uitleg over het titratieproces.

Hierin is een titratiedagboek opgenomen waarin de patiënt het aantal tabletten noteert dat per dag ingenomen wordt.

Neem bij het begin van de behandeling de titratiegids met de patiënt door, om er zeker van te zijn dat de patiënt het titratieproces volledig begrijpt en erop voorbereid is dat er bijwerkingen op kunnen treden.

Opmerking: Bij een benodigde dosis hoger dan 800 microgram ontvangt de patiënt nog een titratieverpakking van 200 microgram filmomhulde tabletten (140 stuks) en een verpakking van 800 microgram filmomhulde tabletten (60 stuks) om het aantal in te nemen tabletten te minimaliseren.

COMMUNICATIE MET DE PATIËNT

- Neem tijdens de titratieperiode wekelijks contact op met de patiënt om de voortgang te bespreken en om er zeker van te zijn dat bijwerkingen, gerelateerd aan selexipag, adequaat behandeld worden.
- Bijwerkingen gerelateerd aan selexipag, zoals hoofdpijn, diarree, kaakpijn, misselijkheid, spierpijn, braken, pijn in de extremiteiten, overmatig blozen en gewrichtspijn worden voornamelijk tijdens de titratiefase vaak waargenomen.
- De verwachte bijwerkingen zijn doorgaans van voorbijgaande aard of beheersbaar met symptomatische behandeling.
- In de klinische praktijk zijn gastro-intestinale bijwerkingen waargenomen die reageerden op geneesmiddelen tegen diarree, braken en misselijkheid en/of geneesmiddelen voor functionele gastro-intestinale aandoeningen. Bijwerkingen geassocieerd met pijn worden vaak behandeld met analgetica (zoals paracetamol).

ONDERHOUDSFASE

- Zodra de onderhoudsdosis bekend is, kan één enkele tablet met overeenkomstige sterkte voorgeschreven worden voor de persoonlijke onderhoudsdosis (er zijn tabletten beschikbaar van 200 - 1.600 microgram).
- Hierdoor nemen patiënten ‘s avonds 1 tablet en ‘s morgens 1 tablet in.
- Elke patiënt is verschillend en niet iedereen zal op dezelfde onderhoudsdosis uitkomen.
- De dosis mag nooit hoger zijn dan tweemaal daags 1.600 microgram.

DE ENKELVOUDIGE TABLETTEN VOOR DE ONDERHOUDSDOSIS HEBBEN VERSCHILLENDE KLEUREN EN INSCRIPTIES DIE DE STERKTE AANDUIDEN (IN HONDERDEN MICROGRAMMEN)

(Tabletten zijn niet op ware grootte)

Aanvullende informatie betreff ende selexipag is beschikbaar in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Het additioneel risicominimalisatie-materiaal is online beschikbaar op www.janssen.com/netherlands/onze-geneesmiddelen

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb; website www.lareb.nl.

©Janssen-Cilag B.V., a Johnson & Johnson company – CP-524931 – Approval date: 06-2025

Janssen-Cilag B.V.

Uptravi
200 microgram
filmomhulde tabletten
selexipag

Titratiegids

Starten van de behandeling met Uptravi

Lees de bijgevoegde patiëntenbijsluiter voordat u met de behandeling begint.

Informeer uw arts als u bijwerkingen krijgt. Uw arts kan u dan aanraden om uw dosis Uptravi te veranderen. Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen inneemt. Uw arts kan u dan aanraden om Uptravi slechts één keer per dag in te nemen.

Inhoud

Hoe moet u Uptravi innemen? 4
Hoe moet u de dosis ophogen? 6
Wat houden de stappen in? 8
Wanneer moet u de dosis verlagen? 10
Stap terug 12
Wanneer u overstapt naar uw onderhoudsdosis 14
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 16
Als u stopt met het innemen van dit middel 17
Titratiedagboek 18

Hoe moet u Uptravi innemen?

Uptravi is een geneesmiddel dat elke ochtend en avond moet worden ingenomen voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie, ook wel 'PAH' genoemd.

De aanvangsdosis van Uptravi is 200 microgram **eenmaal 's ochtends en eenmaal 's avonds.**

De eerste dosis van Uptravi moet 's avonds worden ingenomen.

U moet elke dosis met een glas water innemen, bij voorkeur tijdens een maaltijd.

Er zijn 2 behandelingsfasen met Uptravi:

Titratie
De eerste paar weken werkt u samen met uw arts om uit te vinden welke Uptravi-dosis geschikt is voor u. Uw arts kan zeggen dat u van de aanvangsdosis naar een hogere dosis Uptravi moet overstappen. Uw arts kan u ook laten overstappen naar een lagere dosis. Dit proces heet 'titratie'. Hierdoor kan uw lichaam langzaam wennen aan het geneesmiddel.

Onderhoud
Zodra uw arts de dosis heeft gevonden die goed is voor u, zal dit de dosis worden die u blijft innemen. Dit heet de 'onderhoudsdosis'.

Hoe moet u de dosis ophogen?

U start met de dosis van 200 microgram ’s ochtends en ’s avonds. Na overleg met uw arts of verpleegkundige stapt u over naar de volgende hogere dosis.

De eerste verhoogde dosis moet u ’s avonds innemen. Meestal duurt elke stap ongeveer 1 week. Het vinden van de voor u geschikte dosis kan een paar weken duren.

Het doel is de dosis te bereiken die het meest geschikt is voor uw behandeling.

Deze dosis wordt uw onderhoudsdosis.

Iedere patiënt met PAH is anders. **Niet iedereen komt uit op dezelfde onderhoudsdosis.**

Sommige patiënten gebruiken als onderhoudsdosis 200 microgram ’s ochtends en ’s avonds. Andere patiënten bereiken de hoogste dosis van 1.600 microgram ’s ochtends en ’s avonds.

Weer anderen hebben een onderhoudsdosis hier ergens tussenin. Waar het om gaat, is dat u de dosis bereikt die het meest geschikt is voor uw behandeling.

Wat houden de stappen in?

tablet van **200 microgram**

tablet van **800 microgram** (Gebruiken bij stap 5 tot en met 8 om het aantal benodigde tabletten per dosis te verminderen.)

tablet van **200 microgram**

Elke dosisstap duurt ongeveer 1 week.

STARTDOSIS

STAP 1
Ochtend: één tablet van 200 microgram
Avond: één tablet van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 400 microgram)

STAP 2
Ochtend: twee tabletten van 200 microgram
Avond: twee tabletten van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 800 microgram)

STAP 3
Ochtend: drie tabletten van 200 microgram
Avond: drie tabletten van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 1.200 microgram)

STAP 4
Ochtend: vier tabletten van 200 microgram
Avond: vier tabletten van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 1.600 microgram)

STAP 5
Ochtend: één tablet van 800 microgram en één tablet van 200 microgram
Avond: één tablet van 800 microgram en één tablet van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 2.000 microgram)

STAP 6
Ochtend: één tablet van 800 microgram en twee tabletten van 200 microgram
Avond: één tablet van 800 microgram en twee tabletten van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 2.400 microgram)

STAP 7
Ochtend: één tablet van 800 microgram en drie tabletten van 200 microgram
Avond: één tablet van 800 microgram en drie tabletten van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 2.800 microgram)

HOOGSTE DOSIS

STAP 8
Ochtend: één tablet van 800 microgram en vier tabletten van 200 microgram
Avond: één tablet van 800 microgram en vier tabletten van 200 microgram
(totale dagelijkse dosis: 3.200 microgram)

(Tabletten zijn niet op ware grootte.)

Wanneer moet u de dosis verlagen?

Zoals bij alle geneesmiddelen kunt u met Uptravi last krijgt van bijwerkingen wanneer u naar hogere doses overstapt.

Overleg met uw arts of verpleegkundige als u last krijgt van bijwerkingen. Er zijn behandelingen die kunnen helpen om ze te verlichten.

De meest voorkomende bijwerkingen van Uptravi (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn:

• hoofdpijn • diarree • misselijkheid • braken • kaakpijn • spierpijn • pijn in een been • gewrichtspijn • roodheid van het gezicht.

Zie de bijsluiter voor meer informatie en een volledige lijst met bijwerkingen.

Verdraagt u de bijwerkingen niet, zelfs niet nadat uw arts of verpleegkundige heeft geprobeerd ze te behandelen? Dan kan hij of zij u adviseren een stap terug te gaan naar een lagere dosis.

Zegt uw arts of verpleegkundige dat u een stap terug moet naar een lagere dosis? Dan moet u ’s ochtends en ’s avonds één tablet van 200 microgram minder innemen.

U moet alleen een lagere dosis innemen na overleg met uw PAH-arts of -verpleegkundige. Dit proces van dosisverlaging helpt u de dosis te vinden die geschikt is voor u. Dit heet de ‘onderhoudsdosis’.

Stap terug

Elke dosisstap duurt ongeveer 1 week.

2 tablet van **200 microgram**

(Tabletten zijn niet op ware grootte.)

Wanneer u overstapt naar uw onderhoudsdosis

De hoogste dosis die u tijdens de titratie verdraagt, wordt uw **onderhoudsdosis**. Uw onderhoudsdosis is de vaste dosis die u moet blijven innemen. Uw arts of verpleegkundige kan een **enkele tablet met die sterkte** voorschrijven voor uw onderhoudsdosis.

Hierdoor hoeft u 's ochtends en 's avonds slechts één tablet in te nemen in plaats van meerdere tabletten per keer.

Als uw hoogste verdraagbare dosis tijdens de titratie bijvoorbeeld 1.200 microgram 's ochtends en 's avonds was:



Als het nodig is, kan uw arts of verpleegkundige na verloop van tijd uw onderhoudsdosis aanpassen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Bent u vergeten een dosis in te nemen? Dan moet u die dosis innemen zodra u eraan denkt. Daarna blijft u uw tabletten op de gebruikelijke tijdstippen innemen. Is het minder dan 6 uur tot u normaal uw volgende dosis zou innemen? Dan moet u de gemiste dosis overslaan en uw geneesmiddel innemen op het normale tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Uptravi tenzij dat van uw arts of verpleegkundige moet. Als u om welke reden dan ook Uptravi langer dan 3 achtereenvolgende dagen niet inneemt (als u 6 achtereenvolgende doses heeft overgeslagen), **neem dan onmiddellijk contact op met uw PAH-arts of -verpleegkundige. Het kan nodig zijn uw dosis aan te passen om bijwerkingen te voorkomen.**

Uw arts of verpleegkundige kan u laten verdergaan met uw behandeling met een lagere dosis. Daarna kunt u dan geleidelijk weer verhogen tot uw vorige onderhoudsdosis.

Titratiedagboek

Lees de instructies in de bijsluiter goed.

De volgende dagboekpagina's helpen u om bij te houden hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds moet innemen tijdens de titratie.

Schrijf op deze pagina's op hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds inneemt.

Elke stap duurt meestal ongeveer 1 week, tenzij uw arts of verpleegkundige u anders voorschrijft. Als uw titratiestappen langer duren dan 1 week, zijn er extra dagboekpagina's om dit bij te houden.

Neemt u alleen tabletten van 200 microgram in? Gebruik de pagina's 20 tot en met 27 om de eerste weken van de behandeling bij te houden (stappen 1 - 4).

Neemt u tabletten van zowel 200 als 800 microgram in? Gebruik dan de pagina's 30 tot en met 37 (stappen 5 - 8).

Denk eraan dat u regelmatig uw PAH-arts of -verpleegkundige moet spreken.

Noteer hier de instructies van uw arts of verpleegkundige: .....

.....

.....

Telefoonnummer en e-mailadres van de praktijk van de arts: .....

.....

Telefoonnummer van de apotheker: .....

Aantekeningen: .....

.....

WEEK NR. 1

Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u ‘s ochtends en ‘s avonds neemt.
Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	200 microgram	0	#	#	#	#	#	#
Avond	200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

De eerste inname van Uptravi moet ‘s avonds zijn

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u ‘s ochtends en ‘s avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	200 microgram	#	#	#	#	#	#	#
Avond	200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

De eerste inname van een verhoogde dosis Uptravi moet ‘s avonds zijn

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

22

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#
Avond	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

23

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#
Avond	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

Ga direct naar pagina 28 als uw arts tabletten van 800 microgram voorschrijft

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#
Avond	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

Ga direct naar pagina 28 als uw arts tabletten van 800 microgram voorschrijft

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#
Avond	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

Ga direct naar pagina 28 als uw arts tabletten van 800 microgram voorschrijft

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#
Avond	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

Ga direct naar pagina 28 als uw arts tabletten van 800 microgram voorschrijft

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#
Avond	2 200 microgram	#	#	#	#	#	#	#

Ga direct naar pagina 28 als uw arts tabletten van 800 microgram voorschrijft

Heeft u tabletten van 200 microgram en van 800 microgram? Gebruik dan de volgende dagboekpagina's.

Kruis elke dag op de dagboekpagina's aan dat u **één** tablet van 800 microgram 's ochtends en het voorgeschreven aantal tabletten van 200 microgram 's avonds heeft ingenomen.

tablet van **200 microgram**

tablet van **800 microgram**
(Gebruiken bij stap 5 tot en met 8 om het aantal benodigde tabletten per dosis te verminderen.)

Denk eraan dat u regelmatig uw PAH-arts of -verpleegkundige moet spreken.

Noteer hier de instructies van uw arts of verpleegkundige: .....

.....

.....

Telefoonnummer en e-mailadres van de praktijk van de arts: .....

.....

Telefoonnummer van de apotheker: .....

Aantekeningen: .....

.....

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum:

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum:

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum:

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum:

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

WEEK NR. #

Noteer het nummer van de week van de behandeling in de linkerbovenhoek. Noteer elke dag in de vakjes hieronder hoeveel tabletten u 's ochtends en 's avonds neemt. Ik sprak met mijn arts of verpleegkundige op DD/MM/JJ.

Datum: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ochtend	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1
Avond	2 200 microgram 3 800 microgram	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1	# 1

Aantekeningen

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Janssen-Cilag B.V.

©Janssen-Cilag B.V., a Johnson & Johnson company – EM-183834 – Approval date: 06-2025