

Flixabi 100 mg
infliximab

Patiëntenherinneringskaart

Naam patiënt:
Naam arts:
Telefoonnummer arts:

Deze patiëntenherinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens de behandeling met Flixabi.

Toon deze kaart aan alle artsen die bij uw behandeling betrokken zijn.

Lees de bijsluiter van Flixabi zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Aanvangsdatum Flixabi-behandeling:

Huidige toedieningen:

Het is belangrijk dat u en uw arts de merknaam en het partijnummer van uw geneesmiddelen noteren.

Vraag uw arts het type en de datum van de laatste tuberculose (tbc)-controle(s) hieronder te noteren:

Onderzoek:
Datum:
Uitslag:

Zorg ervoor dat u bij elk bezoek aan een zorgverlener ook een lijst meebrengt van alle andere medicijnen die u gebruikt.

Lijst van allergieën:

Lijst van andere geneesmiddelen:

Infecties

Vóór de behandeling met Flixabi

- Licht uw arts in als u een infectie heeft, ook als het er een van zeer geringe ernst is.
- Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tbc heeft gehad, en of u in contact bent gekomen met iemand die tbc had. Uw arts zal u onderzoeken om vast te stellen of u tbc heeft. Vraag uw arts het type en de datum van uw laatste tbc-controle(s) op de kaart te noteren.
- Licht uw arts in als u hepatitis B heeft, of als u weet of vermoedt een drager van het hepatitis B-virus te zijn.

Tijdens de behandeling met Flixabi

- Licht uw arts onmiddellijk in als u tekenen van infectie vertoont. Zulke tekenen kunnen zijn: koorts, vermoeidheid, (hardnekkig) hoesten, kortademigheid, gewichtsverlies, nachtelijk transpireren, diarree, wonden, tandpijn, een brandend gevoel bij het urineren of 'griepachtige' verschijnselen.

Zwangerschap, borstvoeding en vaccinaties

- Als u Flixabi heeft gekregen terwijl u zwanger was of als u borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit aan de arts van uw baby vertelt voordat uw baby een vaccin krijgt. Uw baby mag binnen 12 maanden na de geboorte of als u borstvoeding geeft geen 'levend vaccin' krijgen, zoals BCG (gebruikt om tuberculose te voorkomen) behalve als de arts van uw baby anders aanbeveelt.

Bewaar deze kaart nog 4 maanden na uw laatste dosis Flixabi, of in geval van zwangerschap 12 maanden na de geboorte van uw baby. Er kunnen bijwerkingen optreden tot lang na uw laatste dosis.