

## Belangrijke contactgegevens

Mijn naam:

Mijn contactpersoon bij noodgevallen (naam en telefoon):

Naam arts – voorschrijver venetoclax:

Telefoonnummer arts:

### Meer informatie

- Deze informatiekaart is ook te vinden op [www.abbvie-rmm.nl/ven-pat](http://www.abbvie-rmm.nl/ven-pat)
- Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.
- Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl))

Versie 1.0 oktober 2021.

BCL2-NL-00033-FM



## Belangrijke Veiligheidsinformatie voor Zorgprofessionals over venetoclax en TLS

Deze patiënt gebruikt venetoclax voor CLL, wat tumorlyssyndroom (TLS) kan veroorzaken in de eerste 5 weken van de behandeling.

- ✓ Beoordeel bloedchemie: kalium, urinezuur, fosfor, calcium, en creatinine.
- ✓ Corrigeer direct afwijkingen in de bloedchemie. **Dit kan fataal zijn indien onbehandeld.**
- ✓ Indien u TLS vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met de voorschrijvend arts vermeld op deze kaart.

Raadpleeg alstublieft de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) of neem contact op met AbbVie via 0800-9070 voor meer informatie. Extra exemplaren van de kaart kunt u opvragen via [info.nl@abbvie.com](mailto:info.nl@abbvie.com).

## Patiëntenkaart

### Veiligheidsinformatie over Venclxyto® (venetoclax) voor patiënten met Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

**Let op bij gebruik van venetoclax. Venetoclax is het werkzaam bestanddeel in het medicijn.**

Venetoclax wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met CLL. Deze kaart bevat informatie die u moet weten over tumorlyssyndroom en venetoclax.



- Houd deze patiëntenkaart altijd bij u.
- Laat deze kaart zien aan elke arts die betrokken is bij uw medische zorg of als u naar de Spoedeisende Hulp gaat.
- Gebruik venetoclax altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld.

## Wat moet ik weten over TLS?

Tijdens uw behandeling kunt u hoge concentraties van bepaalde lichaamszouten (zoals kalium en urinezuur) in het bloed ontwikkelen. Dit kan leiden tot een aandoening genaamd tumorlyssyndroom (TLS) in de eerste 5 weken van de behandeling.

### Symptomen van TLS

- koorts of rillingen
- misselijkheid of braken
- verward gevoel
- gevoel van kortademigheid
- onregelmatige hartslag
- donkere of troebele urine
- gevoel van ongebruikelijke moeheid
- spier- of gewrichtspijn
- stuipen of toevallen
- buikpijn en opgezette buik

## Wat moet ik doen als ik TLS symptomen krijg?

Als u tijdens uw behandeling TLS symptomen ervaart, moet u:



**Onmiddellijk uw arts bellen of medische hulp zoeken,**



**Stoppen met het gebruik van venetoclax**

Lees de Patiëntenbijsluiter voor meer informatie.

## Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

## Hoe kan ik mijn risico op het krijgen van TLS verkleinen?



Drink minstens **1.5 tot 2 liter water per dag:**

- ✓ vanaf 2 dagen voor uw eerste dosis,
- ✓ op de dag van uw eerste dosis en
- ✓ elke dag van de eerste 5 weken van uw behandeling. Genoeg water drinken helpt om de verhoogde concentraties bloedzouten af te voeren via de urine.



Ga naar uw **afspraken voor bloedonderzoek**, omdat dit uw arts zal helpen bij het identificeren van TLS.



**Begin vóór uw behandeling met venetoclax** met een ander medicijn dat de toename van het bloedzout (urinezuur) in uw lichaam helpt voorkomen, zoals aangegeven door uw arts.