

Adalimumab Veiligheidsinformatiekaart voor patiënten

Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die u voor en tijdens de behandeling met adalimumab moet weten.

- Houd deze kaart altijd bij u wanneer u adalimumab neemt en tot 4 maanden na uw laatste injectie met adalimumab
- Laat deze kaart zien aan elke arts of zorgverlener die u bezoekt.
- Schrijf informatie over alle testen of behandelingen voor tuberculose die u heeft gehad op deze kaart.
- Niet alle mogelijke bijwerkingen staan op deze kaart. Lees de bijsluiter of raadpleeg uw arts voor meer info over de bijwerkingen.
- Raadpleeg uw arts of verpleegkundige als u vragen heeft over de mogelijke voordelen en bijwerkingen van uw behandeling en voor alle andere informatie over adalimumab.

Inleiding

Adalimumab is een geneesmiddel voor de behandeling van aandoeningen die een deel van het immuunsysteem beïnvloeden, zoals artritis en psoriasis. Hoewel adalimumab effectief kan zijn bij de behandeling van deze ziektes, kunnen sommige patiënten een of meerdere bijwerkingen ervaren.

Deze kaart informeert u over bepaalde ernstige bijwerkingen waar u last van kunt krijgen als u adalimumab neemt. Sommige ernstige bijwerkingen die u zou kunnen ervaren zijn infecties, kanker en aandoeningen van het zenuwstelsel.

Lees voor een volledige lijst van bijwerkingen de adalimumab bijsluiter.

Voor behandeling met adalimumab

- Vertel uw arts over al uw gezondheids problemen en alle geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel uw arts als u
- Een infectie of symptomen van een infectie heeft, zoals koorts, wondjes, gevoel van vermoeidheid of gebitsproblemen.
- Tuberculose heeft of in contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft.
- Kanker heeft (gehad)
- Last heeft van gevoelloosheid of tintelingen of een probleem heeft dat uw zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple sclerose.

Uw arts moet u controleren op tekenen van tuberculose vooraleer u start met adalimumab. Als u tuberculose heeft, moet u hiervoor behandeld worden voordat u met adalimumab start.

Vaccinaties voor u

Vaccinaties zijn toegestaan behalve met levende vaccins.

Vaccinaties voor uw pasgeboren kind (indien van toepassing)

Als u adalimumab krijgt tijdens de zwangerschap, informeer dan de arts van uw kind voordat uw kind gevaccineerd wordt. Uw kind mag geen

levende vaccins ontvangen zoals BCG (ter voorkoming van tuberculose), binnen 5 maanden na uw laatste adalimumab-injectie tijdens de zwangerschap.

Tijdens behandeling met adalimumab

Houd uw arts op de hoogte over hoe adalimumab bij u werkt

Het is belangrijk om uw arts meteen te bellen zodra u eventuele ongebruikelijke symptomen bemerkt. Dit helpt ervoor te zorgen dat u onmiddellijk de juiste zorg krijgt. Tevens verkleint het de kans dat een bijwerking erger wordt.

Als uw arts bevestigt dat u een bijwerking heeft, zal uw arts beslissen of u met adalimumab moet stoppen of doorgaan. Bijwerkingen kunnen optreden na de laatste dosis adalimumab. U moet ongebruikelijke symptomen melden tot 4 maanden na uw laatste injectie met adalimumab.

Vertel uw arts over alle nieuwe medische aandoeningen die u heeft, geneesmiddelen die u gebruikt, ingrepen of operaties die u gepland heeft.

Bijwerkingen

Sommige mensen die adalimumab gebruiken kunnen ernstige bijwerkingen krijgen, waaronder

Infecties

Adalimumab kan helpen bij ontstekingsziekten, door een deel van het immuunsysteem te blokkeren. Maar datzelfde deel van het immuunsysteem helpt ook om infecties te bestrijden. Dat betekent dat adalimumab u vatbaarder kan maken voor infecties of reeds aanwezige infecties kan verergeren.

Kanker

Adalimumab kan het risico op het ontwikkelen van bepaalde kankers doen toenemen.

Problemen met het zenuwstelsel

Adalimumab kan het risico op het ontwikkelen van problemen met het zenuwstelsel verhogen, of al bestaande problemen met het zenuwstelsel verergeren, waaronder multiple sclerose.

Bel meteen uw arts als u een van de volgende symptomen van een mogelijk ernstige bijwerking van adalimumab heeft, zodat u onmiddellijk medische verzorging krijgt:

Infecties

Koorts; rillingen; ongebruikelijk zweten; zich onwel voelen; vermoeidheid; misselijkheid of braken; diarree; maagpijn; verlies van eetlust; gewichtsverlies; hoest, bloed of slijm ophoesten; kortademigheid; plasproblemen; huidzweetjes; wondjes; spierpijn; gebitsproblemen.

Kanker:

Nachtelijk zweten; zwelling van de lymfeklieren in de nek, oksels, lies of andere gebieden; gewichtsverlies; nieuwe huidletsels of verandering in huidletsels (zoals huidvlekken of sproeten); ernstige onverklaarbare jeuk

Problemen met het zenuwstelsel:

Gevoelloosheid of tintelingen; veranderd zicht; spierzwakte; onverklaarde duizeligheid.

Vertel uw arts als u last krijgt van andere ongebruikelijke symptomen die niet vermeld staan in de bijsluiter.

Informatie voor u en uw beroepsbeoefenaars uit de gezondheidszorg

Productnaam: _____

Uw naam: _____

Naam van de voorschrijvende arts: _____

Telefoon: _____

Indicatie: _____

Datum van uw eerste adalimumab injectie: _____

Dosis van uw adalimumab injectie: _____

Datum van uw laatste adalimumab injectie: _____

Tuberculose (TB) testen en behandeling

Kruis het vakje aan als u ooit op TB getest bent:

JA (Vraag uw arts als u niet zeker bent)

Kruis het vakje aan als de uitslag voor een test voor TB ooit positief was:

JA (Vraag uw arts als u niet zeker bent)

Kruis het vakje aan als u ooit geneesmiddelen gebruikt heeft om TB te behandelen of te voorkomen:

JA (Vraag uw arts als u niet zeker bent)

Lees de adalimumab bijsluiter voor meer informatie. Als u nog verdere vragen heeft, vraag dan uw arts.

Adalimumab Veiligheidsinformatiekaart voor kinderen

Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die u voor en tijdens de behandeling van uw kind met adalimumab moet weten.

- Houd deze kaart altijd bij u wanneer uw kind adalimumab neemt en tot 4 maanden na de laatste injectie van uw kind met adalimumab
- Laat deze kaart zien aan elke arts of zorgverlener die uw kind bezoekt.
- Schrijf informatie over alle testen of behandelingen voor tuberculose die uw kind heeft gehad op deze kaart.
- Niet alle mogelijke bijwerkingen staan op deze kaart. Lees de bijsluiter of raadpleeg uw arts voor meer info over de bijwerkingen.
- Raadpleeg de arts of verpleegkundige van uw kind als u vragen heeft over de mogelijke voordelen en bijwerkingen van de behandeling en voor alle andere informatie over adalimumab.

Inleiding

Adalimumab is een geneesmiddel voor de behandeling van aandoeningen die een deel van het immuunsysteem beïnvloeden, zoals artritis en psoriasis. Hoewel adalimumab effectief kan zijn bij de behandeling van deze ziektes, kunnen sommige patiënten een of meerdere bijwerkingen ervaren.

Deze kaart informeert u over bepaalde ernstige bijwerkingen waar uw kind last van kunt krijgen terwijl het adalimumab neemt. Sommige ernstige bijwerkingen die uw kind zou kunnen ervaren zijn bijvoorbeeld infecties, kanker en aandoeningen van het zenuwstelsel.

Lees voor een volledige lijst van bijwerkingen de adalimumab bijsluiter.

Voor behandeling met adalimumab

Vertel de arts van uw kind over alle gezondheidsproblemen en alle geneesmiddelen die hij of zij gebruikt. Vertel uw arts als uw kind

- Een infectie of symptomen van een infectie heeft, zoals koorts, wondjes, gevoel van vermoeidheid of gebitsproblemen.
- Tuberculose heeft of in contact is geweest met iemand die tuberculose heeft.

- Kanker heeft (gehad)

- Last heeft van gevoelloosheid of tintelingen of een probleem heeft dat het zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple sclerose.

Uw arts moet uw kind controleren op tekenen van tuberculose vooraleer te starten met adalimumab. Als uw kind tuberculose heeft, dient het eerst hiervoor behandeld te worden voordat hij of zij met adalimumab start.

Vaccinaties voor uw kind

Vaccinaties zijn toegestaan behalve met levende vaccins.

Vaccinaties voor de pasgeboren baby van uw kind (indien van toepassing)

Als uw kind tijdens haar zwangerschap adalimumab krijgt, informeer dan de arts van haar baby voordat de baby gevaccineerd wordt. De baby van uw kind mag geen levende vaccins ontvangen zoals BCG (ter voorkoming van tuberculose), binnen 5 maanden na de laatste adalimumab-injectie van uw kind tijdens de zwangerschap

Tijdens behandeling met adalimumab

Houd uw arts op de hoogte over hoe adalimumab bij uw kind werkt.

Het is belangrijk om uw arts meteen te bellen zodra u eventuele ongebruikelijke symptomen bemerkt. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw kind onmiddellijk de juiste zorg krijgt. Tevens verkleint het de kans dat een bijwerking erger wordt.

Als de arts van uw kind bevestigt dat uw kind een bijwerking heeft, zal hij of zij beslissen of u met adalimumab moet stoppen of doorgaan. U moet ongebruikelijke symptomen melden tot 4 maanden na de laatste injectie van uw kind met adalimumab.

Vertel uw arts over alle nieuwe medische aandoeningen die uw kind heeft, geneesmiddelen die uw kind gebruikt, ingrepen of operaties die uw kind gepland heeft.

Bijwerkingen

Sommige mensen die adalimumab gebruiken kunnen ernstige bijwerkingen krijgen, waaronder

Infecties

Adalimumab kan helpen bij ontstekingsziekten, door een deel van het immuunsysteem te blokkeren. Maar datzelfde deel van het immuunsysteem helpt ook om infecties te bestrijden. Dat betekent dat adalimumab uw kind vatbaarder kan maken voor infecties of reeds aanwezige infecties kan verergeren.

Kanker

Adalimumab kan het risico op het ontwikkelen van bepaalde kankers doen toenemen.

Problemen met het zenuwstelsel

Adalimumab kan het risico op het ontwikkelen van problemen met het zenuwstelsel verhogen, of al bestaande problemen met het zenuwstelsel verergeren, waaronder multiple sclerose.

Bel meteen de arts van uw kind als uw kind een van de volgende symptomen van een mogelijk ernstige bijwerking van adalimumab heeft, zodat uw kind onmiddellijk medische verzorging krijgt:

Infecties

Koorts; rillingen; ongebruikelijk zweten; zich onwel voelen; vermoeidheid; misselijkheid of braken; diarree; maagpijn; verlies van eetlust; gewichtsverlies; hoest, bloed of slijm ophoesten; kortademigheid; plasproblemen; huidzweertjes; wondjes; spierpijn; gebitsproblemen.

Kanker:

Nachtelijk zweten; zwelling van de lymfeklieren in de nek, oksels, lies of andere gebieden; gewichtsverlies; nieuwe huidletsels of verandering in huidletsels (zoals huidvlekken of sproeten); ernstige onverklaarbare jeuk.

Problemen met het zenuwstelsel:

Gevoelloosheid of tintelingen; veranderd zicht; spierzwakte; onverklaarde duizeligheid.

Vertel de arts van uw kind als uw kind last krijgt van andere ongebruikelijke symptomen die niet vermeld staan in de bijsluiter.

Productnaam: _____

Naam van uw kind: _____

Naam van de voorschrijvende arts: _____

Telefoon: _____

Indicatie: _____

Datum van de eerste adalimumab injectie: _____

Dosis van de adalimumab injectie: _____

Datum van de laatste adalimumab injectie: _____

Tuberculose (TB) testen en behandeling

Kruis het vakje aan als uw kind ooit op TB getest is:

JA (Vraag uw arts als u niet zeker bent)

Kruis het vakje aan als de uitslag voor een test voor TB bij uw kind ooit positief was:

JA (Vraag uw arts als u niet zeker bent)

Kruis het vakje aan als uw kind ooit geneesmiddelen gebruikt heeft om TB te behandelen of te voorkomen:

JA (Vraag uw arts als u niet zeker bent)

Lees de adalimumab bijsluiter voor meer informatie. Als u nog verdere vragen heeft, vraag dan uw arts.

Notities (Opmerkingen of vragen voor uw arts)
