


BAQSIMI Demonstrator Labels 01-0332-09-NL

Demonstrator Box Label

AMPHASTAR
PHARMACEUTICALS





01-0332-09-FR-NL-BE 01/2024 © Amphastar 2024. All rights reserved.

Bevat geen medicatie
Enthält kein Arzneimittel
Ne contient pas de médicament

DISPOSITIF DE DÉMONSTRATION
SCHULUNGSAPPLIKATOR
DEMOSTRATIE APPARAAT

 **AMPHASTAR**
PHARMACEUTICALS

Ne contient pas de médicament
Enthält kein Arzneimittel
Bevat geen medicatie

Tube Label

Dispositif de démonstration
**NE CONTIENT PAS
DE MÉDICAMENT**

Demonstratie apparaat
**BEVAT GEEN
MEDICATIE**

Schulungsapplikator
**ENTHÄLT KEIN
ARZNEIMITTEL**

Dispositif de démonstration
**NE CONTIENT PAS
DE MÉDICAMENT**

Demonstratie apparaat
**BEVAT GEEN
MEDICATIE**

Schulungsapplikator
**ENTHÄLT KEIN
ARZNEIMITTEL**

GM-14323
M/N: 01-0332-09
B/N: 22120001



Device Label

Dispositif de démonstration
NE CONTIENT PAS DE MÉDICAMENT

Demonstratie apparaat
BEVAT GEEN MEDICATIE

Schulungsapplikator
ENTHÄLT KEIN ARZNEIMITTEL



GM-14323
M/N: 01-0332-09
B/N: 22120001



URL : www.baqsimi.eu

Country : NL

Language : NL

True source : <https://aws.amphastar.com/index.php/s/aYbjK6QTke4S2MC>

-1m31sec



-1m28sec



Stem: Welkom. Vandaag laten we je zien hoe je Baqsimi moet gebruiken.

-1m24sec



Stem: Laat je familieleden, vrienden of collega's zien waar je Baqsimi bewaart en leg uit wanneer en hoe ze het moeten gebruiken.

-1m16sec




Stem: Het is belangrijk dat zij weten hoe Baqsimi werkt voor als je het echt nodig hebt.

-1m12sec



Stem: Bewaar Baqsimi in de met folie omwikkelde koker, tot het gebruikt moet worden.

-1m06sec



Stem: Open het deksel en haal de verpakking voor éénmalig gebruik uit de koker.

-1m00sec



Stem: Let op. Druk de zuiger niet in vóór het inbrengen in de neus. Anders gaat de enkele dosis in de verpakking verloren.

-0m53sec



Stem: Hou de verpakking voor éénmalig gebruik vast tussen de vingers en de duim.
Druk de zuiger niet in voor het inbrengen.

-0m47sec



Stem: Breng de tip voorzichtig in een neusgat tot de vinger de buitenkant van de neus raakt.

-0m41sec




Stem: Druk de zuiger helemaal in met de duim. De dosis is volledig toegediend als de groene lijn op de zuiger niet langer zichtbaar is.

-0m34sec



Stem: Als de persoon met de lage bloedsuiker bewusteloos is, draai de persoon dan op zijn of haar zijde na het geven van Baqsimi.

-0m27sec



Stem: Na het geven van de dosis, bel onmiddellijk voor medische hulp.

-0m22sec



Stem: Moedig de persoon met de lage bloedsuiker aan om zo snel mogelijk iets met veel suiker te eten of te drinken, zoals snoep of vruchtensap.

-0m13sec



Stem: Gooi de gebruikte verpakking en de koker weg.

-0m10sec

Baqsimi

3 mg neuspoeder in een container met een enkele dosis (glucagon)

Voor meer informatie kun je ook bellen naar
Amphastar - Medische Informatie Service:
+31 85 064 4521

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Stem: Voor vragen of meer informatie over BAQSIMI, neem je contact op met je zorgverlener.
Deel deze video met mensen op wie je rekt, zodat jij en zij voorbereid zijn.



3 mg, neuspoeder in verpakking voor éénmalig gebruik
(glucagon)

RISICOMINIMALISATIE-MATERIAAL MET INFORMATIE OVER HET TRAININGSMODEL VAN BAQSIMI 3MG, NEUSPOEDER IN VERPAKKING VOOR EENMALIG GEBRUIK (GLUCAGON).

Indicatie

Baqsimi is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hypoglykemie bij volwassenen, adolescenten en kinderen in de leeftijd van 4 jaar en ouder met diabetes mellitus.


Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico's van het Baqsimi neuspoeder (glucagon) te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

TRAININGSMODEL

Belangrijke informatie:

- Dit trainingsmodel is ontwikkeld om de belangrijkste toedieningsstappen van Baqsimi te oefenen (zie verderop in deze brochure de informatie over het toedienen van het product).
- De belangrijkste verschillen tussen het trainingsmodel en het echte product zijn:
 - Het trainingsmodel bevat geen medicatie
 - Het trainingsmodel is alleen voor demonstratie doeleindenStop het trainingsmodel niet in een neusgat om hygiënische redenen

Resetten van het trainingsmodel:



- Houd de basis van de tip vast tussen de vingers. Draai de romp van het trainingsmodel totdat de zuiger reset en de groene lijn weer zichtbaar is.

In tegenstelling tot het trainingsmodel kan elke Baqsimi verpakking voor éénmalig gebruik slechts 1 keer gebruikt worden.

WAT IS BAQSIMI?

Baqsimi is een vorm van glucagon die via een pufje in de neus kan worden toegediend.

Wanneer wordt Baqsimi gebruikt?

- Baqsimi wordt gebruikt wanneer iemand in een noodsituatie een zeer lage bloedsuiker (ernstige hypoglykemie) heeft en niet in staat is om te eten of te drinken en dus hulp van iemand anders nodig heeft
- Het is belangrijk dat mensen om u heen de mogelijke tekenen van een zeer lage bloedsuiker herkennen, zodat ze zijn voorbereid om u te helpen



Zie andere kant voor meer informatie over het toedienen van het product.



3 mg, neuspoeder in verpakking voor éénmalig gebruik
(glucagon)

Informatie voor de patiënt, ouders en verzorgers van de patiënt. Let op bij het gebruik van Baqsimi 3 mg, neuspoeder in verpakking voor éénmalig gebruik (glucagon)

Mensen met diabetes die Baqsimi voorgeschreven hebben gekregen, moeten:

- Baqsimi ten allen tijde bij zich dragen
- Anderen laten zien hoe het gebruikt moet worden
- Aan anderen laten weten waar ze Baqsimi bewaren

Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op www.baqsimi.eu
Lees de bijsluiter en gebruikershandleiding voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

**Mogelijke tekenen van een zeer lage
bloedsuiker (ernstige hypoglykemie)**

kunnen zijn:

- Duizeligheid
- Niet wakker zijn of in de war zijn
- Flauwvallen of minder helder zijn
- Wisselend gevoel (o.a. angstig zijn)
- Niet goed kunnen bewegen
- Beven of zweten
- Niet goed kunnen concentreren
- Wazig zien
- Honger hebben
- Moe of slaperig zijn


HET TOEDIENEN VAN BAQSIMI

**Lees de bijsluiter en gebruikershandleiding
voordat u Baqsimi gebruikt**

- Laat uw familie en vrienden zien waar u Baqsimi bewaart. Leg hen uit hoe ze het moeten gebruiken. **Zij moeten weten hoe ze het moeten gebruiken vóórdat u het nodig heeft**
- Bewaar de verpakking voor éénmalig gebruik in de met folie onwikkelde koker totdat het gebruikt moet worden. Als de koker open is geweest, kan vocht in de verpakking terecht zijn gekomen en kan het zijn dat het geneesmiddel niet goed werkt.
- Druk de zuiger niet in totdat u klaar bent om het te gebruiken. Anders gaat de dosis verloren.

Lees de **bijsluiter en de gebruikshandleiding** volledig door voor het gebruik van het geneesmiddel. De bijsluiter en de gebruikshandleiding zitten in de verpakking van het geneesmiddel.

Geven van de dosis



- Houd de verpakking voor eenmalig gebruik vast tussen de vingers en de duim. **Druk de zuiger niet in voor het inbrengen**



- Breng de tip voorzichtig in een neusgat tot de vinger de buitenkant van de neus raakt



- Druk de zuiger helemaal in met uw duim. De dosis is volledig toegediend **als de groene lijn niet langer zichtbaar is** op de zuiger

Op www.baqsimi.eu, is een Baqsimi-instructievideo te bekijken. Deze instructievideo laat stap-voor-stap zien hoe u het beste Baqsimi kunt toedienen.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen.

Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn..