

## Glasdegib ▼ waarschuwingskaart

### Informatie voor de mannelijke patiënt

Let op bij gebruik van glasdegib. Glasdegib is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn het gaat.

**Voor een ongeborn kind kan het in het sperma aanwezige glasdegib schadelijk zijn of de dood tot gevolg hebben.**

### Mannelijke patiënten die glasdegib innemen moeten:

- Tijdens de behandeling met glasdegib en gedurende 30 dagen na de laatste dosis **altijd een condoom gebruiken (met een zaaddodend middel, indien beschikbaar)**, ook na een vasectomie, wanneer ze geslachtsgemeenschap hebben met een vrouwelijke partner.
- Tijdens de behandeling met glasdegib en gedurende 30 dagen na de laatste dosis **geen sperma doneren.**
- **Advies inwinnen over effectief behoud van vruchtbaarheid** alvorens de behandeling met glasdegib te starten.
- **Vermoedelijke zwangerschappen** bij een zorgverlener melden.

## **Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb**

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn

### **Meer informatie**

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.  
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).