

bloedingen onder de huid, donkergekleurde ontlasting (bloed in de ontlasting), bloed in de urine, bloedneus, duizeligheid, vermoeidheid, bleek zien, zwakte, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van bloed of braken van bloed.

- Als u last heeft van bloedingen die niet vanzelf stoppen, **zoek dan onmiddellijk medische hulp**.
- Als u/de patiënt een operatie of een invasieve procedure moet ondergaan, vertel de behandelend arts dan dat u/de patiënt Apixaban Aurobindo gebruikt.

Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

- Apixaban Aurobindo is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van factor Xa.
- Apixaban Aurobindo kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met Apixaban Aurobindo direct gestaakt worden.

- Bij de behandeling met Apixaban Aurobindo is routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirurgie (protrombinetijd (PT) internationale genormaliseerde ratio (INR) en een geactiveerde partiële tromboplastinetijd (PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken. Voor volwassenen is er een middel beschikbaar om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren. De veiligheid en werkzaamheid hiervan zijn echter niet vastgesteld bij pediatrische patiënten (raadpleeg de Samenvatting van de Productkenmerken van andexanet alfa).



Apixaban Aurobindo

Patiëntenkaart

Het is belangrijk dat u/het kind/de verzorger deze kaart altijd bij u/zich draagt.

Laat deze kaart zien aan de apotheker, de tandarts en andere medische zorgverleners vóór de behandeling.

Ik ben onder behandeling voor antistolling middels apixaban ter preventie van bloedstolsels.

Gelieve dit gedeelte in te vullen of vraag de arts om dit te doen

Naam:

Geboortedatum:

Indicatie:

Gewicht:

Dosering: mg tweemaal daags

Naam van de arts:

Telefoonnummer van de arts:

Informatie voor patiënten/verzorgers

- Gebruik/geef Apixaban Aurobindo altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis in de ochtend heeft gemist, neem/geef deze dan zodra u eraan denkt. Deze dosis kan tegelijk met de avonddosis worden ingenomen/gegeven. Een gemiste avonddosis mag alleen nog dezelfde avond worden ingenomen/gegeven. Neem/geef niet de volgende ochtend twee doses, maar houdt u daarna weer aan het gebruikelijke doseerschema van tweemaal daags zoals aanbevolen. Stop niet met het innemen/geven van Apixaban Aurobindo zonder overleg met de arts, omdat u/de patiënt risico loopt op een beroerte of andere problemen als gevolg van het ontstaan van een beroerte/bloedstolsel.
- Apixaban Aurobindo helpt het bloed dunner te maken. Dit kan echter zorgen voor een verhoging van het risico op bloedingen.
- Klachten en verschijnselen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of