

**Kruis de vakjes aan die van toepassing zijn. Bewaar de ingevulde checklist in het patiëntendossier!**

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>IDENTIFICATIE PATIËNT:</u><br> | <u>GEGEVENS VOORSCHRIJVER:</u><br>Naam voorschrijver: _____<br>Handtekening voorschrijver: _____<br>Datum: _____ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zijn andere antifungale middelen geschikt voor gebruik? Ja ☐ Nee ☐



Micafungine mag alleen worden gebruikt als andere antifungale middelen niet in aanmerking komen.

Controleer of een van de volgende voorwaarden van toepassing is op uw patiënt:

- Ernstig gestoorde leverfunctie Ja ☐ Nee ☐
- Chronische leverziekten waarvan bekend is dat ze preneoplastische aandoeningen vertegenwoordigen, zoals: gevorderde leverfibrose, virale hepatitis, congenitale enzymdefecten, cirrose, neonatale leverziekte Ja ☐ Nee ☐
- Gelijktijdige behandeling met geneesmiddelen die hepatoxische en/ of genotoxische eigenschappen hebben Ja ☐ Nee ☐

Patiënten dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd op leverschade. Vroegtijdige stopzetting van micafungine in aanwezigheid van significant en aanhoudend verhoogde ALAT/ASAT-waarden wordt aanbevolen om het risico op adaptieve regeneratie en potentieel daaropvolgende levertumorfvorming te beperken.

- Voorgeschiedenis van hemolyse of hemolytische anemie Ja ☐ Nee ☐

Patiënten bij wie klinisch of in het laboratorium bewijzen worden aangetroffen voor hemolyse tijdens de behandeling met micafungine dienen nauwlettend te worden gevolgd om na te gaan of er geen verslechtering van deze aandoeningen optreedt en er dient een baten/risico-evaluatie van voortzetting van micafungine plaats te vinden.

- Voorgeschiedenis van nierfunctiestoornissen Ja ☐ Nee ☐

Patiënten dienen nauwlettend te worden gecontroleerd op verslechtering van de nierfunctie

Indien een van de vragen (1-5) met “Ja” is beantwoord, schrijf micafungine alleen voor na een zorgvuldige baten/risico-evaluatie