

## PATIËNTINFORMATIEKAART

### Patiëntinformatiekaart

**Rivaroxaban Intas 2,5 mg, filmomhulde tabletten** (voorgeschreven dosis aanvinken)

**Rivaroxaban Intas 10 mg, filmomhulde tabletten** (voorgeschreven dosis aanvinken)

**Rivaroxaban Intas 15 mg, filmomhulde tabletten** (voorgeschreven dosis aanvinken)

**Rivaroxaban Intas 20 mg, filmomhulde tabletten** (voorgeschreven dosis aanvinken)

- ◆ **Draag dit kaartje altijd bij u.**
- ◆ **Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat u wordt behandeld.**

**Ik word behandeld met het antistollingsmiddel Rivaroxaban Intas (rivaroxaban).**

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Gewicht:

Andere geneesmiddelen / ziekten:

### **Waarschuw bij noodgevallen:**

Naam arts:

Telefoon arts:

Stempel arts:

### **Waarschuw ook:**

Naam:

Telefoon:

Relatie:

### **Informatie voor zorgverleners:**

- ◆ INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze niet betrouwbaar zijn voor de antistollingsactiviteit van Rivaroxaban Intas.

### **Wat moet ik weten over Rivaroxaban Intas?**

- ◆ Rivaroxaban Intas maakt het bloed dunner, zodat u geen gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- ◆ Rivaroxaban Intas moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts. Voor de beste bescherming tegen bloedpropjes **mag u geen enkele dosis overslaan.**
- ◆ Stop niet met het innemen van Rivaroxaban Intas zonder eerst met uw arts te overleggen. Anders is het risico groter dat u bloedpropjes krijgt.
- ◆ Gebruikt u naast Rivaroxaban Intas nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw zorgverlener voordat u met Rivaroxaban Intas begint.
- ◆ Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban Intas gebruikt, voordat u een operatie krijgt of voordat u een operatie krijgt waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

### **Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?**

Bij het innemen van een bloedverdunner, zoals Rivaroxaban Intas, is het belangrijk dat u weet wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Een bloeding komt het meest voor. Heeft u een risico op bloedingen? Bespreek dit eerst met uw arts, voordat u begint met het innemen van Rivaroxaban Intas. Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of tekenen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- ◆ pijn
- ◆ zwelling of ongemak
- ◆ hoofdpijn, zich duizelig of zwak voelen
- ◆ blauwe plekken die anders zijn dan normaal, bloedneus, bloeding van tandvlees, snijwondjes die lang blijven bloeden
- ◆ u bent heviger ongesteld dan normaal of u heeft vaginale bloedingen die heviger zijn dan normaal

- ◆ bloed in uw plas (urine) waardoor die roze of bruin is, rode of zwarte poep (stoelgang)
- ◆ bloed ophoesten, of braken van bloed of iets anders dat de kleur heeft van koffiedik.

**Hoe moet ik Rivaroxaban Intas innemen?**

- ◆ Voor de beste bescherming tegen bloedpropjes moet u Rivaroxaban Intas als volgt innemen:
  - 2,5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
  - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
  - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
  - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen