

Informatie voor de patiënt en ouders en verzorgers van de patiënt

Let op bij gebruik van
Ogluo[®] 0,5 mg oplossing voor injectie
in voorgevulde pen (glucagon)

Ogluo[®] 1 mg oplossing voor injectie
in voorgevulde pen (glucagon)

Over Ogluo® voorgevulde pen en deze instructies

- De Ogluo® voorgevulde pen wordt gebruikt ter behandeling van zeer lage bloedsuiker (ook bekend als ernstige hypoglykemie) bij volwassenen, tieners en kinderen vanaf 2 jaar met diabetes.
- In deze instructies voor toediening wordt uitgelegd hoe de Ogluo® voorgevulde pen gebruikt moet worden.
- Lees de bijsluiter voor de volledige productinformatie en bekijk de instructievideo. Beide zijn beschikbaar op: www.Ogluo.info
- Deel de informatie in deze folder met uw familieleden of vrienden/collega's van wie u denkt dat ze u mogelijk moeten helpen als uw bloedsuiker zeer laag is en u hulp nodig hebt.

Toediening


- Bewaar deze instructies voor toediening ook nadat uw zorgverlener u heeft uitgelegd hoe u de Ogluo® voorgevulde pen moet gebruiken. (u moet deze later mogelijk opnieuw raadplegen).
- Lees voor het gebruik de bijsluiter.
- Haal de Ogluo® voorgevulde pen niet uit de folieverpakking voordat u deze gaat gebruiken.
- Let er op dat elke pen of spuit slechts één keer gebruikt kan worden.
- Test de Ogluo® voorgevulde pen niet voor gebruik.
- Let er op dat elke pen slechts één keer gebruikt kan worden.
- Als er binnen 15 minuten geen effect is, kan het noodzakelijk zijn om een extra dosis toe te dienen met een nieuwe voorgevulde pen in afwachting van de medische hulpdienst.
- Deze instructies voor toediening kunnen worden gebruikt om de mensen om u heen te leren hoe ze de Ogluo® voorgevulde pen correct kunnen gebruiken.
- De onderstaande figuur geeft een korte uitleg over het correcte gebruik van de Ogluo® voorgevulde pen.

1. Voorbereiden

Scheur de zak open langs de stippelijjn. Verwijder de pen.




Verwijder de rode dop.



Kies de injectieplaats en ontbloot de huid.

Voorraanzicht Achteraanzicht



Onderbuik, buitenkant
dijbeen of buitenkant
bovenarm

2. Injecteren

Druk de pen op de huid om te beginnen.



Verwijder de pen in een recht beweging van de injectieplaats.

Houd de pen 5 seconden op de huid gedrukt.



Houd de pen 5 seconden op de huid gedrukt.

Wacht tot het venster rood kleurt.



3. Assisteren

Draai de patiënt op zijn/haar zij. Bell de medische hulpdiensten.



Na de injectie wordt de naald afgeschermd door de gele naaldbeschermer.

Bijwerkingen melden

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld aan Tetris Pharma B.V. op het volgende adres www.medinfo@Tetrispharma.com

Deze informatie is ook terug te vinden op <https://www.ogluo.info> via het scannen van

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.



Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (<https://www.cbg-meb.nl>).

OGLUONLRMM0001.4

Maart 2023