

## WAARSCHUWINGSKAART VOOR DE PATIËNT

### Apixaban Viatris (apixaban)

#### Waarschuwingkaart voor de patiënt

Het is belangrijk dat u deze kaart altijd bij u heeft

Laat deze kaart zien aan uw apotheker, uw tandarts en alle andere medische zorgverleners waar u wordt behandeld.

**Ik wordt behandeld voor antistolling met Apixaban Viatris (apixaban) om te zorgen dat ik geen bloedstolsels krijg**

#### Vul dit gedeelte in of vraag uw arts dit te doen

Naam:

Geboortedatum:

Indicatie:

Dosering: .....mg 2 keer per dag

Naam van de arts:

Telefoonnummer van de arts:

#### Informatie voor patiënten

- Gebruik Apixaban Viatris altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis heeft gemist, neem deze dan zodra u eraan denkt. Houdt u zich daarna weer aan uw normale doseerschema.
- Stop niet met het innemen van Apixaban Viatris zonder overleg met uw arts. U heeft namelijk kans op een beroerte of andere problemen door het ontstaan van een bloedstolsel.
- Apixaban Viatris helpt om uw bloed dunner te maken. De kans is wel groter dat u bloedingen krijgt.
- Tekenen en klachten van bloedingen kunnen zijn: blauwe plekken of bloedingen onder de huid, donkere poep (ontlasting) (bloed in de ontlasting), bloed in uw plas (urine), bloedneus, duizelig zijn, moe zijn, er bleek uitzien, zwakte, plotselinge erge hoofdpijn, ophoesten van bloed of overgeven van bloed.
- Heeft u last van bloedingen die niet vanzelf stoppen? **Zoek dan direct medische hulp.**
- Moet u een operatie of een grote behandeling krijgen? Vertel uw arts dan dat u Apixaban Viatris gebruikt.

#### Informatie voor medische zorgverleners

- Apixaban Viatris (apixaban) is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van factor-Xa.
- Apixaban Viatris kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met Apixaban Viatris direct gestaakt worden.
- Bij de behandeling met Apixaban Viatris is routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirurgie (protrombinetijd (PT), internationale genormaliseerde ratio (INR) en een en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken.
- Een middel om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren is beschikbaar.