

# PATIËNTENINFORMATIEKAART

**MADDOX**  
Pharma Swiss

- Tenarox<sup>®</sup>**  10 mg  
 15 mg  
 20 mg

- Draag dit kaartje altijd bij u.
- Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat een behandeling plaatsvindt.

## Ik word behandeld met het antistollingsmiddel Tenarox (rivaroxaban).

Naam: .....

Adres: .....

Geboortedatum: .....

Gewicht: .....

Andere geneesmiddelen/aandoeningen: .....

### Waarschuw bij noodgevallen:

Naam arts: .....

Telefoon arts: .....

Stempel arts: .....

### Waarschuw ook:

Naam: .....

Telefoon: .....

Relatie: .....

### Informatie voor zorgverleners:

- INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van Tenarox.

### Wat moet ik weten over Tenarox?

- Tenarox verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- Tenarox moet precies worden ingenomen zoals voorschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels **mag u geen enkele dosis over slaan**.
- Stop niet met het innemen van Tenarox zonder eerst met uw arts te overleggen omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.
- Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Tenarox begint.
- Vertel uw zorgverlener dat u Tenarox gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

### Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?

Bij inname van een bloedverdunner, zoals Tenarox, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke

bijwerkingen ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Tenarox zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken.

Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- pijn
- zwelling of ongemak
- hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloeding van tandvlees, snijwondjes die lang blijven bloeden
- menstruatie of vaginale bloeding die heviger is dan gewoonlijk
- bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang
- bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

### Hoe moet ik Tenarox innemen?

- Voor een optimale bescherming moet Tenarox als volgt worden ingenomen:
  - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
  - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
  - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen

# PATIENT ALERT CARD



- Tenarox<sup>®</sup>**  10 mg  
 15 mg  
 20 mg

- Keep this card with you at all times.
- Present this card to every physician or dentist prior to treatment.

## I am under anticoagulation treatment with Tenarox (rivaroxaban).

Name: .....

Address: .....

Birth date: .....

Weight: .....

Other medicines/conditions: .....

### In case of emergency, please notify:

Doctor's name: .....

Doctor's phone: .....

Doctor's stamp: .....

### Please also notify:

Name: .....

Phone: .....

Relationship: .....

### Information for health care providers:

- INR-values should not be used as they are not a dependable measure of the anticoagulant activity of Tenarox.

### What should I know about Tenarox?

- Tenarox thins the blood, which prevents you from getting dangerous blood clots.
- Tenarox must be taken exactly as prescribed by your doctor. To ensure optimal protection from blood clots, **never skip a dose**.
- You must not stop taking Tenarox without first talking to your doctor as your risk of blood clots may increase.
- Tell your health care provider about any other medicines you are currently taking, took recently or intend to start taking, before you start Tenarox.
- Tell your health care provider that you are taking Tenarox before any surgery or invasive procedure.

### When should I seek advice from my health care provider?

When taking a blood thinner such as Tenarox, it is important to be aware of its possible side effects. Bleeding is the most common side effect. Do not start taking Tenarox if you know

you are at risk of bleeding, without first discussing this with your doctor. Tell your health care provider straight away if you have any signs or symptoms of bleeding such as the following:

- pain
- swelling or discomfort
- headache, dizziness or weakness
- unusual bruising, nosebleed, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding
- menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal.
- blood in your urine which may be pink or brown, red or black stools
- coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds.

### How do I take Tenarox?

- To ensure optimal protection, Tenarox should be taken as follows:
  - 10 mg can be taken with or without food
  - 15 mg must be taken with food
  - 20 mg must be taken with food