

**Informatie voor de patiënt
en verzorgers van de patiënt.**

Duodopa[®]

**oplossing voor onderhuidse infusie
voor de ziekte van Parkinson**

**Foslevodopa en foscabidopa zijn de
werkzame stoffen in het medicijn Duodopa.**

**Let op, deze gids bevat belangrijke
veiligheidsinformatie voor u.**

**Lees deze gids goed door voordat
u dit medicijn gaat gebruiken.**

Waarom moet ik deze gids lezen?

Foslevodopa/foscarbidopa is een medicijn om de symptomen van de ziekte van Parkinson te behandelen.

Het wordt gebruikt wanneer andere medicijnen niet meer zo goed werken bij de behandeling van de symptomen van de ziekte van Parkinson.

U of uw verzorger zal dit medicijn onder uw huid toedienen via een klein plastic buisje (canule) in het gebied rond de navel. Dit gebied is uw infuusplaats (plek op de huid waar het plastic buisje het lichaam in gaat).

Via deze canule wordt het medicijn 24 uur per dag continu toegediend. Raadpleeg de handleiding in de bijsluiter voor de instructies hoe dit medicijn toegediend moet worden.

Sommige mensen die dit medicijn gebruiken kunnen problemen krijgen rond de plaats waar het plastic buisje (de canule) in de huid gaat.

De volgende huid-problemen kunnen ontstaan:

- **een huidinfectie.** Dit is wanneer bacteriën in de huid terecht komen.

Een huidinfectie kan ernstig worden wanneer bacteriën in het bloed komen en zich over het hele lichaam verspreiden. Dit wordt sepsis genoemd.

- **een huidreactie.** Dit is wanneer de huid geïrriteerd/ontstoken raakt.

Deze gids helpt u en uw verzorger meer te weten te komen over:



Hoe u de plaats op uw huid voor uw infuus kiest



Hoe u een huidinfectie of huidreactie door het infuus kunt herkennen



Wat u kunt doen om de kans op een huidinfectie of huidreactie door het infuus te verkleinen



Wat u moet doen als u een huidinfectie of huidreactie door het infuus heeft



Waar u meer informatie over dit medicijn kunt vinden



Hoe u de plaats op de huid voor uw infuus kiest

Het is belangrijk om regelmatig de gekozen plaats op de huid van uw infuus te veranderen. Dit helpt uw huid gezond te blijven en zorgt ervoor dat het medicijn op de juiste manier wordt toegediend.

U kunt uw buik gebruiken om een plaats te kiezen voor het infuus. Behalve als uw arts u zegt een andere plaats te gebruiken. Zorg ervoor dat de plaats die u kiest op minimaal 5 cm afstand (ongeveer de lengte van uw pink) van uw navel is.


- **Vermijd de huid waar uw broekriem zit, omdat dit gebied geïrriteerd kan raken door de druk van de riem op de huid.**
- **Vermijd huid met littekens, verhard weefsel of striae.**
- **Vermijd huidplooiën of plooiën waar het lichaam van nature veel buigt.**
- **Gebruik een nieuwe infuusset (canule/slangetje), elke keer dat u de plaats van uw infuus verandert.**

Verander de plaats van uw infuus elke 3 dagen of eerder, afhankelijk van de veranderingen aan uw huid (zoals roodheid, zwelling en pijn).

De nieuwe plaats van uw infuus moet minimaal 2,5 cm (ongeveer de breedte van twee vingers) verwijderd zijn van de laatste die u hebt gebruikt.

Als u eenmaal een plaats voor uw infuus op uw huid heeft gebruikt, mag u deze 12 dagen niet opnieuw gebruiken. Dit zal uw huid helpen om volledig te genezen.

Er zijn verschillende manieren om u eraan te helpen herinneren een plaats op de huid voor uw infuus niet te snel opnieuw te kiezen. Een manier is om uw buik in te delen zoals een klok. U kunt de canule elke keer met een afstand van twee 'uur' inbrengen op een nieuwe plek. U kunt beginnen met de plaats op 12 uur, dan om 2 uur gevolgd door 4 uur enzovoort.




Noteer de datum en plaats van uw infuus (bijvoorbeeld in een schrift).



Hoe u een huidinfectie of huidreactie door het infuus kunt herkennen

Let op huidveranderingen waar het infuus (de canule) uw huid in gaat. De huidveranderingen kunnen optreden met of zonder koorts; u moet letten op de volgende veranderingen:

- roodheid van de huid
- warm aanvoelen van de huid
- zwelling van de huid
- gevoeligheid/pijn
- veranderingen in huidskleur wanneer u op uw huid drukt



Wat u kunt doen om de kans op een huidinfectie of huidreactie door het infuus te verkleinen



Voordat u begint; zorg voor een hygiënisch schone tafel die goed verlicht is.



Houd de plaats op de huid en de infuusset schoon en steriel wanneer u de infusie voorbereidt.



Was altijd uw handen met water en zeep en droog ze af met keukenpapier. Raak daarna niets meer aan (behalve uw medicijn en de infuus spullen).



Zorg ervoor dat de punt van de spuit, de flaconadapter, het slangetje en de connector niet in aanraking komen met een vuil (tafel)oppervlak.



Gooi alle gebruikte infuusmaterialen (die mogelijk verontreinigd zijn), zorgvuldig weg.



Wanneer u een plek op de huid voor het infuus heeft gekozen, veegt u uw huid af op de gekozen plek met een alcoholdoekje. Zorg ervoor dat u in één richting veegt, zodat u het gereinigde gebied niet vervuilt. Laat het gebied minimaal 1 minuut drogen.

Verander de plek van het infuus elke 3 dagen of eerder, afhankelijk van de huidveranderingen (zoals roodheid, zwelling en pijn)



Wanneer u een nieuwe plaats voor het infuus gebruikt, mag u 12 dagen niet dezelfde plek op de huid kiezen. Dit zal uw huid helpen om volledig te genezen.



Houd altijd een afstand van 2,5 cm (ongeveer de breedte van twee vingers) van de laatste infuusplaats die u hebt gebruikt.



Gebruik altijd een nieuwe canule en slangetje bij het wisselen naar een nieuwe infuusplaats.



Knip eventueel haar rond uw infuusplaats af met een schaar. Hierdoor blijft de canuletape aan uw huid plakken. Als u uw huid moet scheren, wacht dan een dag voordat u die infuusplaats gebruikt.



Draag comfortabele kleding die de huid op de plek van het infuus niet irriteert.



Wat u moet doen als u een huidinfectie of huidreactie door het infuus heeft

Verander de plek van uw infuus onmiddellijk – wacht niet (tot de 3 dagen (om zijn). Bel uw arts, verpleegkundige of apotheker voor overleg, ook als u twijfelt, als u een of meerdere van de volgende symptomen heeft:

- roodheid van de huid
- warm aanvoelen van de huid
- zwelling van de huid
- gevoeligheid/pijn
- veranderingen in huidskleur wanneer u op uw huid drukt

Gebruik een geïnfecteerde en/of geïrriteerde plaats op de huid niet opnieuw. Wacht ten minste 12 dagen of langer totdat de huid genezen is.



Meer informatie over dit medicijn

Raadpleeg voor meer informatie over uw medicijn de bijsluiter met gebruiksaanwijzing die bij uw medicijn (foslevodopa/foscarbidopa) is geleverd.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Deze informatie is ook terug te vinden op www.abbvie-rmm.nl/duod-sc-pat

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).