

PATIËNTENINFORMATIEKAART

Rivaroxaban CF 15 mg

Rivaroxaban CF 20 mg

Patiënteninformatiekaart

- ◆ Draag dit kaartje altijd bij u.
- ◆ Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat een behandeling plaatsvindt.

Ik word behandeld met het antistollingsmiddel Rivaroxaban CF (rivaroxaban).

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Gewicht:

Andere geneesmiddelen / aandoeningen:

.....

Waarschuw bij noodgevallen:

Naam arts:

Telefoon arts:

Stempel arts:

Waarschuw ook:

Naam:

Telefoon:

Relatie:

Informatie voor zorgverleners:

- ◆ INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van Rivaroxaban CF.

Wat moet ik weten over Rivaroxaban CF?

- ◆ Rivaroxaban CF verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- ◆ Rivaroxaban CF moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels **mag u geen enkele dosis overslaan.**
- ◆ Stop niet met het innemen van Rivaroxaban CF zonder eerst met uw arts te overleggen, omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.
- ◆ Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Rivaroxaban CF begint.
- ◆ Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban CF gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?

Bij inname van een bloedverdunner, zoals Rivaroxaban CF, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Rivaroxaban CF zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken. Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- ◆ pijn
- ◆ zwelling of ongemak
- ◆ hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ◆ ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloeding van tandvlees, snijwondjes die lang blijven bloeden
- ◆ menstruatie of vaginale bloeding die heviger is dan gewoonlijk
- ◆ bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang
- ◆ bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

Hoe moet ik Rivaroxaban CF innemen?

- ◆ Voor een optimale bescherming moet Rivaroxaban CF als volgt worden ingenomen:
 - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
 - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen

Rev.no. 1.0

Centrafarm 

Centrafarm

Produkt/Product: RIVAROXABAN HCA CF NL

Packmittel/Packaging: GI/PIL

Mat.-Nr./Mat.-No.: NVT DZ: NVT

Hersteller/Manufacturer: Hemofarm A.D.

Art.-Nr./Art.-No.: 179148/179147

Designer's Art.-Nr./Art.-No.: 437015 Proefnr. 3

Format/Size: 70 x 253 mm

Schriftgröße/Font-size: 9, 10 en 11 pt

PZN/EAN: n.a.

Laetus-Code: n.a.

Flattermarke/Collating mark: n.a.

1. Farbe/Colour: Black

2. Farbe/Colour:

3. Farbe/Colour:

4. Farbe/Colour:

5. Farbe/Colour:

6. Farbe/Colour:

7. Farbe/Colour:

8. Farbe/Colour:

Version: 1. Umlauf Datum/Date: 11-07-2023

Agentur/Agency: Dobber Healthcare Prepress

Grafik erstellt von/Graphic made by: us

Genehmigt/Approved