



Patiëntkaart

Datum van CBG goedkeuring: 19-JAN-2023
Document Versie Nummer: OPDUALAG-PATIENTCARD-NL-202208 / ONC-NL-2300012

Informatie voor patiënten

Draag deze kaart altijd bij u om zorgverleners die u eventueel behandelen (bijv. arts, verpleegkundige, apotheker, personeel van de afdeling spoedeisende hulp) te informeren dat u met nivolumab en relatlimab wordt behandeld.



Belangrijk

Nivolumab en relatlimab kunnen ernstige afweergelateerde bijwerkingen veroorzaken in verschillende delen van het lichaam. Deze bijwerkingen kunnen op elk moment optreden, kunnen met vertraging optreden en kunnen weken tot maanden na uw laatste dosis van de behandeling optreden. Sommige van de volgende bijwerkingen kunnen levensbedreigend zijn en moeten meteen worden behandeld:

Lichaamsdeel	Mogelijke bijwerkingen
 Longen	Nieuwe of erger wordende hoest, niet goed kunnen ademen of pijn op de borst.
 Maag en darm	Diarree (waterige, dunne of zachte poep), vaker dan normaal naar de wc moeten; poep die zwart, teerachtig of plakkerig is, of die bloed of slijm bevat; pijn of een gevoelige maag of buik.
 Lever	Geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), misselijkheid of overgeven, pijn aan de rechterbovenkant van de buik, donkere urine, snel moe zijn, sneller dan normaal bloedingen of blauwe plekken hebben.
 Klieren die hormonen maken (inclusief suikerziekte en diabetische ketoacidose)	Hoofdpijn, meer zweten, veranderingen in uw gewicht, meer vermoeidheid, meer honger of dorst, vaker moeten plassen, haaruitval, het koud hebben, verstopping van de darmen, stemveranderingen, duizeligheid of flauwvallen, veranderingen in stemming of gedrag, gevoeligheid voor licht, oogproblemen, snelle hartslag, moeite met helder denken, adem die zoet of fruitig ruikt, een zoete of metaalachtige smaak in uw mond, een andere geur van uw urine of zweet, ziek voelen of ziek zijn, maag (buik) pijn en diepe of snelle ademhaling.
 Nieren	Verminderde hoeveelheid urine, zwelling van de enkels, verlies van eetlust of bloed in de urine.
 Huid	Uitslag, jeuk, blaarvorming of schilferende huid; pijnlijke zweertjes in de mond.
 Hart	Nieuwe of erger wordende pijn op de borst, onregelmatige en/of snelle hartslag, moeheid, zwelling van de enkels of niet goed kunnen ademen.
 Algemeen/ Overig	Verward zijn, slaperigheid, geheugenproblemen, stijve nek, evenwichtsproblemen, tintelingen of gevoelloosheid van de armen of benen, dubbelzien, pijnlijke ogen, veranderingen in het zien, blijvende of ernstige spierpijn of spierzwakte, spierkrampen of vergrote lymfeklieren.



Heeft u een van de bovenstaande tekenen of klachten? Of blijven de klachten aanhouden of worden ze erger?, Vertel dit dan **meteen** aan uw arts of verpleegkundige of zoek meteen andere medische hulp.

Afweerge relateerde bijwerkingen kunnen ook in andere organen en weefsels optreden. Deze patiëntkaart beschrijft niet alle tekenen en klachten van problemen die verband houden met de behandeling met nivolumab en relatlimab. Krijgt u last van bijwerkingen, ook als deze niet op deze kaart of in de bijsluiter staan vermeld, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.



Meer informatie

- Het is belangrijk dat een bijwerking snel wordt herkend en behandeld. Dit helpt bij een veilig gebruik van nivolumab en relatlimab. Als tekenen en klachten die mild lijken, niet worden behandeld, dan kunnen ze snel erger worden.
- Probeer NIET om zelf iets aan de klachten te doen. Het is erg belangrijk dat u uw arts of verpleegkundige om advies vraagt.
- Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of scan bovenstaande QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker. Ook kunt u contact opnemen met Bristol Myers Squibb via 030-300 2222 of medischeafdeling@bms.com.



BELANGRIJKE informatie voor Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg

- Deze patiënt wordt behandeld met nivolumab en relatlimab, wat ernstige immuungerelateerde bijwerkingen kan veroorzaken die verschillende orgaansystemen kunnen aantasten en tot de dood kunnen leiden.
- Immuungerelateerde bijwerkingen kunnen op elk moment optreden, kunnen vertraagd optreden en kunnen zich weken tot maanden na stopzetting van de behandeling optreden.
- Vroege diagnose en passende behandeling van immuungerelateerde bijwerkingen zijn essentieel om levensbedreigende complicaties tot een minimum te beperken.
- Overleg met een oncoloog of een andere medisch specialist kan nuttig zijn voor de behandeling van orgaanspecifieke immuungerelateerde bijwerkingen.
- Aanvullende informatie betreffende nivolumab en relatlimab is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Contactgegevens van de arts (die nivolumab en relatlimab heeft voorgeschreven)
Gelieve in HOOFDLETTERS in te vullen.

Naam arts: _____

Telefoonnummer: _____

Telefoonnummer buiten kantooruren: _____

Mijn contactgegevens

Gelieve in HOOFDLETTERS in te vullen.

Mijn naam: _____

Mijn telefoonnummer: _____

Contactpersoon voor noodgevallen: Naam: _____

Telefoonnummer: _____