

PATIËNTENKAART

voor TEVIMBRA® (tislelizumab)

Belangrijk

- Houd deze kaart altijd bij u. Laat deze kaart bij elk bezoek zien aan zorgverleners (bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp). Zij weten dan dat u tislelizumab krijgt. Dit helpt bij een snelle diagnose en juiste behandeling van bijwerkingen.
- Probeer niet zelf symptomen te behandelen. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet op deze kaart vermeld staan.

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

U kunt ook contact opnemen met BeOne Medicines
e-mail: pharma.benelux@beonemed.com
0800-0233408



Versie 1 / Goedkeuring CBG
(College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen): **09/2026**

Belangrijke contactgegevens:

Naam voorschrijvend arts:

Tel:

Naam patiënt:

Tel:

Contactpersoon in geval van nood:

Tel:

Belangrijke informatie voor zorgverleners

Deze patiënt wordt behandeld met tislelizumab, wat immuungerelateerde bijwerkingen kan veroorzaken die op elk moment tijdens de behandeling of zelfs na de behandeling kunnen optreden. Beoordeel patiënten op tekenen en symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen. Vroege diagnose en passende behandeling zijn essentieel om de gevolgen van immuungerelateerde bijwerkingen tot een minimum te beperken.

Bij vermoedelijke immuungerelateerde bijwerkingen moet een adequate evaluatie worden uitgevoerd om de etiologie te bevestigen en andere oorzaken uit te sluiten. Afhankelijk van het type en de ernst van de immuungerelateerde bijwerkingen, moet worden overwogen om tislelizumab te staken en corticosteroïden toe te dienen. Specifieke richtlijnen voor de behandeling van immuungerelateerde bijwerkingen zijn beschikbaar in de Samenvatting van de productkenmerken voor tislelizumab.

Belangrijke informatie voor patiënten

Tislelizumab kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, die soms levensbedreigend kunnen worden en tot de dood kunnen leiden. Vertel het uw arts onmiddellijk als u tijdens de behandeling met tislelizumab een van deze bijwerkingen krijgt:

Mogelijke bijwerkingen

- Longen: kortademigheid, pijn op de borst, nieuwe of erger wordende hoest.
 - Lever: misselijkheid, braken, pijn aan de rechterkant van de buik, verlies van eetlust, gele verkleuring van de ogen en de huid, sneller bloeden of blauwe plekken krijgen dan normaal, donkergekleurde urine.
 - Darmen: diarree of vaker ontlasting dan normaal, zwarte, teerachtige, plakkerige ontlasting, bloed of slijm in de ontlasting, ernstige pijn of gevoeligheid in de maag, misselijkheid, braken.
 - Nieren en blaas: veranderingen in de hoeveelheid en kleur van de urine.
 - Huid: uitslag, jeuk, blaarvorming op de huid of zweren in de mond of op andere vochtige oppervlakken van de neus, keel of geslachtsdelen, droge huid.
-
- Klieren die hormonen aanmaken (met name de bijnieren, hypofyse of schildklier): snelle hartslag, zweten, extreme vermoeidheid, veranderingen in gewicht, duizeligheid of flauwvallen, haaruitval, het koud hebben, verstopping, hoofdpijn die niet overgaat of ongewone hoofdpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, verandering van stemming of gedrag, zoals minder zin in seks, prikkelbaarheid of vergeetachtigheid, lagere stem.
 - Type 1 diabetes (suikerziekte): meer honger of dorst hebben dan normaal, vaker moeten plassen dan normaal, adem die ruikt naar fruit.
 - Spieren: spierpijn en -stijfheid.
 - Hart: pijn op de borst, snelle of abnormale hartslag, kortademigheid in rust of tijdens activiteit, vochtophoping met swelling van de benen, enkels en voeten.
 - Overig: koorts, vermoeidheid, moeite met lopen, verwarring, suf gevoel, stijve nek, toevallen, pijn, zwakte, doof gevoel, tintelingen, gezwollen lymfeklieren.