

Apixaban Alert Card (Front)

Laat deze kaart zien aan uw apotheker, uw tandarts en alle andere medische zorgverleners waar u onder behandeling bent.

Ik ben onder behandeling voor antistolling met Apixaban Amarox (apixaban) ter voorkoming van bloedstolsels

Informatie voor patiënten

- Gebruik Apixaban Amarox altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Heeft u een dosis gemist? Neem deze dan zodra u eraan denkt. Volg daarna weer uw normale innameschema.
- Stop niet met het innemen van Apixaban Amarox zonder overleg met uw arts. Er is anders een risico op een

beroerte of andere problemen door het ontstaan van een bloedstolsel.

- Apixaban Amarox helpt uw bloed dunner te maken. Dit vergroot wel de kans op bloedingen.
- Kenmerken en signalen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of bloedingen onder de huid, donkere poep (bloed in uw poep), bloed in de urine, een bloedneus, duizelig zijn,

moe zijn, er bleek uitzien of zwak zijn, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van bloed of overgeven van bloed.

- Heeft u last van bloedingen die niet vanzelf stoppen? Zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Krijgt u binnenkort een operatie? Vertel uw arts dan dat u Apixaban Amarox gebruikt.

{04/2024}

WAARSCHUWINGSKAART VOOR DE PATIËNT

Apixaban Amarox (apixaban)

- Waarschuwingkaart voor de patiënt
- Het is belangrijk dat u deze kaart altijd bij u heeft

Dummy Pharma code

Amarox



Artwork information			
Customer	Amarox	Market	NL
Dimensions (mm)	175 x 58 mm	Pharmacode	xxxx
Printing Colours(03)	PANTONE 2766 C Black		
	PANTONE Orange 021 C		
Non Printing Colors	Die cut Unvarnish Area Creasing		
Others: Neutralcode can be adjust based on text matter (DRUGS/AP/50/2009)			

Apixaban Alert Card (Back)

Informatie voor medische zorgverleners ♦ Apixaban Amarox (apixaban) is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van factor-Xa. ♦ Apixaban Amarox kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met Apixaban Amarox direct gestaakt worden. ♦ Bij de behandeling met	Apixaban Amarox is routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirurgie (protrombinetijd (PT internationale genormaliseerde ratio (INR) en een geactiveerde partiële	tromboplastinetijd (PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken. ♦ Een middel om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren is beschikbaar. DRUGS/AP/50/2009 2xxxxxx	Vul dit gedeelte in of vraag uw arts dit te doen Naam: Geboortedatum: Indicatie: Dosering: milligram 2 keer per dag Naam van de arts: Telefoonnummer van de arts:	
--	---	---	---	--

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

175 mm

58 mm