

PATIËNTENKAART

Apixaban
De patiënt/het kind/verzorger moet deze kaart altijd bij zich hebben
Laat deze kaart zien aan de apotheker, tandarts en alle andere medische zorgverleners voor de behandeling.
Ik ben onder behandeling voor antistolling middels apixaban ter preventie van bloedstolsels.

Gelieve dit gedeelte in te vullen of vraag de arts dit te doen

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Indicatie: _____

Gewicht: _____

Dosering: mg tweemaal daags _____

Naam van de arts: _____

Telefoonnummer van de arts: _____

Informatie voor patiënten/zorgverleners

- Gebruik/geef apixaban altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis in de ochtend heeft gemist, neemt/geeft u deze zodra u het zich herinnert. Deze dosis kan tegelijk met de avonddosis worden ingenomen/gegeven. Een gemiste avonddosis mag alleen nog dezelfde avond

Special glue

worden ingenomen/gegeven. Neem/geef niet de volgende ochtend twee doses, maar ga de volgende dag verder met het doseerschema van tweemaal daags zoals aanbevolen.

- Stop niet met het innemen/toedienen van apixaban zonder overleg met de arts, omdat u/de patiënt risico loopt op een



beroerte/bloedstolsel of andere complicaties.

- Apixaban helpt het bloed dunner te maken. Dit kan echter zorgen voor een verhoging van het risico op bloedingen.
- Klachten en verschijnselen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of bloedingen onder de huid, donkergekleurde ontlasting (bloed in de ontlasting), bloed in de urine, bloedneus, duizeligheid, vermoeidheid, bleek zien, zwakte, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van bloed of braken van

bloed.

- Als u last heeft van bloedingen die niet vanzelf stoppen, **zoek dan onmiddellijk medische hulp.**
- Als u/de patiënt een operatie of andere invasieve procedure moet ondergaan, vertel de arts dan dat u/de patiënt apixaban gebruikt.

04/2026

Informatie voor medische zorgverleners

- Apixaban is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve

remming van factor-Xa.

- Apixaban kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met apixaban direct gestaakt worden.
- Bij de behandeling met apixaban is routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirurgie (protrombintijd (PT) internationale genormaliseerde ratio

(INR) en een geactiveerde partiële tromboplastintijd (PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken.

- Voor volwassenen is er een middel beschikbaar om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren. De veiligheid en werkzaamheid hiervan zijn echter niet vastgesteld bij pediatrische patiënten (raadpleeg de Samenvatting van Productkenmerken van andexanet alfa).