

Pirfenidon

Risicominimalisatie- materiaal over de risico's van pirfenidon voor voorschrijvers

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico's van **pirfenidon** te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Verse: 1.0

Goedkeuringsdatum:
januari 2024

Het gebruik van pirfenidon verhoogt het risico op geneesmiddel-geïnduceerde leverschade en fotosensitiviteit.

Controleer voor het starten van de behandeling:

- Of de patiënt een onderliggende ernstige leverfunctiestoornis of terminale leverziekte heeft, omdat pirfenidon dan gecontra-indiceerd is.
- De leverfunctie en zorg voor adequate controle op afwijkende leverenzymwaarden gedurende de hele behandeling (maandelijks gedurende de eerste 6 maanden en daarna elke 3 maanden). Pas de dosering aan of stop definitief de behandeling indien verhoogde leverenzymwaarden optreden. Lees voor verdere doseringsadviezen rubriek 4.4 van de SmPC.

Vertel de patiënt over leverschade:

- Dat pirfenidon ernstige leverschade kan veroorzaken en dat leverfunctietests regelmatig gedaan zullen worden.
- Om direct contact op te nemen met u of de huisarts als hij/zij het volgende ervaart:
 - Vermoeidheid, geen eetlust, buikpijn rechtsboven, donkerkleuring van de urine of gele verkleuring van de huid en/of het oogwit.

Vertel de patiënt over fotosensitiviteit:

- Dat pirfenidon het risico op fotosensitiviteit kan verhogen en adviseer de patiënt om zonlicht en andere bronnen van UV-licht te vermijden (inclusief zonnebanken), om dagelijks zonnebrandcrème (sunblock) te gebruiken en kleding te dragen die beschermt tegen zonlicht en om andere geneesmiddelen te vermijden waarvan bekend is dat zij fotosensitiviteit veroorzaken.
- Om contact op te nemen met u of de huisarts als hij/zij het volgende ervaart:
 - Niet eerder aanwezige huiduitslag van enige ernst of omvang.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl.

U kunt bijwerkingen ook melden aan safety@medicalvalley.se.

Dit geldt met name voor ernstige bijwerkingen als ook klinisch significante bijwerkingen waarvoor specifieke aandacht is, zoals:

- Fotosensitiviteitsreacties en huiduitslag
- Geneesmiddel-geïnduceerde leverschade
- Verhoogde leverenzymwaarden in het bloed
- Iedere andere klinisch significante bijwerking naar het oordeel van de arts

U kunt extra materiaal opvragen via safety@medicalvalley.se. Het materiaal is online beschikbaar op <https://xiromed.nl/voorlichtingsmateriaal/pirfenidon/>.

Aanvullende informatie betreffende pirfenidon is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.