

## HERINNERINGSKAARTVOOR DE PATIENT OVER OSTEONECROSE VAN DE KAAK VOOR EN TIJDENS UW BEHANDELING MET ZOLEDRONINEZUUR SEACROSS

Op deze herinneringskaart staat belangrijke veiligheidsinformatie die u moet kennen voorafgaand aan en tijdens behandeling met zoledroninezuur (Zoledroninezuur Seacross).

Uw arts heeft u zoledroninezuur (Zoledroninezuur Seacross) voorgeschreven, dat wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen en bij volwassen mannen, of voor de

behandeling van osteoporose die wordt veroorzaakt door behandeling met steroïden, en de botziekte van Paget bij volwassenen. Bij deze ziekten worden de botten dunner en zwakker zodat ze mogelijk eerder breken.

Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak (ONK)) is een bijwerking die zeer zelden (bij 1 op de 10,000) voorkomt bij patiënten die zoledroninezuur (Zoledroninezuur Seacross) krijgen voor osteoporose. Botbeschadiging in de kaak kan ook optreden nadat u bent gestopt met de behandeling.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat botbeschadiging in de kaak ontstaat omdat het een aandoening is die pijnlijk kan zijn en die moeilijk te behandelen is. Om het risico van het ontstaan van botbeschadiging in de kaak te verkleinen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

### Vóórdat uw behandeling start:

Laat uw arts/verpleegkundige (zorgverlener) weten als u problemen heeft met uw mond of gebit.

Uw arts vraagt u mogelijk om een tandheelkundig onderzoek te ondergaan als u:

- eerder bent behandeld met een ander geneesmiddel dat behoort tot de groep van bisfosfonaten;
- behandeld wordt met geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd (zoals prednisolon of dexamethason);
- rookt;
- kanker hebt;
- al lange tijd uw gebit niet hebt laten controleren;
- problemen hebt met uw mond of tanden.

### Tijdens de behandeling

- Zorg ervoor dat u een goede mondhygiëne heeft, poets uw tanden regelmatig en laat uw gebit regelmatig controleren. Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat dit goed past.
- Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige operatie moet ondergaan (er moet bijvoorbeeld een tand of een kies worden getrokken), informeer uw arts om wat voor ingreep het gaat en vertel uw tandarts dat u met zoledroninezuur (Zoledroninezuur Seacross) wordt behandeld.
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u een probleem krijgt aan uw mond of tanden, zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, of zweertjes die niet genezen of als er afscheiding optreedt. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak.

Lees de bijsluiter bij uw geneesmiddel voor meer informatie.

## Artwork Panel

Artwork Ref: Zoledronic-PRC-NL

PMS1 C100M72Y14 ■ PMS2 K100 ■

Version No:00

Date : 2024-12-07

Product: Zoledronic 5mg/100ml

Pack Type: PRC

Substrate Weight:300gsm

Client: Seacross Pharmaceuticals Limited

Dimensions: 110\*88-折页

Fonts: Helvetica  
Min Font Point:6,5