

## Belangrijke informatie voor zorgverleners

Deze patiënt wordt behandeld met retifanlimab, een geneesmiddel dat immuun-gemedieerde bijwerkingen kan veroorzaken. Deze bijwerkingen kunnen op elk moment tijdens de behandeling optreden, of zelfs na afloop van de behandeling. Beoordeel patiënten op tekenen en symptomen van immuun-gemedieerde bijwerkingen. Vroege diagnose en passende behandeling zijn essentieel om de gevolgen van deze bijwerkingen te minimaliseren.

Specifieke richtlijnen voor het behandelen van immuun-gemedieerde bijwerkingen zijn beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) van retifanlimab.

Overleg met een oncoloog of andere medisch specialist kan nuttig zijn bij de behandeling van orgaanspecifieke immuun-gemedieerde bijwerkingen.

**Voor meer informatie:** bel de afdeling Medische Informatie van Incyte op +800 00027423 (24 uur per dag bereikbaar).

*versie 1, november 2025. NL/RETI/NP/25/0002*

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u bijwerkingen of symptomen ontwikkelt. Voorbeelden van tekenen of symptomen die voor kunnen komen bij gebruik van retifanlimab staan op deze kaart vermeld. Uw arts kan u andere medicijnen geven om ernstigere complicaties te voorkomen en uw symptomen te verminderen.

Uw arts kan besluiten om de volgende dosis uit te stellen of de behandeling te stoppen.

- Probeer bijwerkingen niet zelf te behandelen
- Stop niet met de behandeling zonder dit eerst met uw arts te bespreken.
- Draag deze kaart altijd bij u, vooral wanneer u op reis bent, naar de spoedeisende hulp gaat of een andere arts moet raadplegen.

## Patiëntenkaart voor Zynyz (retifanlimab)

### Informatie voor de patiënt.

Dit geneesmiddel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken die soms levensbedreigend kunnen zijn en tot de dood kunnen leiden. Deze bijwerkingen kunnen op elk moment tijdens de behandeling optreden, of zelfs nadat de behandeling is beëindigd. U kunt meerdere bijwerkingen tegelijk ervaren.

## Waarschuw uw arts onmiddellijk als u één van deze symptomen heeft

### Longen

- Kortademigheid
- Nieuwe of verergerende hoest
- Pijn op de borst

### Nieren

- Minder vaak plassen dan normaal
- Schuimende urine
- Bloed of sporen van bloed in de urine
- Gezwollen enkels

### Darmen

- Vaak diarree, vaak met bloed en/of slijm
- Vaker stoelgang dan normaal
- Bloedige, zwarte of teerachtige ontlasting
- Ernstige buikpijn of gevoeligheid
- Misselijkheid of braken

### Lever

- Minder zin in eten dan normaal
- Aanhoudende misselijkheid of braken
- Pijn aan de rechterkant van de buik
- Geelverkleuring van ogen en/of huid
- Sufheid
- Donkergekleurde urine
- Gemakkelijker bloeden of blauwe plekken krijgen dan normaal

### Hormoonklieren

- Snelle hartslag
- Duizeligheid of flauwvallen
- Extreme vermoeidheid
- Aanhoudende of ongebruikelijke hoofdpijn
- Gewichtsverandering
- Koud voelen
- Haaruitval
- Verstopping

### Type 1 diabetes of diabetische ketoacidose

- Meer honger of dorst dan normaal
- Vaker plassen dan normaal
- Afvallen
- Vermoeidheid of zich ziek voelen
- Moeite met helder denken
- Snelle en diepe ademhaling
- Adem die zoet of fruitig ruikt
- Zoete of metaalachtige smaak in de mond
- Buikpijn
- Sufheid
- Andere geur van urine of zweet

### Huid

- Huiduitslag of jeuk
- Blaarvorming of zweren in de mond, neus, keel of genitale zone

### Andere organen

- Ernstige of aanhoudende pijn in spieren, gewrichten of zenuwen
- Problemen met zien



### Meer informatie

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal.

**Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.**

Naam behandelend arts: \_\_\_\_\_

Tel. nr. praktijk: \_\_\_\_\_

Tel. nr. buiten kantooruren: \_\_\_\_\_

Mijn naam: \_\_\_\_\_

Mijn tel. nr: \_\_\_\_\_

Contactpersoon noodgevallen: \_\_\_\_\_

Tel. nr. Contactpersoon: \_\_\_\_\_