

Front

AT

Dr.Reddy's

Apixaban Reddy 2,5 mg Filmtabletten (Apixaban)

Patientenkarte

Tragen Sie diese Karte ständig bei sich.

Zeigen Sie diesen Ausweis jedem Arzt, Zahnarzt und allen anderen medizinischen Fachkräften vor der Behandlung

Ich werde mit dem Antikoagulans Apixaban Reddy (Apixaban) behandelt, um der Entstehung von Blutgerinnseln vorzubeugen.

AT

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie Ihren Arzt darum

Name:

Geburtsdatum:.....

Indikation:

Dosierung: mg 2 x täglich

Name des Arztes:

Telefonnummer des Arztes:

NL

Dr.Reddy's

Apixaban Reddy (apixaban)

Waarschuwingskaart voor de patiënt

Het is belangrijk dat u deze kaart altijd bij u draagt

Laat deze kaart zien aan uw apotheker, uw tandarts en alle andere medische zorgverleners waar u onder behandeling bent.

Ik ben onder behandeling voor antistolling middels Apixaban Reddy (apixaban) ter preventie van bloedstolsels

NL

Gelieve dit gedeelte in te vullen of vraag uw arts dit te doen

Naam:

Geboortedatum:

Indicatie:.....

Dosering: mg tweemaal daags

Naam van de arts:

Telefoonnummer van de arts:.....

Tear Tape

Tear Tape

85

85

85

85

340

53

Back

AT

Information für Patienten

■ Nehmen Sie Apixaban Reddy regelmäßig nach den Anweisungen Ihres Arztes ein. Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, nehmen Sie die Tablette, sobald Sie es bemerken, und setzen Sie danach die Einnahme wie gewohnt fort.

■ Brechen Sie die Behandlung mit Apixaban Reddy nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, da bei Ihnen das Risiko eines Schlaganfalls oder anderer Komplikationen besteht.

■ Apixaban Reddy hilft, Ihr Blut zu verdünnen. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.

■ Anzeichen und Symptome von Blutungen können Blutergüsse oder Einblutungen unter der Haut, Teerstuhl, Blut im Urin, Nasenbluten, Schwindel, Müdigkeit, Blässe, Schwäche, plötzliche starke Kopfschmerzen, Abhusten von Blut oder blutiges Erbrechen sein.

■ Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls bei Ihnen eine Blutung nicht selbständig aufhört.

■ Falls bei Ihnen eine Operation oder ein invasiver Eingriff notwendig sein sollte, informieren Sie vor der Operation Ihren behandelnden Arzt, dass Sie Apixaban Reddy einnehmen.

{Monat Jahr}

AT

Information für Arzt und Apotheker

■ Apixaban ist ein orales Antikoagulans, das durch die direkte, selektive Hemmung des Blutgerinnungsfaktors Xa wirkt.

■ Apixaban kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Im Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Apixaban Reddy unverzüglich abubrechen.

■ Die Behandlung mit Apixaban Reddy erfordert keine Routineüberwachung der Exposition. Ein kalibrierter quantitativer anti-Faktor Xa Test kann in Ausnahmesituationen, z.B. bei Überdosierungen und Notfalloperationen, nützlich sein (Prothrombinzeit (PT), International Normalized Ratio (INR) und aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) Gerinnungstests sind nicht empfohlen) - siehe Fachinformation.

■ Ein Arzneimittel zur Aufhebung der Anti-FXa-Aktivität von Apixaban steht zur Verfügung.

NL

Informatie voor patiënten

■ Gebruik Apixaban Reddy altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis heeft gemist, neem deze dan zodra u eraan denkt en houdt u daarna weer aan uw gebruikelijke doseschema.

■ Stop niet met het innemen van Apixaban Reddy zonder overleg met uw arts, omdat u risico loopt op een beroerte of andere problemen als gevolg van het ontstaan van een bloedstolsel.

■ Apixaban Reddy helpt uw bloed dunner te maken. Dit kan echter zorgen voor een verhoging van het risico op bloedingen.

■ Teken en signalen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of bloedingen onder de huid, donkergekleurde ontlasting (bloed in de ontlasting), bloed in de urine, bloedneus, duizeligheid, vermoeidheid, bleek zien, zwakte, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van bloed of braken van bloed.

■ Als u last heeft van bloedingen die niet vanzelf stoppen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

■ Als u een operatie of een invasieve procedure moet ondergaan, vertel uw behandelend arts dan dat u Apixaban Reddy gebruikt.

{MM JJJJ}

NL

Informatie voor medische zorgverleners

■ Apixaban is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van factor-Xa.

■ Apixaban Reddy kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met apixaban direct gestaakt worden.

■ Bij de behandeling met Apixaban Reddy is routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirurgie (protrombinetijd (PT internationale genormaliseerde ratio (INR) en een en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken.

■ Een middel om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren is beschikbaar.

1500xxxx

85

85

85

85

340

53

Artwork

Dr.Reddy's

Version No:

v1.0

Submission

Brand:

DR Reddy's

Country:

AT/NL

Product Name:

Apixaban

Strength:

2.5 mg

Form:

Film Coated Tablets

Component:

PAC

Pack Size:

N/A

Date Created:

03 July 2024

Date Modified:

xxxxxx

Project:

NPL

Previous DR No:

N/A

Previous Material Number:

N/A

Commercial

DR No:

DRxxxxx

DRUGS Code:

N/A

Material Code:

N/A

Third Party Material Code:

xxxxxx

Barcode Type:

N/A

Barcode Number:

N/A

Magnification:

N/A

Pharmacode No:

xxxx

Implementation Date:

xx xxx xxx

Technical Information

Die Cut

Guides

Glue Spots

Min Font Size:

7 pt

Printer

India

Dimensions:

85 x 53 mm

Colours

Process Black

Dr.Reddy's

Good Health Can't Wait

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd,
410 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge,
CB4 0PE, United Kingdom

UNDER NO CIRCUMSTANCES
SHOULD THIS ARTWORK BE ALTERED
WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
DR.REDDY'S ARTWORK EU.

Please note that any low resolution paper Canon colour copies associated with
this job should be referred to for content, layout and colour separation only.