

UNVARNISHED AREAS



GLUE SPOT



CREASING



FREE TEXT AREA



PERFORATED FLAPS



48 x 26 x 89 mm

OFFLINE PRINTING

PC
SN
EXP
Lot

FACE

• Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Rivaroxaban Zentiva begint.

• Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban Zentiva gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?
Bij inname van een bloedverdunner, zoals Rivaroxaban Zentiva, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Rivaroxaban Zentiva zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken. Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- pijn
- zwelling of ongemak
- hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloeding van tandvlees, slijwondjes die lang blijven bloeden

Patiënteninformatiekaart

Rivaroxaban Zentiva 2,5 mg

Rivaroxaban Zentiva 10 mg

Rivaroxaban Zentiva 15 mg

Rivaroxaban Zentiva 20 mg


Draag dit kaartje altijd bij u. Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat een behandeling plaatsvindt.

Informatie voor zorgverleners:

- INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van Rivaroxaban Zentiva.

Wat moet ik weten over Rivaroxaban Zentiva?

- Rivaroxaban Zentiva verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- Rivaroxaban Zentiva moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels mag u geen enkele dosis overslaan.
- Stop niet met het innemen van Rivaroxaban Zentiva zonder eerst met uw arts te overleggen omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.



REVERSE

• menstruatie of vaginale bloeding die heviger is dan gewoonlijk

• bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang

• bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

Hoe moet ik Rivaroxaban Zentiva innemen?

- Voor een optimale bescherming moet Rivaroxaban Zentiva als volgt worden ingenomen:
- 2,5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
- 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
- 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
- 20 mg moet met voedsel worden ingenomen

Waarschuw bij noodgevallen:

Naam arts: _____

Telefoon arts: _____

Stempel arts: _____

Ik word behandeld met het antistollingsmiddel Rivaroxaban Zentiva (rivaroxaban).

Naam: _____

Adres: _____

Geboortedatum: _____

Gewicht: _____

Andere geneesmiddelen / aandoeningen: _____

Waarschuw ook:

Naam: _____

Telefoon: _____

Relatie: _____

