

70 mm

PATIËNTENINFORMATIEKAART

Glenmark Arzneimittel GmbH

- Rivaxa 2,5 mg
- Rivaxa 10 mg
- Rivaxa 15 mg
- Rivaxa 20 mg

- Draag dit kaartje altijd bij u
- Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat een behandeling plaatsvindt

52 mm

Pharma
code

Pharma
code

Ik word behandeld met het antistollingsmiddel Rivaxa (rivaroxaban).

Naam: _____

Adres: _____

Geboortedatum: _____

Gewicht: _____

Andere geneesmiddelen / aandoeningen:

Waarschuw bij noodgevallen:

Naam arts: _____

Telefoon arts: _____

Stempel arts: _____

Waarschuw ook:

Naam: _____

Telefoon: _____

Relatie: _____

253 mm

Informatie voor zorgverleners:

- INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van Rivaxa.

Wat moet ik weten over Rivaxa?

- Rivaxa verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- Rivaxa moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels **mag u geen enkele dosis overslaan**.

- Stop niet met het innemen van Rivaxa zonder eerst met uw arts te overleggen omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.
- Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Rivaxa begint.
- Vertel uw zorgverlener dat u Rivaxa gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?

Bij inname van een bloedverdunner, zoals Rivaxa, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Rivaxa zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken. Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- pijn
- zwellings of ongemak
- hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloeding van tandvlees, snijwondjes die lang blijven bloeden
- menstruatie of vaginale bloeding die heviger is dan gewoonlijk
- bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang
- bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

Hoe moet ik Rivaxa innemen?

- Voor een optimale bescherming moet Rivaxa als volgt worden ingenomen:
 - 2,5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
 - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen

Versie 1.0 (februari 2026)

45 mm

Please, do not interfere with the prepared layers.
Please, create a separate layer for graphics.

Patient Card
size: 70x253 mm

Transparent tamper evident



Text area

creatifbox

PRODUCT:

Rivaroxaban 2,5+10+15+20 mg
Patient Alert Card
film-coated tablet NL

Job No:

Date:

Component:

Dimensions:

Colours:

Cutter Guide 
Black 

Spellcheck:

Fonts: (Artwork)

Times New Roman ALL 9 pts body
copy (min)

Software used:**Amends:**

Draft:

Rev date:

Reviser:

Artwork Sign-
off(digitally):

Approval:

Internal proof approval

Signed (digitally)

External proof approval

Signed (digitally)