

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie

Aanvullende informatie betreffende ranibizumab is beschikbaar in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Deze informatie is ook terug te vinden op www.sandoz.nl/rmm en

<https://lupineurope.eu/products/ranibizumab/nl>.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Waar kan ik meer informatie krijgen over mijn oogafwijking en voorzieningen voor slechtzienden?

MaculaVereniging

Postbus 3071

1801 GB Alkmaar

E-mail: info@maculavereniging.nl

De Oogvereniging

Algemeen nummer: 030 299 28 78

De Ooglijn: 030 294 54 44

Email: info@oogvereniging.nl

Twitter: @oogvereniging en @ooglijn

Postadres:

Postbus 2344

3500 GH Utrecht

Bezoekadres:

Piet van Dommelenhuis

Churchilllaan 11 – 2e etage

3527 GV Utrecht

Informatie

Informatie over uw behandeling met ranibizumab

Let op bij gebruik van ranibizumab

Ranibizumab is de werkzame stof in het medicijn. Uw medicijn kan een merknaam hebben die anders is dan de werkzame stof. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Informatie voor de patiënt voor de behandeling met ranibizumab

1. Voorbereiden op de ranibizumab behandeling

- Informeer uw arts vóórdat ranibizumab wordt toegediend als u een beroerte heeft gehad of voorbijgaande verschijnselen van een beroerte (zwakte of verlamming van ledematen of gezicht, moeite met praten of begrijpen) heeft ervaren, zodat beoordeeld kan worden of dit de meest geschikte behandeling voor u is.
- Een arts of verpleegkundige
 - bedekt uw gezicht en het gebied rondom het oog met een speciale doek;
 - reinigt uw oog en de huid eromheen met een desinfecterend middel;
 - houdt met een speciale spreider uw oogleden open zodat u niet kunt knippen;
 - verdooft uw oog met een verdovend middel zodat u geen pijn voelt.
- De arts dient vervolgens de injectie toe in het witte deel van uw oog. U kunt tijdens de injectie een lichte druk voelen.
- Het is belangrijk dat u uw arts inlicht als u
 - een ooginfectie heeft;
 - pijn in uw oog of een rood oog heeft;
 - denkt dat u misschien allergisch bent voor ranibizumab of jodium.

2. Wat gebeurt er nadat ik de injectie met ranibizumab heb gekregen?

- Uw arts voert oogonderzoeken uit, waaronder een oogdrukmeting, om te controleren of de behandeling goed is verlopen.
- Het witte deel van het oog, waarin de injectie is toegediend, is waarschijnlijk rood. Deze roodheid is normaal en verdwijnt binnen enkele dagen. Neem contact op met uw arts als de roodheid niet verdwijnt of erger wordt.
- Het kan zijn dat u een paar vlekjes of draden ziet zweven. Deze vlekjes zijn normaal en moeten binnen enkele dagen verdwijnen. Neem contact op met uw arts als ze niet verdwijnen of erger worden.
- Uw pupillen worden voor de injectie verwijld, waardoor het kan zijn dat u na de behandeling enkele uren wazig ziet.
- Als u gewoonlijk een auto of ander voertuig bestuurt, mag u dat pas weer doen als uw zicht weer normaal is.

3. Belangrijke signalen en symptomen van ernstige bijwerkingen en wanneer moet u spoedeisende aandacht van de arts vragen?

- Het is belangrijk dat u in de week na de injectie let op veranderingen in de toestand van uw oog en lichaam. In zeldzame gevallen kunnen injecties in het oog een infectie veroorzaken.
- Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als in uw oog één of meerdere van de volgende klachten of verschijnselen optreden: pijn, lichtgevoeligheid/ tranenvloed, gezwollen oogleden of andere zwelling, toenemende roodheid, wazig of vervormd zien of plotseling gezichtsverlies, het zien van lichtflitsen met het bewegen van puntjes en zwarte vlekjes, het zien van gekleurde lichtkringen, of een droog oppervlak van uw oog.
- Neem ook zo snel mogelijk contact op met uw arts als u één of meerdere van de volgende klachten of verschijnselen krijgt: hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid, hoesten, misselijkheid, braken, transpiratie, jeuk, huiduitslag, gezwollen lippen of gezicht, etalagebenen, plotselinge pijn of zwelling in uw kuit- of dijspieren, warme/gevoelige kuit, doof gevoel en pijn van uw huid, armen of benen, bloedneus, bloed in uw urine, bloeduitstorting, onduidelijke spraak of spierzwakte of -verlamming (vooral aan één kant).