

**Risico minimalisatie materiaal
betreffende pamidronaat voor patiënten**

Herinneringskaart voor de patiënt

Deze herinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u zich voor en na de behandeling met pamidronaat injecties bij kankergerelateerde aandoeningen bewust dient te zijn.

Uw arts heeft u pamidronaat injecties voorgeschreven om door kanker veroorzaakte complicaties (bijv. botbreuken) als gevolg van uitzaaiingen in de botten of botkanker te helpen voorkomen. Het kan ook gebruikt worden in de behandeling van tumorgeïnduceerde hypercalcaemie (hoog calcium-gehalte in het bloed).

De bijwerking osteonecrose van de kaak (schade aan het kaakbot) is soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) gemeld bij patiënten die pamidronaat dinatrium-injecties krijgen. Deze bijwerking kan ook optreden na het stoppen van de behandeling.

Om het risico op het ontwikkelen van osteonecrose van de kaak te verminderen, dient u een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen:

Voor de behandeling

- Vraag uw arts om informatie over osteonecrose van de kaak voordat u met de behandeling begint.
- Vraag uw arts of hij/zij u een gebitsonderzoek aanraadt voordat u begint met behandeling van pamidronaat dinatrium.
- Vertel het uw arts/verpleegkundige/tandarts als u mond- of gebitsproblemen heeft.

Patiënten die tandchirurgie ondergaan (bijv. het trekken van kiezen of tanden), van wie het gebit niet regelmatig door een tandarts gecontroleerd wordt, aan tandvleesaandoeningen lijden, die roken, die verschillende soorten kankerbehandeling krijgen of die eerder zijn behandeld met een bisfosfonaat (gebruikt om botstoornissen te behandelen of te voorkomen) hebben een groter risico op het ontwikkelen van osteonecrose van de kaak.

Tijdens de behandeling

- U dient te zorgen voor een goede mondhygiëne, indien van toepassing voor een goed passende gebitsprothese en voor regelmatige gebitscontroles.
- Als u een gebitsbehandeling krijgt of tandchirurgie zal ondergaan (bijv. het trekken van kiezen of tanden), breng uw arts dan op de hoogte en vertel uw tandarts dat u met pamidronaat dinatrium wordt behandeld.
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u mond- of gebitsproblemen ervaart, zoals losse tanden of kiezen, pijn of zwelling, het niet genezen van zweren of afscheiding, aangezien dit tekenen van osteonecrose van de kaak kunnen zijn

Lees de bijsluiter voor meer informatie. Aanvullende informatie betreffende pamidronaat dinatrium is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl

Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. De naam en contactgegevens van de vergunninghouder staat vermeld op de verpakking en in de bijsluiter.