Naam

☎

☎ In geval van nood

Naam ziekenhuis

Naam specialist

☎ Specialist

Productnaam

NL-HUM-180024

Deze informatiekaart wordt geproduceerd door AbbVie
Goedgekeurd februari 2019

Bel direct uw arts of regel medische verzorging als u een van de volgende verschijnselen van deze mogelijke ernstige bijwerkingen heeft.

Infecties: Koorts, rillingen, ongebruikelijk zweten, zich onwel of vermoeider voelen dan normaal, ziek zijn of zich ziek voelen (bv. misselijkheid of braken), diarree, maagpijn, verlies van eetlust of gewicht, hoest, bloed of slijm ophoesten, kortademigheid, plasproblemen, huidzweertjes, wondjes, spierpijn, gebitsproblemen.
Kanker: Nachtelijk zweten; zwelling van de lymfeklieren in de nek, oksel, lies of andere gebieden; gewichtsverlies; nieuwe huidletsels of verandering in huidletsels (zoals huidvlekken of sproeten) die u al heeft; ernstige onverklaarbare jeuk.
Problemen met zenuwstelsel: Gevoelloosheid of tintelingen, veranderd zicht, spierzwakte, onverklaarde duizeligheid.

Vertel uw arts over alle ongebruikelijke verschijnselen tijdens behandeling met adalimumab. Dit zijn niet alle mogelijke verschijnselen van deze bijwerkingen.

Informatie voor u en de zorgverlener die betrokken is bij uw medische zorg of behandeling

Datum van uw eerste adalimumab injectie

Dosis van uw adalimumab injectie

Datum van uw laatste adalimumab injectie
(Als adalimumab niet meer wordt gebruikt)

Tuberculose (TB): Onderzoeken en behandeling
Vink het vakje aan als:

- ○ U ooit op TB getest bent
- ○ De uitslag van een test voor TB ooit positief was
- ○ U ooit medicijnen heeft gebruikt om TB te behandelen of te voorkomen
  (Als u het niet weet, overleg met uw arts)

Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab. Als u nog andere vragen heeft, overleg dan met uw arts of een andere zorgverlener.

ADALIMUMAB VEILIGHEIDSINFORMATIEKAART VOOR PATIËNTEN
(PATIËNTENKAART)

Deze kaart bevat geselecteerde belangrijke veiligheidsinformatie die u vóór en tijdens de behandeling met adalimumab moet weten.

- Houd deze kaart altijd bij u tot 4 maanden na uw laatste injectie met adalimumab.
- Laat deze kaart zien aan elke arts of zorgverlener die u bezoekt.
- Schrijf informatie over alle testen of behandelingen voor tuberculose die u heeft gehad achter op deze kaart.

Op deze kaart staan niet alle mogelijke bijwerkingen. Lees voor meer informatie over bijwerkingen de bijsluiter van adalimumab of raadpleeg uw arts.

Deze informatiekaart is ook terug te vinden in de geneesmiddeleninformatiebank op de CBG website (www.cbg-meb.nl)

Adalimumab is een geneesmiddel bedoeld voor de behandeling van bepaalde ziektes die een deel van het immuunsysteem beïnvloeden. Hoewel adalimumab effectief kan zijn bij de behandeling van deze ziektes, kunnen sommige mensen één of meer bijwerkingen ondervinden. Het is belangrijk om de mogelijk gunstige effecten en mogelijke bijwerkingen van adalimumab met uw arts te bespreken. Deze kunnen per persoon verschillen.

- Het doel van deze kaart is u te informeren over enkele mogelijke bijwerkingen van adalimumab.
- Enkele van de ernstige bijwerkingen die kunnen optreden zijn infecties, kanker en problemen met het zenuwstelsel.
- Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van adalimumab.

Om er zeker van te zijn dat adalimumab goed en veilig voor u werkt, moet u regelmatig met uw arts bespreken hoe het met u gaat. Als er iets aan uw gezondheidstoestand verandert, zeg dit dan direct tegen uw arts.

Vóór behandeling met adalimumab

Vertel uw arts over al uw gezondheidsproblemen en alle medicijnen die u gebruikt. Dit zal u en uw arts helpen bij het beslissen of adalimumab goed voor u is.

Vertel uw arts als u:

- Een infectie of verschijnselen van een infectie heeft (zoals koorts, wondjes, gevoel van vermoeidheid, gebitsproblemen).
- Tuberculose heeft of in nauw contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft.
- Kanker heeft (gehad).
- Last heeft van gevoelloosheid of tintelingen of een probleem heeft dat uw zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple sclerose.

Uw arts dient u voordat adalimumab wordt gestart, te controleren op tekenen en verschijnselen van tuberculose. Mogelijk moet u voor tuberculose worden behandeld voordat u start met adalimumab.

Vaccinaties voor u

Vaccinaties zijn toegestaan, behalve met levende vaccins.

Vaccinaties voor uw pasgeboren kind (indien van toepassing)

Als u adalimumab krijgt tijdens de zwangerschap, informeer dan de arts van uw kind voordat uw kind gevaccineerd wordt. Uw kind mag geen levende vaccins ontvangen zoals BCG (ter voorkoming van tuberculose), binnen 5 maanden na uw laatste adalimumab-injectie tijdens de zwangerschap.

Tijdens behandeling met adalimumab

- Houd uw arts op de hoogte over hoe adalimumab bij u werkt.
- Het is belangrijk om uw arts direct te bellen over eventuele ongebruikelijke verschijnselen die u mogelijk zult krijgen. Dit helpt ervoor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt. Tevens verkleint het de kans dat een bijwerking erger wordt.
- Veel bijwerkingen, waaronder infecties, kunnen worden behandeld als u direct uw arts informeert.
- Als u een bijwerking krijgt, zal uw arts besluiten of u met adalimumab moet stoppen of doorgaan. Het is belangrijk om met uw arts te overleggen om te achterhalen wat het beste voor u is.
- Omdat bijwerkingen kunnen optreden na uw laatste dosis adalimumab, moet u uw arts informeren over alle problemen die optreden tot 70 dagen na uw laatste injectie met adalimumab.

Vertel uw arts over: Alle nieuwe medische aandoeningen die u heeft. Nieuwe medicijnen die u gebruikt. Alle operaties die voor u gepland staan.

Sommige mensen die adalimumab gebruiken kunnen ernstige bijwerkingen krijgen, waaronder:
Infecties: Adalimumab kan mensen helpen bij bepaalde vormen van ontstekingsziektes. Het doet dit door een deel van het immuunsysteem te blokkeren. Maar datzelfde deel van het immuunsysteem helpt ook om infecties te bestrijden. Dat betekent dat adalimumab u vatbaarder kan maken voor infecties; ook kunnen infecties die u al heeft verergeren. Het betreft onder meer infecties als verkoudheid of ernstigere infecties zoals tuberculose.
Kanker: Wanneer u adalimumab gebruikt, kan het risico op het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker toenemen.
Problemen met zenuwstelsel: Sommige mensen hebben met adalimumab nieuwe of ergere problemen met het zenuwstelsel gekregen, waaronder multiple sclerose. Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab. Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen die tijdens behandeling met adalimumab kunnen optreden.

Naam

☎

☎ In geval van nood

Naam ziekenhuis

Naam specialist

☎ Specialist

Productnaam

Deze informatiekaart wordt geproduceerd door AbbVie
Goedgekeurd februari 2019

NL-HUM-180028

Bel direct de arts van uw kind of regel medische verzorging als hij of zij een van de volgende verschijnselen van deze mogelijke ernstige bijwerkingen heeft.

Infecties: Koorts, rillingen, ongebruikelijk zweten, zich onwel of vermoeider voelen dan normaal, ziek zijn of zich ziek voelen (bv. misselijkheid of braken), diarree, maagpijn, verlies van eetlust of gewicht, hoest, bloed of slijm ophoesten, kortademigheid, plasproblemen, huidzweertjes, wondjes, spierpijn, gebitsproblemen.
Kanker: Nachtelijk zweten; zwelling van de lymfeklieren in de nek, oksel, lies of andere gebieden; gewichtsverlies; nieuwe huidletsels of verandering in huidletsels (zoals huidvlekken of sproeten) die u al heeft; ernstige onverklaarbare jeuk.
Problemen met zenuwstelsel: Gevoelloosheid of tintelingen, veranderd zicht, spierzwakte, onverklaarde duizeligheid.

Vertel de arts van uw kind over alle ongebruikelijke verschijnselen die uw kind tijdens behandeling met adalimumab kan krijgen. Dit zijn niet alle mogelijke verschijnselen van deze bijwerkingen.

Informatie voor u en de zorgverlener die betrokken is bij de medische zorg of behandeling van uw kind

Datum van eerste adalimumab injectie van uw kind

Dosis van adalimumab injectie van uw kind

Datum van laatste adalimumab injectie van uw kind
(Als adalimumab niet meer wordt gebruikt)

Tuberculose (TB): Onderzoeken en behandeling
Vink het vakje aan als:

- ○ Uw kind ooit op TB getest is
- ○ De uitslag van een test voor TB ooit positief was
- ○ Uw kind ooit medicijnen heeft gebruikt om TB te behandelen of te voorkomen
  (Als u het niet weet, overleg met de arts van uw kind)

Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab. Als u nog andere vragen heeft, overleg dan met de arts van uw kind of een andere zorgverlener.

ADALIMUMAB VEILIGHEIDSINFORMATIEKAART VOOR KINDEREN
(PATIËNTENKAART)

Deze kaart bevat geselecteerde belangrijke veiligheidsinformatie die u vóór en tijdens de behandeling van uw kind met adalimumab moet weten.

- Houd deze kaart altijd bij u tot 4 maanden na de laatste injectie van uw kind met adalimumab.
- Laat deze kaart zien aan elke arts of zorgverlener die uw kind bezoekt.
- Schrijf informatie over alle testen of behandelingen voor tuberculose die uw kind heeft gehad achter op deze kaart.

Op deze kaart staan niet alle mogelijke bijwerkingen. Lees voor meer informatie over bijwerkingen de bijsluiter van adalimumab of raadpleeg de arts van uw kind.

Deze informatiekaart is ook terug te vinden in de geneesmiddeleninformatiebank op de CBG website (www.cbg-meb.nl)

Adalimumab is een geneesmiddel bedoeld voor de behandeling van bepaalde ziektes die een deel van het immuunsysteem beïnvloeden. Hoewel adalimumab effectief kan zijn bij de behandeling van deze ziektes, kunnen sommige mensen één of meer bijwerkingen ondervinden. Het is belangrijk om de mogelijk gunstige effecten en mogelijke bijwerkingen van adalimumab met de arts van uw kind te bespreken. Deze kunnen per persoon verschillen.

- Het doel van deze kaart is u te informeren over enkele mogelijke bijwerkingen van adalimumab.
- Enkele van de ernstige bijwerkingen die kunnen optreden zijn infecties, kanker en problemen met het zenuwstelsel.
- Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van adalimumab.

Om er zeker van te zijn dat adalimumab goed en veilig voor uw kind werkt, moet u regelmatig met zijn of haar arts bespreken hoe het met uw kind gaat. Als er iets aan uw gezondheidstoestand verandert, zeg dit dan direct tegen zijn of haar arts.

Vóór behandeling met adalimumab

Vertel de arts van uw kind over al zijn of haar gezondheidsproblemen en alle medicijnen die hij of zij gebruikt. Dit zal u en de arts van uw kind helpen bij het beslissen of adalimumab goed voor uw kind is.

Vertel de arts van uw kind als hij of zij:

- Een infectie of verschijnselen van een infectie heeft (zoals koorts, wondjes, gevoel van vermoeidheid, gebitsproblemen).
- Tuberculose heeft of in nauw contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft.
- Kanker heeft (gehad).
- Last heeft van gevoelloosheid of tintelingen of een probleem heeft dat uw zenuwstelsel beïnvloedt, zoals multiple sclerose.

Voordat adalimumab wordt gestart, moet de arts uw kind controleren op tekenen en verschijnselen van tuberculose. Mogelijk moet uw kind voor tuberculose worden behandeld voordat hij of zij start met adalimumab.

Vaccinaties voor uw kind

Vaccinaties bij uw kind zijn toegestaan, behalve met levende vaccins.

Vaccinaties voor de pasgeboren baby van uw kind

(indien van toepassing)

Als uw kind tijdens haar zwangerschap adalimumab krijgt, informeer dan de arts van haar baby voordat de baby gevaccineerd wordt. De baby van uw kind mag geen levende vaccins ontvangen zoals BCG (ter voorkoming van tuberculose), binnen 5 maanden na de laatste adalimumab-injectie van uw kind tijdens de zwangerschap.

Tijdens behandeling met adalimumab

- Houd de arts van uw kind op de hoogte over hoe adalimumab bij uw kind werkt.
- Het is belangrijk om de arts van uw kind direct te bellen over eventuele ongebruikelijke verschijnselen die uw kind mogelijk zal krijgen. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw kind de juiste zorg krijgt. Tevens verkleint het de kans dat een bijwerking erger wordt.
- Veel bijwerkingen, waaronder infecties, kunnen worden behandeld als u direct de arts van uw kind informeert.
- Als uw kind een bijwerking krijgt, zal zijn of haar arts besluiten of uw kind met adalimumab moet stoppen of doorgaan. Het is belangrijk om met de arts van uw kind te overleggen om te achterhalen wat het beste voor uw kind is
- Omdat bijwerkingen kunnen optreden bij uw kind, na laatste dosis adalimumab, moet u zijn of haar arts informeren over alle problemen die optreden tot 4 maanden na de laatste injectie van uw kind met adalimumab.

Vertel de arts van uw kind over: Alle nieuwe medische aandoeningen die uw kind heeft. Nieuwe medicijnen die uw kind gebruikt. Alle operaties die voor uw kind gepland staan.

Sommige mensen die adalimumab gebruiken kunnen ernstige bijwerkingen krijgen, waaronder:

Infecties: Adalimumab kan mensen helpen bij bepaalde vormen van ontstekingsziektes. Het doet dit door een deel van het immuunsysteem te blokkeren. Maar datzelfde deel van het immuunsysteem helpt ook om infecties te bestrijden. Dat betekent dat adalimumab uw kind vatbaarder kan maken voor infecties; ook kunnen infecties die hij of zij al heeft verergeren. Het betreft onder meer infecties als verkoudheid of ernstigere infecties zoals tuberculose.

Kanker: Wanneer uw kind adalimumab gebruikt, kan het risico op het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker toenemen.

Problemen met zenuwstelsel: Sommige mensen hebben met adalimumab nieuwe of ergere problemen met het zenuwstelsel gekregen, waaronder multiple sclerose. Lees voor meer informatie de bijsluiter van adalimumab. Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen die tijdens behandeling met adalimumab kunnen optreden.