

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Ventolin Injectie, oplossing voor injectie 0,5 mg/ml**

salbutamol

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Ventolin Injectie en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Ventolin Injectie en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Ventolin Injectie bevat als werkzame stof salbutamol. Salbutamol behoort tot een groep van medicijnen die kortwerkende luchtwegverwijders worden genoemd (effect duurt ongeveer 4-6 uur). Het helpt de luchtwegen in de longen open te houden, waardoor het gemakkelijker is om in en uit te ademen. Ventolin Injectie wordt gebruikt bij een acute behandeling van een ernstige astmatische aanval.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

**Als u een hartaandoening, een onregelmatige hartslag of een benauwd gevoel op de borst hebt of ooit hebt gehad moet u uw arts ervan op de hoogte brengen voordat met de toediening van dit medicijn wordt begonnen.**

Als u het medicijn digoxine gebruikt (medicijn dat wordt gebruikt bij hartritmestoornissen), moet uw arts ervan op de hoogte worden gebracht voordat met de toediening van Ventolin Injectie wordt begonnen.

U moet bedacht zijn op het feit dat in geval van een plotselinge of sterke verslechtering van het astma, een levensbedreigende situatie kan ontstaan. In deze situatie moet u direct contact opnemen met uw behandelend arts.

Als u een overmatige productie van de schildklier (thyrotoxicose) of suikerziekte (diabetes) heeft, moet uw arts ervan op de hoogte worden gebracht voordat met de toediening van dit medicijn wordt begonnen.

Als u verhoogde werkzaamheid van de schildklier (hyperthyreoïdie), onvoldoende werking van de hartspier (myocardinsufficiëntie), verhoogde bloeddruk (hypertensie) heeft en bij gebruik van hoge doseringen van andere medicijnen met een stimulerende invloed (sympathicomimetica), moet uw arts ervan op de hoogte worden gebracht voordat met de toediening van hoge doseringen van dit medicijn wordt begonnen.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Ventolin Injectie nog andere medicijnen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het risico op een te hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) en op een tekort aan kalium in het bloed (hypokaliëmie) wordt vergroot, indien tegelijkertijd intraveneus of oraal corticosteroiden worden gegeven. De kans op hypokaliëmie wordt ook vergroot bij gelijktijdig gebruik met theofylline (middel dat gebruikt wordt bij de behandeling van astma), met diuretica (plaspillen) en door zuurstoftekort in weefsel (hypoxie).

Gelijktijdig gebruik van salbutamol en (niet-selectieve) bètablokkers (middel dat gebruikt wordt voor hartritmestoornis), zoals propranolol, dient te worden vermeden tenzij er dwingende redenen zijn om deze bètablokkers te gebruiken.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt. Uw arts zal bepalen of bij u Ventolin Injectie wordt gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het is onwaarschijnlijk dat de mogelijke bijwerkingen van Ventolin Injectie invloed hebben op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

### **Ventolin Injectie bevat natrium**

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

### **Hoe wordt Ventolin Injectie toegediend?**

Ventolin Injectie kan direct in een ader (intraveneus), direct in de huid (subcutaan) of direct in een spier (intramusculair) ingespoten worden. Het inspuiten van Ventolin Injectie dient onder supervisie van een arts plaats te vinden.

Ventolin Injectie is bestemd voor gebruik bij volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van Ventolin Injectie.

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten:

- beving (tremor)
- zeer snelle hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties)

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten:

- hoofdpijn
- spierkrampen

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten:

- tekort aan kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie)
- vaatverwijding aan de buitenkant van het lichaam (perifere vasodilatatie)
- hartritmestoornissen

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten:

- overgevoeligheidsreacties waaronder jeukende zwelling veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheidsreactie (angio-oedeem), netelroos (urticaria), krampen in de spieren rond de luchtpijp (bronchospasmen), lage bloeddruk (hypotensie) en flauwvallen (collaps)
- melkzuurvergiftiging (lactaatacidose)

Zeer zelden is lactaatacidose beschreven bij patiënten die intraveneus en verneveld salbutamoltherapie ontvingen voor de behandeling van acute verergering van symptomen van astma (exacerbaties).

- hyperactiviteit
- lichte pijn of steken bij gebruik in de spieren (intramusculair) van onverdunde injectie

Onbekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld:

- hoewel niet precies bekend is hoe vaak het gebeurt, kunnen sommige mensen af en toe pijn in de borststreek voelen. Deze pijn kan veroorzaakt worden door hartproblemen. Vertel het aan uw arts (of indien u zwanger bent aan uw verloskundige) als zich bij u dergelijke symptomen voordoen terwijl salbutamol wordt toegediend
- plaatselijk tekort aan bloed bij de hartspier door een belemmering van de bloedtoevoer (myocardischemie)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking (ter bescherming tegen licht).

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stof in dit medicijn is salbutamol.

De andere stoffen in dit medicijn zijn natriumchloride, water voor injectie en verdund zwavelzuur of natriumhydroxide voor pH-instelling.

### **Hoe ziet Ventolin Injectie er uit en wat zit er in een verpakking?**

Oplossing voor injectie 0,5 mg/ml. Dit is een heldere vloeistof.

Ventolin Injectie wordt geleverd in verpakkingen van 5 ampullen van 1 ml.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Vergunninghouder**

GlaxoSmithKline BV  
Van Asch van Wijkstraat 55H  
3811 LP Amersfoort  
033 2081100

#### **Fabrikant**

Fidia Farmaceutici S.p.A.  
Via Ponte Della Fabbrica 3 A  
35031 Abano Terme  
Italië

Handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de GSK groep.

Ventolin Injectie, oplossing voor injectie 0,5 mg/ml is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 07687

### **Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2026.**

Meer informatie over dit medicijn kunt u vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: [www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)