

## 2. BIJSLUITER

**Afwerkformaat bijsluiter:** 148x250 mm

**Kleur bijsluiter:** brown PMS 412 C

**Voorzijde bijsluiter:**

VSM logo in blaadje

Nisyleen®  
Pelargonium  
tabletten

*Pelargonium sidoides* extract EPs® 7630

Bij verkoudheid [in kader]

Traditioneel  
kruidengeneesmiddel

**Binnenkant bijsluiter:**

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

**Nisyleen® Pelargonium tabletten**

Gedroogd wortelextract van *Pelargonium sidoides* (1:8-10) (EPs® 7630).

Extractiemiddel: 11% ethanol (g/g).

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Nisyleen Pelargonium tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Nisyleen Pelargonium tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?**

Nisyleen Pelargonium is een traditioneel kruidengeneesmiddel bij verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

## **2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

Als u overgevoelig (allergisch) bent voor *Pelargonium sidoides* extracten of een van de andere ingrediënten van Nisyleen Pelargonium tabletten.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel**

Er zijn gevallen van leverbeschadiging en leverontsteking gerapporteerd in associatie met het gebruik van dit geneesmiddel. Mochten er zich tekenen van een leverbeschadiging voordoen, dan dient u direct te stoppen met het gebruik en een arts te raadplegen.

Kinderen tot 6 jaar:

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik bij kinderen tot 6 jaar.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Tot nu toe zijn er geen interacties tussen Nisyleen Pelargonium tabletten en andere geneesmiddelen gerapporteerd.

Neemt u naast Nisyleen Pelargonium tabletten nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Nisyleen Pelargonium tabletten kan in combinatie met voeding worden ingenomen.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Er zijn geen vruchtbaarheidsgegevens beschikbaar en geen gegevens bekend over het gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Gebruik van Nisyleen Pelargonium tabletten wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen studies uitgevoerd naar het effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **Nisyleen Pelargonium tabletten bevat lactose**

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

## **3. Hoe neemt u dit middel in?**

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Nisyleen Pelargonium tabletten is bestemd voor inname via de mond.

*Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:*

3 maal per dag 1 tablet.

*Kinderen van 6 tot 12 jaar:*

2 maal per dag 1 tablet.

De tabletten bij voorkeur met wat vloeistof innemen.

Het gebruik van Nisyleen Pelargonium tabletten wordt niet aanbevolen bij kinderen tot 6 jaar.

Nadat de klachten zijn afgenomen, wordt het aanbevolen om de behandeling met Nisyleen Pelargonium tabletten nog een paar dagen voort te zetten.

#### **Heeft u te veel van dit middel ingenomen?**

Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.

#### **Bent u vergeten dit middel in te nemen?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het innemen van dit middel**

Er zijn geen effecten te verwachten als u stopt met het innemen van Nisyleen Pelargonium tabletten.

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Milde maag-darmklachten (diarree, ongemakken van de bovenbuik (epigastrische ongemakken), misselijkheid of braken, slikstoornis (dysfagie)), lichte neus- en tandvleesbloedingen en allergische reacties zijn gemeld. De frequentie van voorkomen is zeer zelden. Leverbeschadiging is gemeld. De frequentie van voorkomen is niet bekend.

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

#### **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de blisterverpakking na of onder de woorden "Niet te gebr. na" (niet te gebruiken na) of EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 30°C.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is per tablet: 20 mg gedroogd *Pelargonium sidoides* wortelextract (1:8 – 10) (EPs® 7630). Extractiemiddel: 11% ethanol (g/g).

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: maltodextrine, cellulose, lactose, croscarmellose natrium, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol, ijzeroxiden en ijzerhydroxiden (E172), titaandioxide (E171), talk, simeticon, methylcellulose, sorbinezuur.

### Hoe ziet Nisyleen Pelargonium tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten worden verpakt in een blisterverpakking van 20 stuks.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

VSM Geneesmiddelen bv  
Berenkoog 35, 1822 BH Alkmaar

### Fabrikant:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG  
Willmar-Schwabe-Str. 4, D-76227 Karlsruhe, Duitsland

### Neem voor meer informatie over dit geneesmiddel contact op met:

Heel Biologische Geneesmiddelen BV  
Telefoon: 0115-563 200 E-mail: [info@heelbv.nl](mailto:info@heelbv.nl)

Dit middel is in het register ingeschreven onder RVG nummer 100735.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2019.

©VSM