

**IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA**  
capsule, zacht

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 13 december 2021**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Bladzijde : 1**

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS**

**Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva, capsule, zacht**  
ibuprofen

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAT IS IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN GEBRUIKT?**

Elke met vloeistof gevulde zachte capsule bevat 400 mg ibuprofen.

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroidale anti-inflammatoire middelen (NSAID's) worden genoemd. Deze middelen verlichten pijn en verminderen ontsteking, zwelling en koorts.

Dit medicijn is bedoeld voor de verlichting van lichte tot matige pijn, waaronder reumatische pijn, spierpijn, rugpijn (spit), hoofdpijn, kiespijn, menstratiepijn, koorts en pijn bij verkoudheid en griep en koorts en pijn na vaccinatie. Het is ook bedoeld voor de verlichting van migraine (met of zonder aurasymptomen als gestoord gezichtsvermogen, gevoelloosheid of spraakstoornissen) en de bijbehorende symptomen als misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid.

**IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA**  
capsule, zacht

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 13 december 2021**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Bladzijde : 2**

**2. WANNEER MAG U DIT MEDICIJN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

**Lees de onderstaande informatie door.**

**Geef dit medicijn niet aan kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij op advies van een arts.**

**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U heeft een maagzweer of -bloeding in de maag of dunne darm of u heeft dit in het verleden vaker dan tweemaal gehad.
- U heeft in het verleden een maagzweer, een bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) of een maagperforatie gehad als gevolg van behandeling met dit medicijn of een andere NSAID.
- U lijdt aan een andere bloedings- of bloedziekte.
- U heeft last van astma-aanvallen of overgevoelighedsreacties (bv. huiduitslag) na eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers, zoals bv. acetylsalicylzuur (Aspirine).
- U lijdt aan ernstig lever, nier- of hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).
- U bent in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.
- Als u waterpokken (varicella) heeft, wordt aanbevolen het gebruik van ibuprofen te vermijden.
- U lijdt aan colitis ulcerosa (ontsteking van de dikke darm).
- U heeft last van bloedingen (ook in de hersenen) of bloedingsneiging.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt:

- als u astmatisch bent of last heeft van hooikoorts
- als u lever- of nierproblemen heeft
- als u lijdt aan een auto-immuunziekte, bijvoorbeeld systemische lupus erythematosus (SLE), een aandoening van het immuunsysteem waarbij bindweefsel wordt aangetast, met als gevolg gewrichtspijn, huidveranderingen en aandoeningen van andere organen. Patiënten die SLE of gemengde bindweefselziekte hebben, kunnen een groter risico hebben op hersenvliesontsteking (aseptische meningitis)
- als u lijdt of hebt geleden aan maag darm aandoeningen zoals Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn. Medicijnen zoals ibuprofen kunnen deze aandoeningen verergeren
- als u in de eerste zes maanden van uw zwangerschap bent
- als u tussen de 12 en 18 jaar oud bent in verband met een risico op een nierfunctiestoornis. Neem daarom contact op met uw arts wanneer u tussen de 12 en 18 jaar bent en niet voldoende vloeistof heeft gedronken of veel vocht heeft verloren als gevolg van continu braken of diarree
- als u hartklachten heeft zoals hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, bypassoperatie, perifere vaatlijden (slechte circulatie in de benen of voeten door nauwe of geblokkeerde slagaderen), of elke soort van beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of voorbijgaande beroerte "TIA") heeft gehad
- als u diabetes, hoog cholesterol of een familiegeschiedenis van hartziekte of beroerte heeft, of als u een roker bent

## Gerenvoieerde versie

### IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA capsule, zacht

#### MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 13 december 2021

Bladzijde : 3

- wanneer u een hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft, moet u voorzichtig zijn in verband met het mogelijk optreden van vochtophopingen (zie ook verderop 'effect op het hart en de hersenen' en rubriek 'Mogelijke bijwerkingen')
- als u een infectie heeft - zie rubriek 'infecties' hieronder. Door de ontstekingsremmende werking van Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Wees hierop attent.
- als u als u problemen heeft met de normale bloedstolling
- wanneer u last heeft van een zwarte, zeer vies ruikende ontlasting kan dit duiden op bloedverlies uit het maagdarmkanaal. Neem in dit geval contact op met uw arts.

#### *Huidreacties*

Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn. Zie rubriek 4.

#### *Infecties*

Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva kan symptomen van infecties, zoals koorts en pijn, verbergen. Het is daarom mogelijk dat dit middel de passende behandeling van een infectie vertraagt, wat kan leiden tot een verhoogd risico op complicaties. Dit is waargenomen in door bacteriën veroorzaakte longontsteking en bacteriële huidinfecties die kunnen voorkomen bij waterpokken. Als u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u een infectie heeft, en de symptomen van uw infectie blijven bestaan of worden erger, dan moet u direct een arts raadplegen.

#### *Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darm*

Als u eerder een maag- of darmzweer heeft gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden, moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling optreden. De reden hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding en zweren in het spijsverteringskanaal groter is, vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het spijsverteringskanaal optreden moet u stoppen met het gebruik van dit middel.

Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen zonder waarschuwing vooraf ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn. De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe naarmate de dosis ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden gebruikt (zie 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?').

#### *Effect op het hart en de hersenen*

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

## Gerenvoieerde versie

### IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA capsule, zacht

#### MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

##### 1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 13 december 2021

Bladzijde : 4

- hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypassoperatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.

#### Ouderen

Als u al wat ouder bent, heeft u sneller last van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie in het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.

De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

Na langdurige inname, hoge dosering en onzorgvuldig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn optreden welke niet behandeld kan worden met een grotere hoeveelheid per keer van het geneesmiddel. Als deze situatie zich voordoet dient u dit aan de arts te melden (zie rubriek 'Mogelijke bijwerkingen').

#### Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Ibuprofen kan nierproblemen veroorzaken bij kinderen en jongeren die uitgedroogd zijn.

#### Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva nog andere medicijnen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gebruik dit medicijn niet als u aspirine/acetylsalicylzuur in een dagdosering van meer dan 75 mg of andere NSAID-pijnstillers gebruikt.

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

- antistollingsmiddelen (middelen die bloed verdunnen/bloedstolling tegengaan, zoals aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine), vochtafdrijvende middelen (plastabletten - vergroten de hoeveelheid urine die u produceert)
- medicijnen die een hoge bloeddruk verlagen (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine-II-receptorantagonisten zoals losartan), of andere geneesmiddelen, omdat deze medicijnen en ibuprofen invloed kunnen hebben op elkaars werking
- corticosteroiden (bijnierschors hormonen met o.a. ontstekingsremmende werking, bijv. prednisolon (voor de behandeling van astma, huidaandoeningen en andere aandoeningen)), aangezien zij het risico op maagzweren of maagbloedingen kunnen vergroten
- trombocytenaggregatieremmers (doorgaans gebruikt als bloedverdunner om een beroerte of hartproblemen te voorkomen, zoals clopidogrel)
- hartglycosiden (voor patiënten met hartklachten)
- selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) (voor de behandeling van depressie), aangezien zij het risico op maagdarmklachten verhogen en zelfs bepaalde andere middelen of lithium (voor de

## Gerenvooiderde versie

### IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA capsule, zacht

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 13 december 2021**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Bladzijde : 5**

- behandeling van depressie)
- methotrexaat (voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker en voor de behandeling van psoriasis of reumatoïde artritis), omdat de concentratie methotrexaat 24 uur voor of na de inname van Ibuprofen Liquid Caps 400 mg Teva verhoogd kan worden
  - ciclosporine of tacrolimus (voor patiënten die een orgaantransplantatie ondergaan, en voor de behandeling van bepaalde huidaandoeningen)
  - zidovudine (voor de behandeling van hiv-infectie)
  - quinolon-antibiotica (een klasse van antibiotica voor de behandeling van bepaalde infecties)
  - fenytoïne (voor de behandeling van epilepsie)
  - antacida (maagzuurremmers, tegen indigestie)
  - ontkroezende haarmiddelen; het haar kan afbreken.

Bepaalde andere medicijnen kunnen ook de behandeling met Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva beïnvloeden of er door beïnvloed worden. Vraag daarom altijd een arts of apotheker om advies voordat u ibuprofen in combinatie met andere medicijnen gebruikt.

#### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Wanneer u regelmatig alcohol drinkt en langdurig ibuprofen gebruikt, heeft u een verhoogd risico op slokdarm- en maagbloedingen.

#### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

##### *Zwangerschap*

Uw arts schrijft de behandeling tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen voor als dit strikt noodzakelijk is.

Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij het ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het eind van de zwangerschap wordt gebruikt kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, en de kracht van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd.

##### *Borstvoeding*

Ibuprofen komt in zeer lage concentraties voor in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat het gebruik van ibuprofen bij een kortdurende behandeling negatieve gevolgen heeft voor uw baby. Als echter een langere behandelduur wordt voorschreven, dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden.

##### *Vruchtbaarheid*

Dit product behoort tot een groep medicijnen, NSAID's, die de vruchtbaarheid van de vrouw kan verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer het gebruik van het medicijn wordt gestaakt. Het is niet waarschijnlijk dat ibuprofen bij incidenteel gebruik uw kans op zwangerschap beïnvloedt, maar als u

## Gerenvooidere versie

### IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA capsule, zacht

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 13 december 2021**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Bladzijde : 6**

moeilijk zwanger kunt worden of van plan bent zwanger te raken, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u dit medicijn gebruikt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het gebruik van Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie rubriek 'Mogelijke bijwerkingen'). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

#### **Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva bevat sorbitol**

Dit middel bevat 71 mg sorbitol per capsule.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

### **3. HOE GEBRUIKT U DIT MEDICIJN?**

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit medicijn is uitsluitend bedoeld voor kortdurend gebruik. De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de symptomen te verlichten. Als u een infectie hebt, raadpleeg dan direct een arts als de symptomen (zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden (zie rubriek 2).

Wanneer u tussen de 12 en 18 jaar bent en u dit medicijn langer dan 3 dagen nodig heeft, of wanneer de klachten aanhouden of verergeren, neem contact op met uw arts.

#### Duur van de behandeling

Gebruik dit medicijn niet langer dan 14 dagen. Als de symptomen verergeren of niet beter zijn geworden na 14 dagen, raadpleeg dan uw arts.

#### Dosering voor volwassenen, oudere mensen, kinderen en adolescenten tussen 12 en 18 jaar

De eerste dosis is 400 mg, zo nodig gevolgd door 200-400 mg per keer met een maximum van 1200 mg per dag (= 24 uur). De aanbevolen periode tussen 2 doseringen is ongeveer 6 tot 8 uur. De periode tussen twee doseringen mag niet korter zijn dan 4 uur.

Een dosering van 200 mg is met deze capsules niet mogelijk. Hiervoor zijn ibuprofen capsules of tabletten van 200 mg verkrijgbaar.

#### Wijze van gebruik

De capsules moeten met water worden ingenomen. Niet op de capsules kauwen.

#### **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Als u te veel capsules heeft ingenomen of als kinderen dit middel per ongeluk hebben ingenomen,

**IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA**  
capsule, zacht

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**  
1.3.1 : Bijsluiter

**Datum : 13 december 2021**  
**Bladzijde : 7**

neemt u onmiddellijk contact op met uw arts of dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een beoordeling van het risico en een advies over de actie die moet worden ondernomen.

Neem de verpakking van uw geneesmiddel en deze bijsluiter mee.

Mogelijke symptomen zijn misselijkheid, maagpijn, buikpijn, overgeven (mogelijk met bloed), hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, oogbevingen, diarree (eventueel met bloed) en dubbelzien. Bij hoge doses zijn slaperigheid, pijn in de borst, hartkloppingen, bewusteloosheid, aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsie) (voornamelijk bij kinderen), zwakte en duizeligheid, bloed in urine, gevoel van een koud lichaam en ademhalingsmoeilijkheden gemeld. In ernstige gevallen kunnen optreden vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit), nierfunctiestoornissen, verlaagde bloeddruk en coma. In ernstige gevallen zal uw arts u laten braken en eventueel een maagspoeling uitvoeren.

**Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Wanneer u een dosis gemist heeft, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Als u stopt met het innemen van dit middel**

U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva, tenzij uw arts anders aangegeven heeft. Wanneer u stopt met het gebruik van Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva, kunnen de klachten terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk medicijn kan dit medicijn bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen en een langere behandelduur.

**De onderstaande bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop met het gebruik van Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende bijwerkingen optreden:**

**Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers**

- Maagzweer of -perforatie. Symptomen kunnen ernstige buikpijn, bloedbraken (of braken van vloeistof met wat eruitziet als gemalen koffie), bloed in de ontlasting of zwarte teerachtige ontlasting zijn.

**Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers**

- Hersenvliesontsteking (meningitis). Symptomen kunnen een stijve nek, hoofdpijn, ziek zijn of

## Gerenvoieerde versie

### IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA capsule, zacht

#### MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

##### 1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 13 december 2021

Bladzijde : 8

- voelen, koorts of desoriëntatie zijn.
- Ernstige allergische reacties (kunnen levensbedreigend zijn). Symptomen kunnen allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, netelroos, flauwvallen, lage bloeddruk, versnelde hartslag, zwelling van het gezicht, de tong en de keel (angio-oedeem), kortademigheid, piepende ademhaling, moeite met ademen of levensbedreigende shock zijn.
- Astma/verergering van astma of moeite met ademen.
- Ernstige huidaandoeningen dat zich kan uiten op de mond en op andere lichaamsdelen. Deze kunnen leiden tot ernstige huid irritaties die beginnen met pijnlijke rode plekken en dan grote blaren worden die uiteindelijk resulteren in het vervellen van de huid rondom de mond, neus, ogen of geslachtsdeel. Dit kan gepaard gaan met koorts en rillingen, spierpijn en een algemeen onwel gevoel (Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse).
- Leverproblemen. Een symptoom kan zijn geelverkleuring van de huid of het oogwit.

#### **Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)**

- Een ernstige huidreactie, bekend als DRESS-syndroom, is mogelijk. Symptomen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeklieren en een toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
- Een rode uitslag op uw huid met bultjes onder de huid en blaren. In de bultjes zit pus. De uitslag zit vooral bij uw huidplooiën, romp en bovenste ledematen en gaat samen met koorts aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose AGEP). Stop met het innemen van dit middel als u last krijgt van deze klachten en roep direct medische hulp in. Zie ook rubriek 2.

#### **Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:**

##### **Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers**

- Buikpijn.
- Indigestie.
- Brandend maagzuur.
- Misselijkheid.

##### **Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers**

- Wazig zien of andere oogproblemen, zoals overgevoeligheid voor licht.
- Allergische reacties als netelroos (galbulten), huiduitslag, jeuk (of systemische lupus erythematosus - SLE), astma-aanvallen (soms met lage bloeddruk).

##### **Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers**

- Verminderd gezichtsvermogen.
- Plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan.

Medicijnen als ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een iets verhoogd risico op een

**IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA**  
capsule, zacht

**MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 13 december 2021**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Bladzijde : 9**

hartaanval ("myocardinfarct") of beroerte.

Andere mogelijke bijwerkingen

Krijgt u veel last van een van de volgende bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers**

- Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals diarree, misselijkheid, braken, winderigheid, obstipatie.

**Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers**

- Zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie.
- Darmontsteking en verergering van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het spijsverteringsstelsel (ziekte van Crohn) en complicaties van uitstulpingen van de dikke darm (perforatie of fistel).
- Microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede.
- Zweetjes en ontstekingen in de mond.
- Slaperigheid, draaierigheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en prikkelbaarheid.

**Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers**

- Hoofdpijn of duizeligheid.
- Ontsteking van de binnenbekleding van de maag.
- Nierproblemen (een mogelijk symptoom is zwelling van de enkels), inclusief nierontsteking en nierfalen.
- Loopneus.
- Moeite met ademen (bronchospasme).

**Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers**

- Je ziek voelen.
- Depressie, verwardheid, hallucinaties.
- Lupus erythematosus (een auto-immuunziekte die zich uit in huidaandoeningen).
- Verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, verlaging van hemoglobine- en hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het serum en verhoging van de hoeveelheid urinezuur in het serum.

**Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers**

- Daling van het aantal bloedcellen, wat kan leiden tot een bleke of gele huid, koorts, keelpijn, kleine zweetjes in de mond, griepachtige verschijnselen, uitputting of zwakte, gemakkelijk optredende bloedingstoringen of huid- of neusbloedingen.
- Hoge bloeddruk, hartfalen, pijn op de borst, onaangename bewustheid van de hartslag, hartaanval.
- Nervositeit.
- Oorsuizen en duizeligheid of zoemend geluid in de oren.

## Gerenvoieerde versie

### IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA capsule, zacht

#### MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

##### 1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 13 december 2021

Bladzijde : 10

- Ernstige huidreacties. Een mogelijk symptoom is blaarvorming.
- Bloed in de urine en schuimige urine.
- Ontsteking van de slokdarm of alvleesklier.
- Vernauwing van de darm.
- Acute leverontsteking, gelige verkleuring van de huid of het oogwit, leverfunctiestoornis, leverbeschadiging of leverfalen.
- Hersenvliesontsteking zonder bacteriële infectie.
- Beschadiging van het nierweefsel.
- Haaruitval.
- Stoornissen in de menstruatiecyclus.

#### **Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)**

- Huid kan gevoelig worden voor licht.

Ibuprofen kan een verlaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, en uw weerstand tegen infecties kan verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige verslechtering van uw algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere keel/keelholte/mond of problemen met urineren, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Men zal bloedonderzoek doen om te controleren of het aantal witte bloedcellen is verminderd (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts inlicht over uw medicijngebruik.

Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking gemeld (met symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie) bij patiënten met bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde bindweefselaandoening.

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. HOE BEWAART U DIT MEDICIJN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## Gerenvooiderde versie

### IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA capsule, zacht

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Datum : 13 december 2021**

**Bladzijde : 11**

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is ibuprofen.  
Elke met vloeistof gevulde zachte capsule bevat 400 mg ibuprofen.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn:  
*Inhoud van de capsule:* polyethyleenglycol 400, sorbitanmonooleaat, PVPK-30 kaliumhydroxide (E525), gezuiverd water.  
*Capsule-omhulling:* gelatine (E441), polyethyleenglycol 400, sorbitol (E420), gezuiverd water, triglyceriden.  
*Bedrukking:* drukinkt (schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol, ammoniumhydroxide).

### Hoe ziet Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De zachte capsules zijn doorzichtig en ovaal van vorm met daarin kleurloze tot lichtgele doorzichtige stroperige vloeistof. Op de capsule staat met zwarte letters "400" gedrukt.

Ibuprofen Liquid caps 400 mg Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 12, 20, 24, 30, 48 of 50 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

Teva Nederland B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

*Fabrikant*

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

### In het register ingeschreven onder

RVG 106049

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2022.

**Gerenvooiderde versie**

**IBUPROFEN LIQUID CAPS 400 MG TEVA**  
capsule, zacht

**MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Datum : 13 december 2021**

**Bladzijde : 12**

1221.18v.LD