

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Loratadine Chefaro 10 mg, tabletten Loratadine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Loratadine Chefaro niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Loratadine Chefaro?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit Loratadine Chefaro?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Loratadine Chefaro en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Loratadine Chefaro bevat loratadine, en behoort tot de groep geneesmiddelen die antihistaminica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen helpen de verschijnselen (symptomen) van bepaalde overgevoelighedsreacties (allergieën) te verlichten.

Loratadine Chefaro wordt gebruikt om de volgende verschijnselen te verlichten:

- Verschijnselen van hooikoorts en andere allergieën zoals niezen, lopende neus of branderige, jeukende ogen.
- Verschijnselen van chronische huiduitslag met onbekende oorzaak (jeuk en roodheid) die vaak bekend is als netelroos.

2. Wanneer mag u Loratadine Chefaro niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Loratadine Chefaro kan gebruikt worden door volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar **die zwaarder zijn dan 30 kg.**

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

- Als u een leveraandoening heeft. Het kan zijn dat u een lagere dosering moet gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Loratadine Chefaro nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Laboratoriumtesten:

Als u een allergietest op de huid moet ondergaan, moet u tenminste 48 voor deze test stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Loratadine Chefaro kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Er is niet gebleken dat Loratadine Chefaro de effecten van alcohol versterkt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het gebruik van Loratadine Chefaro wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, als u denkt zwanger te zijn of dit te worden, vraag u arts of apotheker dan om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Onderzoeken hebben aangetoond dat loratadine bij de overgrote meerderheid van de gebruikers geen slaperigheid veroorzaakt.

Daarom zal het onder normale omstandigheden geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Het kan in zeer zeldzamen gevallen echter voorkomen dat u duizelig, misselijk of slaperig wordt. Rijd dan geen auto en gebruik geen machines.

Loratadine Chefaro bevat lactose

Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u Loratadine Chefaro?

Leeftijd	Dosering
Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar en met een gewicht van meer dan 30 kg.	Gebruik één tablet per dag met water
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 2 jaar of met een gewicht onder de 30 kg. Als richtlijn: een gemiddeld kind van 9 jaar oud weegt ongeveer 30 kg. Controleer het gewicht van het kind als u niet zeker bent, voor u hen dit geneesmiddel geeft.	
Als u een ernstige leveraandoening heeft: Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar en met een gewicht van meer dan 30 kg. (Raadpleeg uw arts apotheker)	Gebruik één tablet om de dag met water (per 2 dagen één tablet).
GEBRUIK NIET MEER DAN DE VOORGESCHREVEN DOSIS	

Gebruik dit geneesmiddel precies zoals voorgeschreven in deze bijsluiter of door uw arts of apotheker.
Raadpleeg u arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Als de verschijnselen ernstiger worden of niet beter worden na 3 dagen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Raadpleeg direct uw arts, of ga naar de spoedeisende hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem het doosje en deze bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem de aanbevolen dosering zo gauw als u zich dit herinnert; wacht tenminste 24 uur voor u een volgende tablet gebruikt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen die bij het gebruik van Loratadine Chefaro zijn gemeld zijn. De frequentie is als volgt gedefinieerd:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

niet bekend (op basis van de beschikbare gegevens kan de frequentie niet worden bepaald)

Stop het gebruik van de tabletten, meld dit aan uw arts of ga direct naar de spoedeisende hulpafdeling als:

- uw gezicht, lippen of keel dik worden
- u moeilijkheden ondervindt bij het slikken of ademen
- uw huid rood wordt na het gebruik van de tabletten

Deze genoemde verschijnselen kunnen betekenen dat u een erg zeldzame, allergische reactie heeft op dit geneesmiddel.

Vaak:

- hoofdpijn, zenuwachtigheid en vermoeidheid bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar

Zeer zelden:

- duizeligheid
- tachycardie (versnelde hartslag), hartkloppingen
- droge mond, misselijkheid, maag van streek
- abnormale leverfunctie
- huiduitslag, haar uitval
- vermoeidheid

Niet bekend:

- slaperigheid, hoofdpijn, verhoogde eetlust en slaapproblemen bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
- gewichtstoename

5. Hoe bewaart u Loratadine Chefaro ?

Voor dit product zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voor bewaring nodig.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u veranderingen ziet aan het uiterlijk van de tablet.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is: 10 mg loratadine per tablet.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel is (zijn) lactose monohydraat, gepregelatineerd zetmeel en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Loratadine Chefaro eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Loratadine zijn witte ovale tabletten met één gladde kant en aan de ander zijde is er een “L” ingedrukt aan één kant van de breuklijn, en “10” aan de andere kant van de breuklijn.

De verpakking bevat 7, 10, 14, 20, 21, 30, 50 of 100 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Chefaro Ireland DAC
The Sharp Building
Hogan Place
Dublin 2
Ierland

Fabrikant

Galpharm International Ltd,
Dodworth Business Park,
Dodworth, Barnsley,
South Yorkshire S75 3SP
Verenigd Koninkrijk

TEVA UK Limited
Brampton Road, Hampden Park,
Eastbourne, East Sussex,
BN22 9AG
Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder RVG 110740.

Dit geneesmiddel is ‘geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Hongarije	: Loratadine Chefaro 10mg tabletta
Malta	: Loratadine Chefaro
Nederland	: Loratadine Chefaro 10 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2021.