

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Eptadone[®] Drank Suikervrij 1 mg/ml Methadon hydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Deze bevat belangrijke informatie voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Als een of meer bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiter zijn vermeld

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is EPTADONE[®] Drank Suikervrij en waar wordt het voor gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u EPTADONE[®] Drank Suikervrij inneemt
3. Hoe wordt EPTADONE[®] Drank Suikervrij ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u EPTADONE[®] Drank Suikervrij?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is EPTADONE[®] Drank Suikervrij en waar wordt het voor gebruikt

EPTADONE[®] Drank Suikervrij bevat een geneesmiddel methadon genaamd. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die inwerkt op het zenuwstelsel, zoals morfine en diamorfine (ook wel heroïne genoemd). Ze worden soms ook wel 'opiaten' genoemd. EPTADONE[®] Drank Suikervrij is een vloeibaar geneesmiddel dat uitsluitend bestemd is voor orale toediening.

EPTADONE[®] Drank Suikervrij wordt voorgeschreven voor:

- de behandeling van verslaving aan geneesmiddelen zoals morfine of heroïne (opiaten). Het fungeert als vervanging van de verslavende drugs. EPTADONE[®] Drank Suikervrij is verslavend en kan leiden tot symptomen van afhankelijkheid, maar het is minder verslavend dan geneesmiddelen zoals heroïne of morfine.

2. Wat u moet weten voordat u EPTADONE[®] Drank Suikervrij inneemt

Gebruik EPTADONE[®] Drank Suikervrij niet als:

- u allergisch (overgevoelig) bent voor methadon hydrochloride of één van de andere bestanddelen van EPTADONE[®] Drank Suikervrij (vermeld in sectie 6)
- als u een hoofdwond of verhoogde druk in de schedel heeft gehad
- als u een zeer grote hoeveelheid alcohol heeft gedronken ('alcoholvergiftiging')
- als u hartproblemen heeft
- als u ernstige ademhalingsmoeilijkheden heeft ('ademhalingsdepressie') of longproblemen
- als uw weefsels blauw gekleurd zijn door te weinig zuurstof

Gebruik EPTADONE[®] Drank Suikervrij niet als één van de bovenvermelde punten op u van toepassing is.

Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts voordat u EPTADONE® Drank Suikervrij inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg voor het innemen van het geneesmiddel eerst uw arts of apotheker als:

- u een gestoorde nierfunctie heeft
- u een gestoorde leverfunctie heeft
- u ernstige hoofdpijn heeft of onlangs hoofdletsel heeft opgelopen
- u een gestegen druk in het hoofd waarneemt
- u lijdt aan een hartziekte of hartritmestoornissen
- u door uw arts is verteld dat u een 'verstoring van de elektrolytenbalans' heeft zoals 'hypokaliëmie'
- u een lage bloeddruk heeft
- u in een shock verkeert (u heeft eventueel een zeer lage bloeddruk die kan leiden tot een bezwijking)
- u een onvoldoende actieve schildklier heeft
- u een overactieve bijnier heeft
- u een man bent met prostaatproblemen
- u bejaard bent (ouder dan 65 jaar).
- u zich over het algemeen onwel voelt.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker voordat u EPTADONE® Drank Suikervrij inneemt.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u een van de volgende symptomen krijgt terwijl u EPTADONE® Drank Suikervrij inneemt:

- Zwakte, vermoeidheid, verlies van de eetlust, misselijkheid, braken of lage bloeddruk. Dit kan een teken zijn dat de bijniereen onvoldoende van het hormoon cortisol aanmaken en het kan zijn dat u een hormoonsupplement moet innemen.

Gewenning, afhankelijkheid en verslaving

Dit geneesmiddel bevat methadon. Dat is een sterke pijnstillers (opium). Door herhaald gebruik van opiaten is het mogelijk dat het geneesmiddel minder goed werkt (u went eraan; dit wordt ook gewenning (tolerantie) genoemd). Herhaald gebruik van EPTADONE® Drank Suikervrij kan ook leiden tot afhankelijkheid, misbruik en verslaving. Deze kunnen leiden tot een levensbedreigende overdosis.

Afhankelijkheid of verslaving kan u het gevoel geven dat u niet meer onder controle heeft hoeveel geneesmiddel u moet innemen of hoe vaak u het moet innemen.

Het risico op afhankelijkheid of verslaving is voor elke persoon anders. U heeft mogelijk een groter risico op afhankelijkheid of verslaving van EPTADONE® Drank Suikervrij als:

- u of iemand in uw familie ooit misbruik heeft gemaakt of afhankelijk is geweest van alcohol, voorgeschreven geneesmiddelen of illegale drugs ('verslaving');
- u rookt;
- u ooit problemen heeft gehad met uw gemoedstoestand (depressie, angst of een persoonlijkheidsstoornis) of voor andere geestelijke ziektes bent behandeld door een psychiater.

Als u een van de volgende klachten opmerkt tijdens gebruik van EPTADONE® Drank Suikervrij, kan dat erop wijzen dat u afhankelijk of verslaafd bent geworden.

– U moet het geneesmiddel langer innemen dan door uw arts wordt geadviseerd.

- U moet meer dan de aanbevolen dosis innemen.
- U gebruikt het geneesmiddel voor andere redenen dan voorgeschreven, bijvoorbeeld ‘om rustig te blijven’ of ‘als hulpmiddel om te kunnen slapen’.
- U heeft herhaalde, mislukte pogingen gedaan om te stoppen met het gebruik van het geneesmiddel of het gebruik van het geneesmiddel onder controle te brengen.
- U voelt zich onwel wanneer u stopt met het gebruik van geneesmiddel en u voelt zich beter wanneer u het geneesmiddel opnieuw gebruikt (‘ontwenningverschijnselen’).

Merkt u een van deze klachten op? Neem dan contact op met uw arts om te bespreken welke behandelwijze voor u het beste is, met inbegrip van wanneer voor u het beste moment is om te stoppen en hoe u op een veilige manier kunt stoppen (zie rubriek 3, Als u stopt met het gebruik van dit middel).

Problemen met ademen die verband houden met de slaap

EPTADONE® Drank Suikervrij kan leiden tot problemen met ademen die verband houden met de slaap zoals kort stoppen van uw ademhaling tijdens de slaap (slaapapneu) en een lage zuurstofwaarde in het bloed (slaapgerelateerde hypoxemie). De klachten kunnen zijn: kort stoppen van uw ademhaling tijdens de slaap, 's nachts wakker worden vanwege kortademigheid, problemen bij het doorslapen of zich erg suf voelen overdag. Merkt u of iemand anders deze klachten op? Neem dan contact op met uw arts. Uw arts kan een verlaging van de dosis in overweging nemen.

Langdurig gebruik kan een lager gehalte aan geslachtshormonen en een hoger gehalte aan prolactine veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u klachten krijgt zoals minder zin in seks, geen stijve penis kunnen krijgen bij seksuele opwinding (impotentie) of afwezigheid van menstruatie (amenorroe).

Andere geneesmiddelen en EPTADONE® Drank Suikervrij

Overleg met uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk zal gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, waaronder kruidengeneesmiddelen. Dit komt omdat EPTADONE® Drank Suikervrij de werking van sommige geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook sommige andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op werking van EPTADONE® Drank Suikervrij

Neem dit geneesmiddel niet in en overleg met uw arts als u het volgende soort geneesmiddel gebruikt:

- Antidepressiva met de naam MAO-remmers (Mono-amineoxydaseremmers) of de laatste 2 weken heeft gebruikt. MAO-remmers zijn geneesmiddelen zoals moclobemide, fenelzine en tranylcypromine.

Overleg met uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- Antischimmelmiddelen zoals fluconazol, itraconazol of ketoconazol
- Anti-epileptica, zoals barbituraten, fenytoïne of carbamazepine
- Antidiarrhoica, zoals loperamide of difenoxylaet
- Geneesmiddelen die de zuurtegraad van de urine beïnvloeden, zoals ammoniumchloride
- Geneesmiddelen die worden gebruikt om de effecten van opiaten tegen te gaan, zoals naltrexon
- Geneesmiddelen die worden gebruikt om verslaving te behandelen, zoals buprenorfine
- Antidepressiva, zoals fluoxetine, paroxetine, sertraline, nefazodon of fluvoxamine

- Geneesmiddelen tegen HIV zoals nevirapine, delavirdine, didanosine, stavudine, zidovudine, ritonavir, abacavir of efavirenz
- Antibiotica zoals rifampicine, claritromycine of erytromycine
- Sterke pijnstillers zoals morfine, butorfanol, nalbufine, pentazocine
- Naloxon gebruikt om de effecten van opiaten tegen te gaan
- Octreotide gebruikt om bepaalde vormen van kanker te behandelen en om secreties te verminderen
- Verapamil gebruikt bij hartproblemen
- 'Cannabinoïden' gebruikt als pijnstiller, zoals dronabinol en nabilone
- Metamizol, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om pijn en koorts te behandelen
- Cannabidiol (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van epileptische aanvallen)
- Gabapentine en pregabaline (geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van epilepsie, pijn door een zenuw, of angst) kunnen leiden tot een verhoogd risico op overdosis van opiaten, problemen met ademen (onderdrukte ademhaling) en kunnen levensbedreigend zijn.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker voordat u EPTADONE® Drank Suikervrij inneemt.

Het gebruik van Eptadone Drank Suikervrij en kalmerende geneesmiddelen zoals benzodiazepines of aanverwante geneesmiddelen moet vermeden worden vanwege de onderlinge versterking van de werkingen en de bijwerkingen zoals problemen met de ademhaling (ademdepressie) en slaperigheid. Daarnaast kan de combinatie leiden tot een coma en de dood. Vanwege deze risico's wordt de combinatie alleen voorgeschreven aan patiënten bij wie geen alternatieve behandelopties mogelijk zijn.

Wanneer een arts ervoor kiest om Eptadone Drank Suikervrij in combinatie met sterk versuffende middelen voor te schrijven, moet deze de behandelduur en dosering van de combinatie therapie limiteren.

Vertel uw arts over alle versuffende middelen die u inneemt en volg de dosis aanwijzingen van uw arts op. Het kan helpen om uw naasten (vrienden en familie) te informeren over de bovenstaande symptomen. Raadpleeg uw arts wanneer u deze symptomen ervaart.

Het risico op bijwerkingen wordt hoger als u methadon gelijktijdig gebruikt met medicijnen tegen depressie (zoals citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine, amitriptyline, clomipramine, imipramine, nortriptyline). Raadpleeg uw arts als u klachten krijgt zoals:

- veranderingen in mentale staat (bv. zich zenuwachtig, opgewonden of onrustig voelen (agitatie), dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties), coma)
- snelle hartslag, onstabiel bloeddruk, koorts
- overdreven reflexen, verslechterde coördinatie, spierstijfheid
- maag-darmklachten (bv. misselijkheid, braken, diarree)

EPTADONE® Drank Suikervrij in combinatie met voedsel, drank en alcohol

Drink geen alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Alcohol kan de bijwerkingen van methadon zoals ademhalingsproblemen en duizeligheid als gevolg van een lage bloeddruk versterken. Drink geen grapefruitsap terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Grapefruitsap kan het effect van methadon wijzigen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

- Neem EPTADONE® Drank Suikervrij niet in als u moet bevallen of aan het bevallen bent.
- Als u zwanger bent, zwanger denkt te zijn of van plan bent zwanger te worden, vraag dan uw arts om advies voordat u EPTADONE® Drank Suikervrij inneemt
- Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of als u erover denkt om borstvoeding te geven terwijl u methadon neemt. Dit kan namelijk invloed hebben op uw baby. Controleer uw baby op abnormale verschijnselen, zoals verhoogde slaperigheid (meer dan gewoonlijk), ademhalingsproblemen of slaperigheid. Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u een van deze verschijnselen opmerkt.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines:

Van EPTADONE® Drank Suikervrij kunt u slaperig en minder alert worden. De rijvaardigheid en de bekwaamheid om werktuigen of machines te bedienen worden nadelig beïnvloed.

- Dit komt voor tijdens en gedurende enige tijd na het gebruik.
- Neem alleen aan het verkeer deel of bedien alleen werktuigen of machines als uw arts u hiervoor toestemming geeft.

EPTADONE® Drank Suikervrij bevat glycerol - bij inname van grote hoeveelheden kan dit hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

3. Hoe wordt EPTADONE® Drank Suikervrij ingenomen?

Volg bij het innemen van dit geneesmiddel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

- Neem niet meer of minder dan de voorgeschreven dosis.
- Neem het niet vaker of minder vaak in dan u is voorgeschreven.
- Neem het niet voor een langere tijd in dan uw arts u heeft voorgeschreven.
- Dit geneesmiddel is bestemd voor orale toediening.
- De sterkte van deze vloeistof is 1 mg (milligram) per ml.

Als u merkt dat EPTADONE® Drank Suikervrij te veel of te weinig effect heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

- De aanbevolen dosis is 10 tot 20 mg (10 tot 20 ml) per dag
- De dosis kan oplopen tot 40 en max. 60 mg (40 tot 60 ml) per dag. Dit zal afhangen van het effect dat het geneesmiddel op u heeft
- Het wordt aanbevolen om bij een dagelijkse dosering van 100 mg Eptadone 5 of 10 mg/ml van het product te gebruiken, ter voorkoming van eventuele laxerende effecten van xylitol, die kunnen optreden bij een Suikervrije formulering van 1mg/ml bij een dosis van 100 mg.

Wanneer u te veel van EPTADONE® Drank Suikervrij heeft ingenomen

Wanneer u te veel van EPTADONE® Drank Suikervrij heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis. Neem de verpakking mee. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- ademhalingsproblemen
- slaperigheid, (bijna) bewusteloosheid of coma
- pupilconstrictie
- koude en klamme huid
- een zeer lage hartslag
- spierzwakte
- lage bloedsuikerspiegel

- een ziekte van de hersenen (dit wordt toxische leuko-encefalopathie genoemd).
In extreme gevallen kan uw ademhaling of bloedstroom stoppen en kunt u een hartaanval krijgen.

Wanneer u bent vergeten EPTADONE® Drank Suikervrij in te nemen

- Wanneer u een dosis bent vergeten, neem dan geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Stop nooit met de inname van EPTADONE® Drank Suikervrij zonder eerst uw arts te raadplegen

Plotselinge stopzetting kan bijwerkingen veroorzaken. Als u de inname van EPTADONE® Drank Suikervrij moet stopzetten, dan zal uw arts de doseringen geleidelijk afbouwen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan EPTADONE® Drank Suikervrij bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer Vaak(komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- ademhalingsproblemen of verergerde vorm van astma
- hoofdpijn, gevoel van zwakte, slaperigheid of verwardheid, slaapproblemen, rusteloosheid of geïrriteerdheid of stemmingswisselingen, leeghoofdig gevoel
- problemen met uw gezichtsvermogen of pupilconstrictie (miose)
- misselijkheid en braken, constipatie, droge mond of eetlustvermindering
- lage bloeddruk en duizeligheid (met name wanneer u opstaat), langzamere hartslag, snellere of onregelmatige hartslag (hartkloppingen)
- verhoogde hersendruk, vooral als dit probleem al eerder is voorgekomen
- moeite met plassen, pijn in uw maagstreek
- libidoverlies of erectiestoornis
- overmatig zweten, rood hoofd of jeuk.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- extreme zwakte wat leidt tot een hartstilstand
- veranderingen in het electrocardiogram of 'ECT'
- bloedingen in het lichaam
- verhoogde concentraties van het hormoon prolactine in het bloed.

Frequentie niet bekend

- lage bloedsuikerspiegel
- u kunt afhankelijk worden van EPTADONE® Drank Suikervrij (voor meer informatie, zie rubriek 2 Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?)
- kort stoppen van uw ademhaling tijdens de slaap (slaapapneu).

U zult merken dat sommige bijwerkingen met de tijd verminderen. Als een van deze bijwerkingen optreedt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiters zijn vermeld

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door

bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u EPTADONE® Drank Suikervrij

100 - 500 – 1000 ml: Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

- Bewaar dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen. Bewaar dit geneesmiddel op een veilige en beveiligde bewaarplaats, waar anderen er niet bij kunnen. Het kan erg schadelijk en dodelijk zijn voor personen aan wie het niet is voorgeschreven.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum (maand, jaar) op het etiket.
- Zodra u het flesje heeft geopend, dient u de container binnen 12 maanden te gebruiken.
- Gooi een geneesmiddel nooit weg via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt, kunt weggooien. Deze maatregelen zullen bijdragen aan de bescherming van het milieu.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat EPTADONE® Drank Suikervrij bevat

- Het werkzame bestanddeel is methadon hydrochloride. 1 ml EPTADONE® Drank Suikervrij bevat 1 milligram methadon hydrochloride (overeenkomend met 0,9 mg methadon per ml).
- De andere bestanddelen zijn xylitol (E967), glycerol (E422), hydroxyethylcellulose, natriumbenzoaat (E211), citroenzuur monohydraat (E330), kersenaroma (bevat o.a.glycerol triacetate (E1518), triethyl citrate (E1505), propylene glycol (E1520), briljantblauw (E133), tartrazine (E102) en gezuiverd water.

Hoe ziet EPTADONE® Drank Suikervrij eruit en wat is de inhoud van de verpakking

EPTADONE® Drank Suikervrij 1mg/ml is een groene oplossing voor oraal gebruik.

Het is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1mg/ml orale oplossing in 100, 500 en 1000 ml multidoseringscontainer met maatbeker. Elke flesje bevat 100, 500 en 1000 mg methadon hydrochloride.

In het register ingeschreven onder:

EPTADONE® Drank Suikervrij 1mg/ml

RVG 111793

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en Fabrikant

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SpA - Strada Statale 67, Fraz. Granatieri - 50018 Scandicci (Firenze) – Italy

Tel: +3905573611

Fax: +39055720057

e-mail: info@moltenifarma.it

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2023.