

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten honing & citroen zuigtabletten**

amylmetacresol en dichloorbenzylalcohol

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten zijn zuigtabletten die desinfecterende stoffen bevatten. Deze stoffen doden bacteriën en voorkomen ontstekingen.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten worden gebruikt bij beginnende keelpijn.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Als u lijdt aan of last heeft van andere keelproblemen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Keelpijn kan over het algemeen geen kwaad en gaat meestal binnen één week vanzelf over. Neem contact op met uw huisarts als u langer dan 3 dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken of als u naast keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt. Er kan namelijk sprake zijn van een bacteriële infectie die op een andere wijze behandeld dient te worden.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten dienen niet langdurig te worden gebruikt. Indien geen verbetering optreedt of als uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

#### Kinderen

Vanwege de grootte van de zuigtablet, kunnen jonge kinderen zich in RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten verslikken.

RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten kan niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 6 jaar.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend kan RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

#### Patiënten bij wie de nieren en/of lever niet goed werken:

Er zijn geen gegevens beschikbaar over gebruik van dit middel bij patiënten bij wie de nieren en/of lever niet goed werken.

#### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

##### *Zwangerschap*

De veiligheid van dit middel bij zwangerschap is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

##### *Borstvoeding*

De veiligheid van van RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten tijdens de periode van borstvoeding is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

##### *Vruchtbaarheid*

Er zijn geen gegevens over het effect van gebruik van amylmetacresol en dichloorbenzylalcohol op de vruchtbaarheid.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Van het gebruik van RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten zijn geen nadelige effecten op de rijvaardigheden en het bedienen van machines bekend.

#### **RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten bevat zonnegeel**

Deze stof kan allergische reacties geven.

#### **RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten bevat maltitol vloeistof en isomalt**

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is als volgt: - Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: Om de 2 à 3 uur een zuigtablet langzaam opzuigen. Maximaal 3 dagen gebruiken.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Gezien de aard van het product lijkt een overdosering onwaarschijnlijk en zou derhalve geen aanleiding tot problemen moeten geven anders dan maagdarmlachten die als zodanig behandeld moeten worden.

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u merkt dat u overgevoelig voor dit product bent, stop dan met het gebruik ervan en overleg met uw arts of apotheker. Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking krijgt die niet in deze bijsluiter staat, vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers): overgevoeligheidsreacties waaronder uitslag, brandend gevoel, jeuk en zwelling van de mond of keel.

Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (urticaria), plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem), kortademigheid (dyspnoe), pijnlijke tong (glossodynie), onaangenaam gevoel in de mond (o.a. een brandend of tintelend gevoel in de mond of keel) en maag-darmlachten zoals een vol gevoel in de maagstreek, boeren, braken en/of zuurbranden (dyspepsie), buikpijn en misselijkheid zijn gemeld, de frequentie van deze bijwerkingen is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stoffen in dit middel zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn: pepermuntolie, chinolinegeel (E104), natriumsaccharine (E954), wijnsteenzuur (E334), zonnegeel (E110), citroenessence, honingsmaakstof, isomalt (E953) en maltitol (E965)

### **Hoe ziet RXT amylmetacresol – dichloorbenzylalcohol 0,6/1,2 mg keelpijntabletten er uit en hoeveel zit er in een verpakking?**

PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking. Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48 zuigtabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:*

RXT  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Nederland

*Fabrikanten:*

Lozy's Pharmaceuticals S.L.  
Campus Empresarial  
31795 Lekaroz (Navarra)  
Spanje

MAE Holding BV  
Stationsweg 4  
5211 TW 's-Hertogenbosch  
Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 120834

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2022**