



**Lees de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Dicloabak en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijk bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAT IS DICLOABAK EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT**

Dit geneesmiddel bevat een niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAIDs) voor gebruik in het oog.

Het wordt gebruikt tijdens sommige chirurgische ingrepen op het oog en voor het voortzetten van heilkundige ingrepen:

- onderdrukking van miosis (vernauwing van de pupildiameter) bij staaroperaties;
- preventie van ontsteking bij staaroperaties en ingrepen op het voorste oogsegment;
- behandeling van oogpijn bij fotorefractieve keratectomie chirurgie (corrigerende ingreep voor bijziendheid) binnen de eerste 24 uur na de ingreep.

**2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor diclofenac natrium of voor één van de andere bestanddelen van Dicloabak (vermeld in rubriek 6);
- als u in het verleden allergie, urticaria (huiduitslag met jeuk), acute rhinitis (zwellen en irritatie in de neus) of astma heeft gehad na inname van deze oogdruppels of een soortgelijk geneesmiddel, zoals andere NSAIDs of aspirine.
- als u zwanger bent, vanaf het begin van de 6e maand van de zwangerschap (na 24 weken).

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

- U moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid gebruiken:
  - Dicloabak kan, zoals andere NSAID's, in zeldzame gevallen allergische reacties, waaronder anafylactische reacties (ernstige allergische reactie die ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid veroorzaakt) induceren, zelfs zonder voorafgaande blootstelling aan het geneesmiddel.
  - In geval van overgevoelighedsreacties of tekenen van allergie op dit geneesmiddel, in het bijzonder een astma-aanval of een plotse zwelling van het gelaat en de hals, moet u de behandeling stopzetten en onmiddellijk contact opnemen met uw arts of de spoedeisende hulp.
  - Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, moet u uw arts inlichten indien u lijdt aan astma in gepaard gaande met chronische neusverkoudheid, chronische ontsteking van de neus en de sinussen en/of neuspoliepen.
  - Een acute ooginfectie kan onopgemerkt blijven door het gebruik van ontstekingsremmers in het oog. NSAIDs hebben geen antimicrobiële eigenschappen. In geval van een ooginfectie, moet het gebruik van NSAIDs in combinatie met een/ enkele geneesmiddel(en) tegen infectie zorgvuldig gebeuren.
  - Gelijktijdig gebruik van topische NSAID's en topische steroïden (zoals bijv. dexamethason) kunnen de kans op problemen met de wondheling verhogen.
  - NSAIDs kunnen de heling van de cornea (het hoornvlies) vertragen.
  - Als u vatbaar bent voor bloedingen of als u met antistollingsmiddelen (bloedverduunners) behandeld wordt.
  - In geval van hoge doseringen of langdurig gebruik, kan het gebruik van NSAIDs in het oog aanleiding geven tot ontsteking van het hoornvlies.

- Patiënten met herhaalde oogchirurgie binnen een korte tijd, diabetes, oculaire oppervlaktziekte (bijv. droge ogen syndroom), reumatoïde artritis kunnen een verhoogd risico op corneale bijwerkingen hebben.
- Het dragen van contactlenzen wordt niet aanbevolen na staaroperaties. Uw dokter zal u adviseren wanneer u opnieuw contactlenzen kunt gebruiken.
- Als uw symptomen verergeren of niet verbeteren, moet u een arts raadplegen.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Als u samen met Dicloabak andere oogdruppels gebruikt, gelieve dan **15 minuten** te wachten tussen de behandelingen.

Gebruikt u naast Dicloabak nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

**Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

**Zwangerschap**

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken tijdens de eerste 5 maanden van de zwangerschap (tot 24 weken), behalve als uw arts het absoluut nodig vindt. Als het nodig is, zal uw arts u de laagste dosering voor de kortst mogelijke tijd voorschrijven.

Vanaf het begin van de 6e maand tot het einde van uw zwangerschap (na 24 weken) is dit geneesmiddel niet geschikt (gecontra-indiceerd) en mag het NOOIT worden ingenomen vanwege de ernstige gevolgen voor uw kind.

Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap heeft gebruikt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw verloskundige, zodat u als het nodig is gecontroleerd kunt worden.

**Borstvoeding**

Dicloabak mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

**Vruchtbaarheid**

Zoals alle pijnstillers die de koorts lager maken en een ontsteking minder erg maken (NSAID's) kan dit geneesmiddel de vruchtbaarheid bij vrouwen veranderen en het moeilijk maken om zwanger te worden. Dit effect verdwijnt weer wanneer de behandeling wordt gestopt. Vertel het uw arts als u van plan bent zwanger te worden of als u problemen heeft met zwanger worden.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U kan kortstondig visuele last ondervinden na indruppelen van Dicloabak. Wacht tot uw normaal zicht is teruggekeerd voordat u een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient.

**Dicloabak bevat macrogolglycerol ricinoleaat**

Dit geneesmiddel bevat macrogolglycerol ricinoleaat dat aanleiding kan geven tot contacteczeem (huidreacties).

**3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Dosering**

De aanbevolen dosis bij volwassenen en bij ouderen is als volgt:

**Onderdrukking van miosis tijdens cataractingrepen:**

- Voor de ingreep: dien 1 druppel tot 5-maal toe gedurende 3 uur voor de ingreep.

**Staaroperaties en ingrepen op het voorste oogsegment:**

- Voor de ingreep: dien 1 druppel tot 5-maal toe gedurende 3 uur voor de ingreep;
- Na de ingreep: dien 1 druppel 3-maal toe onmiddellijk na de ingreep en daarna 1 druppel 3- tot 5-maal per dag, niet langer dan 4 weken.

**Oogpijn in geval van fotorefractieve keratectomie chirurgie (corrigerende chirurgie voor bijziendheid):**

- Voor de ingreep: dien 2 druppels toe binnen het uur voor de ingreep;
- Na de ingreep: dien 2 druppels toe binnen het uur na de ingreep en daarna 4 druppels binnen de eerste 24 uur na de ingreep.

Overschrijd de aanbevolen dosis niet.

**Gebruik bij kinderen**

Er werden geen specifieke studies uitgevoerd.

## Toedieningswijze

Dit geneesmiddel is bestemd om toegediend te worden in het oog (oculair gebruik).

### **Niet injecteren, niet inslikken.**

*De oogdruppels mogen niet toegediend worden door injectie rond of in het oog.*

1. Was uw handen zorgvuldig voor u het product gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de tip van het flesje niet in contact komt met het oog of de oogleden
3. Laat een druppel in het aangetaste oog vallen, terwijl u naar boven kijkt en zachtjes het onderste ooglid naar beneden trekt.
4. Sluit het flesje na gebruik.
5. Druk na het gebruik van dit middel 2 minuten met een vinger in uw ooghoek, bij de neus. Dit helpt om het verspreiden van Dicloabak naar de rest van het lichaam te voorkomen.

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen werden gemeld:

### **Soms (kan voorkomen bij minder dan 1 op 100 personen):**

- brandend gevoel bij indruppeling;
- gezichtsstoornissen bij indruppeling.

### **Zelden (kan voorkomen bij minder dan 1 op 1000 personen):**

- overgevoeligheidsreacties, jeuk en roodheid;
- fotosensibiliteit (allergische reactie na blootstelling aan de zon);
- keratitis punctata (letsels op het hoornvlies), ulceratie (verzwering) van het hoornvlies, dunner worden van het hoornvlies;
- dyspneu (ademhalingsmoeilijkheden);
- verergering van astma.

### **Onbekend: de frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens**

- rhinitis (zwellend en irritatie in de neus);
- conjunctivale hyperemie (roodheid van het oog), allergische conjunctivitis (ontsteking van het oppervlak van het oog), oedeem van het ooglid (ooglid zwellend);
- hoest;
- urticaria (jeuk), huiduitslag, contacteczeem.

Vanwege de aanwezigheid van macroglycerol ricinoleaat, risico van contacteczeem.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Dicloabak niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de fles. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Het flesje mag niet meer dan acht weken na de eerste opening bewaard worden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Wat bevat Dicloabak**

- Het werkzaam bestanddeel is diclofenac natrium in een concentratie van 1 mg/ml.
- De andere bestanddelen zijn macroglycerol ricinoleaat, trometamol, boorzuur en water (water voor injecties).

### **Hoe ziet Dicloabak er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Dicloabak is een lichtgele vloeistof die geleverd wordt in een flesje dat 10 ml oogdruppels in oplossing bevat.

## **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

### Vergunninghouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V.  
Artemisweg 232  
8239 DE Lelystad

### Fabrikant

Excelvision  
27, rue de la Lombardière  
ZI la Lombardière  
07100 Annonay Frankrijk

### **Ingeschreven in het register onder:**

Dicloabak 1 mg/ml, oogdruppels, oplossing  
RVG 121620//34473 L.v.h.: Polen

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2021.**