Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Levothyroxine Abdi 25 microgram tabletten
Levothyroxine Abdi 50 microgram tabletten
Levothyroxine Abdi 75 microgram tabletten
Levothyroxine Abdi 100 microgram tabletten
Levothyroxine Abdi 125 microgram tabletten
Levothyroxine Abdi 150 microgram tabletten
Levothyroxine Abdi 175 microgram tabletten
Levothyroxine Abdi 200 microgram tabletten

Levothyroxinenatrium

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Levothyroxine Abdi en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Levothyroxine Abdi en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

De werkzame stof in Levothyroxine Abdi is levothyroxinenatrium. Dit is een kunstmatig gemaakt schildklierhormoon. Het wordt gebruikt om stoornissen en ziektes van de schildklier te behandelen. Het werkt hetzelfde als de schildklierhormonen die van nature voorkomen in uw lichaam.
Levothyroxine Abdi wordt gebruikt:
- om patiënten met een niet-gevaarlijke zwelling (benign struma) te behandelen. Dit geldt voor patiënten met een normaal werkende schildklier
- om ervoor te zorgen dat een nieuwe zwelling (struma) niet terugkomt na een operatie.
- als vervanging voor natuurlijke schildklierhormonen als de schildklier daar niet genoeg van aanmaakt
- voor het remmen van de tumorgroei bij patiënten met schildklierkanker

Maakt de schildklier te veel hormoenen aan? En wordt dit behandeld met medicijnen die de werking van de schildklier remmen (thyrostatica)? Dan wordt Levothyroxine Abdi ook gebruikt om de schildklierspiegels in balans te brengen.

Levothyroxine Abdi 100 microgram, 150 microgram, en 200 microgram kunnen ook worden gebruikt om te testen hoe ged uw schildklier werkt.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

als een of meer van de volgende punten op u van toepassing zijn:
- u bent allergisch voor levothyroxinenatrium of een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- uw schildklier werkt niet goed en daar bent u nog niet voor behandel of uw schildklier maat te veel schildklierhormoenen aan (thyrotoxicose)
- uw bijnierschors werkt niet goed (bijniersinsufficiëntie) en de behandeling om uw bijnierhormonen aan te vullen is niet voldoende.
- acute hartziekte (myocardinfarct of ontsteking van het hart).

Tijdens de zwangerschap mag Levothyroxine Abdi niet tegelijkertijd worden gebruikt met medicijnen tegen een te snel werkende schildklier (thyrostatica) (zie rubriek Zwangerschap en borstvoeding).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt als u een of meer van de volgende hartziekten heeft:
- een pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst (angina pectoris),
- het hart pompt het bloed minder goed rond (hartfalen),
- snelle en onregelmatige hartslag,
- hoge bloeddruk,
- verkalking van uw slagaders (arteriosclerose).

Moet u behandeld worden met Levothyroxine Abdi of krijgt u een test om te onderzoeken hoe goed uw schildklier werkt (schildkliersuppressietest)? Dan moet u eerst behandeld zijn voor de bovenstaande ziektes. U moet de waarden van het schildklierhormoon regelmatig laten controleren terwijl u Levothyroxine Abdi gebruikt. Weet u niet zeker of u een van deze ziektes heeft of heeft u deze ziektes wel maar bent u er nog niet voor wordt behandeld? Neem dan contact op met uw arts.

Werkt uw bijnierschors niet goed (bijnierinsufficiëntie)? Praat dan met uw arts voordat u Levothyroxine Abdi inneemt. Uw arts zal testen doen om te controleren of er problemen zijn met de werking van de bijnier(en), hypofyse (een klein orgaan in uw hoofd ter grootte van een erwt, dat belangrijk is voor hoe uw hormonen werken) of de schildklier omdat er te veel schildklierhormoon wordt aangemaakt (autonome schildklier). Dit moet medisch behandeld worden voordat Levothyroxine Abdi ingenomen mag worden of voordat een test wordt gedaan om de werking van uw schildklier te onderzoeken (schildkliersuppressietest).

Neem contact op met uw arts:
- Als u in de overgang bent of de menopauze al heeft gehad. Vanwege het risico op botontkalking (osteoporose) kan regelmatige controle van de schildklier nodig zijn als u overschakelt van een medicijn met levothyroxine naar een ander medicijn met levothyroxine. Het effect kan iets verschillen en mogelijk moet u daarom vaker worden gecontroleerd en moet uw dosering worden aangepast.
- Voordat u begint of stopt met het gebruik van orlistat (gebruikt voor de behandeling van zwaarlijvigheid). In deze gevallen kunnen zorgvuldige controle en een aanpassing van de dosering nodig zijn.
- Als u last heeft van psychotische stoornissen. Bij een psychose kunt u last hebben van dingen zien, horen of voelen die er niet zijn. Ook kunt u erg in de war of bang zijn. Misschie heeft u zorgvuldige controle en een aanpassing van de dosering nodig.
- Als u op het punt staat een laboratoriumonderzoek te ondergaan om uw schildklierhormoonspiegels te controleren, moet u het uw arts en/of het laboratoriumpersoneel laten weten dat u biotine gebruikt of kort geleden heeft gebruikt (ook bekend als vitamine H, vitamine B7 of vitamine B8). Biotine kan van invloed zijn op de resultaten van het laboratoriumonderzoek. Afhankelijk van de test kunnen de resultaten door het gebruik van biotine foutief hoog of laag zijn. Uw arts zal u misschien vragen om te stoppen met het gebruik van biotine voordat er een laboratoriumtest wordt gedaan. U moet ook weten dat andere medicijnen die u misschien gebruikt, zoals multivitamines of supplementen voor haar, huid en nagels, ook biotine kunnen bevatten. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van de laboratoriumtests. Laat het uw arts en/of het laboratoriumpersoneel weten als u di soort producten gebruikt (zie de informatie in de rubriek 'Gebruikt u nog andere medicijnen?')

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Levothyroxine Abdi nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, aangezien Levothyroxine Abdi invloed kan hebben op de werking van de volgende medicijnen:

- Middelen tegen suikerziekte (medicijnen die de bloedsuiker verlagen):
Levothyroxine Abdi kan er voor zorgen datmedicijnen die de bloedsuiker verlagen, minder goed werken.Dus misschien moet u ook controles krijgen van uw boedsuikerspiegel. Dit is vooral belangrijk bij de start van de behandeling met Levothyroxine Abdi. Tijdens de behandeling met Levothyroxine Abdi moet de dosering van uw medicijnen die de bloedsuiker verlagen misschien worden aangepast.
- Coumarinederivaten (medicijnen tegen bloedstolsels): Levothyroxine Abdi kan het effect van deze medicijnen versterken. Hierdoor neemt de kans op bloedingen toe, vooral bij ouderen. Daarom kan het nodig zijn om aan het begin en tijdens de behandeling met Levothyroxine Abdi de bloedstollingsparameters regelmatig te controleren. Tijdens de behandeling met Levothyroxine Abdi moet de dosering van uw coumarinemedicijn misschien worden aangepast.

Neem u de volgende medicijnen in? Zorg er dan voor dat u de geadviseerde tijd tussen het innneem van de mediijnen volgt:

- Medicijnen die galzuren binden en hoge cholesterolwaarden verlagen (zoals colestyramine of colestipol):
Neem Levothyroxine Abdi 4 of 5 uur vóór deze medicijnen in. Want deze medicijnen kunnen er voor zorgen dat Levothyroxine Abdi minder goed wordt opgenomen in de darmen.
- Maagzuurremmers (om brandend maagzuur te verminderen), sucralfaat (voor de behandeling van maag- of darmzweren) en andere medicijnen die aluminium, ijzer of calcium bevatten:
Neem Levothyroxine Abdi ten minste 2 uur vóór deze medicijnen in. Want deze medicijnen kunnen er voor zorgen dat Levothyroxine Abdi minder goed werkt.

Gebruikt u een of meer van de volgende medicijnen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Deze medicijnen kunnen er voor zorgen dat Levothyroxine Abdi minder goed werkt:

- Propylthiouracil (medicijn dat wordt gebruikt als uw schildklier te snel werkt),
- Glucocorticoïden (medicijn tegen allergieën of ontstekingen)
- Bètablokkers (medicijnen die de bloeddruk lager maken en die ook gebruikt worden voor de behandeling van hartziektes),
- Sertraline (medicijn voor de behandeling van depressie)
- Chloroquine of proguanil (medicijnen gebruikt voor het voorkomen of behandelen van malaria),
- Medicijnen die bepaalde stofjes in de lever (leverenzymen) actief maken, zoals barbituraten (kalmeringsmiddelen, slaappillen), carbamazepine (medicijn om epilepsie te behandelen, ook gebruikt bij bepaalde vormen van pijn en om stemmingsstoornissen te behandelen) of producten die sint-janskruid (een kruidenmiddel) bevatten,
- Medicijnen die oestrogeen bevatten voor hormoonvervangende therapie tijdens en na de menopauze of om zwangerschap te voorkomen,
- Sevelameer (een fosfaatbindend medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met chronisch nierfalen),
- Tyrosinekinaseremmers (medicijnen tegen kanker en ontstekingsremmende medicijnen)
- Orlistat (medicijn voor de behandeling van zwaarlijvigheid).
- Protonpompremmers (zoals omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol en lanzoprazol) worden gebruikt om de hoeveelheid door de maag aangemaakt zuur te verminderen, wat de absorptie van levothyroxine uit de darmen kan belemmeren en zodoende de werkzaamheid van levothyroxine kan verminderen. Als u levothyroxine gebruikt terwijl u wordt behandeld met protonpompremmers, moet uw arts uw schildklierfunctie controleren en mogelijk de dosis Levothyroxine Abdi aanpassen.

Gebruikt u een of meer van de volgende medicijnen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker, aangezien deze medicijnen de werking van Levothyroxine Abdi kunnen

versterken:
- Salicylaten (medicijnen om pijn minder erg te maken en koorts te verlagen),
- Dicoumarol (medicijn tegen bloedstolsels)
- Furosemide in hoge dosering vanaf 250 mg (plaspil),
- Clofibraat (medicijn om hoge vetwaarden in het bloed te verlagen).

Gebruikt u een of meer van de volgende medicijnen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Want deze medicijnen kunnen een invloed hebben op hoe goed Levothyroxine Abdi werkt:
- Proteaseremmers (ritovanir, indinavir, lopinavir), gebruikt voor de behandeling van HIV en chronische hepatitis C-virus, fenytoïne (medicijn tegen epilepsie),
- Als u biotine gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, moet u uw arts en/of het laboratoriumpersoneel hiervan op de hoogte stellen wanneer u op het punt staat een laboratoriumonderzoek te ondergaan om uw schildklierhormoonspiegels te controleren. Biotine kan van invloed zijn op de resultaten van uw laboratoriumonderzoek (zie Waarschuwingen en voorzorgen).

Regelmatige controle van de waarden van uw schildklierhormoon kan nodig zijn. Uw dosis Levothyroxine Abdi moet misschien worden aangepast.

Uw schildklierfunctie kan verstoord raken als u van uw medicijn moet overschakelen naar een ander medicijn dat levothyroxine bevat. Praat met uw arts als u vragen heeft over het wijzigen van uw medicijnen. Tijdens de overgangsperiode is een hele goede controle (klinisch en biologisch) belangrijk. U moet het uw arts vertellen wanneer u bijwerkingen krijgt, omdat dit erop kan wijzen dat uw dosis moet worden verhoogd of verlaagd.

Vertel het uw arts als u amiodaron gebruikt (medicijn voor de behandeling van een onregelmatige hartslag), omdat dit medicijn de werking en activiteit van uw schildklier kan beïnvloeden.

Als u een röntgenfoto moet laten maken of een ander diagnostisch onderzoek met een contrastmiddel dat jodium bevat moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u Levothyroxine Abdi gebruikt. Want misschien krijgt u een injectie met een medicijn dat de werking van de schildklier beïnvloedt.

Gebruikt u naast Levothyroxine Abdi nog andere medicijnen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor medicijnen waar u geen recept voor nodig heeft.

Schildklierhormonen zijn niet geschikt om af te vallen (gewicht te verliezen). Door schildklierhormonen in te nemen zult u geen gewicht verliezen als uw schildklierhormoonspiegel zich binnen een normaal bereik bevindt. Ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen kunnen optreden als u de dosis verhoogt zonder speciaal advies van uw arts. Vooral wanneer u deze samen met andere medicijnen voor gewichtsvermindering inneemt.
Als behandeling met levothyroxine wordt gestart bij te vroeg geboren baby's met een heel laag geboortegewicht, wordt de bloeddruk regelmatig gecontroleerd. Het kan voorkomen dat het hart opeens stopt met kloppen. Hierdoor stroomt er geen bloed meer door het lichaam en raakt de baby bewusteloos (circulatoire collaps).

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Vertel het aan uw arts als u sojaproducten eet, vooral als u iets verandert aan de hoeveelheid sojaproducten in uw eten. Sojaproducten kunnen ervoor zorgen dat Levothyroxine Abdi minder goed wordt opgenomen in de dunne darm. Daarom kan het nodig zijn de dosering Levothyroxine Abdi aan te passen.

Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger bent, kunt u Levothyroxine Abdi blijven gebruiken. Neem contact op met uw arts, omdat de dosering mogelijk moet worden aangepast.

Gebruikt u Levothyroxine Abdi samen met een medicijn voor de behandeling van een te snel

werkende schildklier? Dan zal uw arts u adviseren om te stoppen met Levothyroxine Abdi als u zwanger wordt.

Geeft u borstvoeding? Dan kunt u Levothyroxine Abdi blijven gebruiken zoals uw arts u heeft geadviseerd. De hoeveelheid medicijn die in de moedermelk terecht komt is zo klein dat het geen invloed heeft op de baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Maar omdat levothyroxine identiek is aan het natuurlijke schildklierhormoon, heeft Levothyroxine Abdi naar verwachting geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Levothyroxine Abdi bevat lactose
Heeft uw arts u verteld dat u niet tegen bepaalde suikers kunt? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

Levothyroxine Abdi bevat natrium
Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal bepalen hoeveel u van dit medicijn nodig heeft (persoonlijke dosering) op basis van de onderzoeken en de uitslagen van laboratoriumtesten. In het algemeen start u met een lage dosering, die elke 2 tot 4 weken wordt verhoogd totdat uw persoonlijke dosering is bereikt. Tijdens de eerste behandelweken worden er afspraken gemaakt voor laboratoriumtesten. De uitslagen van deze testen worden gebruikt om uw persoonlijke dosering te bepalen.

Wordt uw baby geboren met een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie)? Dan kan de arts adviseren om met een hogere dosering te beginnen, omdat snelle vervanging belangrijk is. De geadviseerde startdosering bedraagt 10 tot 15 microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag tijdens de eerste 3 maanden. Daarna zal uw arts de dosering per patiënt aanpassen.
In de onderstaande tabel staat hoeveel u normaal gesproken van dit medicijn nodig heeft. Een lagere persoonlijke dosering kan genoeg zijn voor:
- oudere patiënten
- patiënten met hartziektes
- patiënten bij wie de schildklier erg slecht werkt of lange tijd slecht werkt
- patiënten met een laag lichaamsgewicht of een grote goedaardige zwelling (struma).

Gebruik van Levothyroxine Abdi	*Geadviseerde dagelijkse dosis van Levothyroxine Abdi*
• voor de behandeling van goedaardige struma bij patiënten van wie de schildklier normaal werkt	75 - 200 microgram
• voor het voorkomen van terugkerende struma na een struma-operatie	75 - 200 microgram

• als vervanging voor natuurlijke schildklierhormonen wanneer de schildklier daar niet genoeg van aanmaakt	volwassenen	kinderen
• startdosering	25 - 50 microgram*	12,5 - 50 microgram*
• onderhoudsdosering	100 - 200 microgram	100– 150 microgram per m^2 lichaamsoppervlak
• voor het remmen van de tumorgroei bij patiënten met schildklierkanker	150 - 300 microgram	
• om de schildklierhormoonspiegels in balans te brengen, wanneer het aanmaken van te veel hormonen wordt behandeld met medicijnen die de werking van de schildklier remmen (thyrostatica)	50 -100 microgram	
• om de werking van de schildklier te testen	100 microgram: 200 microgram (2 tabletten) met ingang van 2 weken voor de test 150 microgram: te beginnen 4 weken vóór de test 2 weken lang 75 microgram (halve tablet), daarna 150 microgram (1 tablet) tot de test 200 microgram: 200 microgram (1 tablet) met ingang van 2 weken voor de test	

* Levothyroxine Abdi 125 microgram, 150 microgram, 175 microgram of 200 microgram tabletten zijn niet geschikt voor het lagere dosisbereik dat hier wordt vermeld, maar uw arts kan een lagere sterkte van Levothyroxine Abdi tabletten voorschrijven.

Toediening
Levothyroxine Abdi moet via de mond worden ingenomen (voor oraal gebruik).

Neem de dagelijkse dosis in de ochtend in 1 keer in op een lege maag (minimaal een half uur voor het ontbijt), het liefst met een beetje vloeistof, bijvoorbeeld een half glas water.
Ook pasgeboren baby's kunnen de hele dagelijkse dosis van dit medicijn minimaal een half uur voor de eerste maaltijd van de dag toegediend krijgen. U kunt de tablet vlak voor gebruik vermalen en dan mengen met een beetje water. Dit mengsel kunt u daarna met wat meer drinken aan uw kind geven. Elk dosismengsel moet vers bereid worden.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling hangt af van de ziekte waarvoor u dit medicijn gebruikt. Uw arts zal daarom met u bespreken hoe lang de tabletten ingenomen moeten worden. De meeste patiënten moeten dit medicijn hun hele leven innemen.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?
Heeft u meer ingenomen dan de voorgeschreven dosis? Dan kunt u klachten krijgen zoals hartkloppingen, angst, rusteloos zijn of onbedoelde bewegingen. Patiënten met een neurologische ziekte, bijv. epilepsie, kunnen in sommige gevallen toevallen (een aanval van epilepsie) krijgen. Patiënten die risico lopen op psychotische stoornissen kunnen last hebben van acute psychotische klachten. Neem in zulke gevallen contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga de volgende dag verder met de normale dosis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de andere stoffen in Levothyroxine Abdi.
Als u overgevoelig bent voor levothyroxine of voor een van de andere bestanddelen van Levothyroxine Abdi, kan dit allergische reacties veroorzaken, die zich kunnen uiten op de huid en in de luchtwegen. Deze reacties kunnen onmiddellijk optreden of binnen enkele dagen na inname, en kunnen levensbedreigend zijn. Mogelijke symptomen zijn: huiduitslag, jeuk, problemen met ademhalen, kortademigheid, zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel.
Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp.

Als u te veel van dit medicijn inneemt, of als u de voorgeschreven dosis niet verdraagt (bijv. wanneer de dosis te snel verhoogd wordt) kunnen typische tekenen van een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie) optreden:

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers
- overactieve schildklier (hyperthyreoïdie)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
- snelle of onregelmatige hartslag
- pijn op de borst
- hoofdpijn
- zwakke spieren of spierkrampen
- blozen (warm gevoel en roodheid van het gezicht)
- problemen met de bloedsomloop bij te vroeg geboren baby's met een laag geboortegewicht (zie rubriek 2 'Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen')
- koorts
- misselijkheid en overgeven
- menstruatiestoornissen
- verhoogde druk in het hoofd met zwelling van de ogen (pseudotumor cerebri)
- beven (tremoren)
- innerlijke rusteloosheid
- slaapstoornissen
- zweten
- gewichtsverlies
- diarree
- allergische reacties op de huid (angio-oedeem [moeite met ademhalen of zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel], huiduitslag (rash), galbulten (urticaria))

Treden een of meer van deze bijwerkingen op? Neem dan contact op met uw arts. Uw arts zal beslissen om de behandeling een paar dagen te onderbreken of om de dosis te verlagen totdat de bijwerkingen zijn verdwenen.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om

meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?
- De werkzame stof in dit medicijn is levothyroxinenatrium.
- 25 microgram: Elke tablet bevat 25 microgram levothyroxinenatrium.
- 50 microgram: Elke tablet bevat 50 microgram levothyroxinenatrium.
- 75 microgram: Elke tablet bevat 75 microgram levothyroxinenatrium.
- 100 microgram: Elke tablet bevat 100 microgram levothyroxinenatrium.
- 125 microgram: Elke tablet bevat 125 microgram levothyroxinenatrium.
- 150 microgram: Elke tablet bevat 150 microgram levothyroxinenatrium.
- 175 microgram: Elke tablet bevat 175 microgram levothyroxinenatrium.
- 200 microgram: Elke tablet bevat 200 microgram levothyroxinenatrium.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn maïszetmeel, croscarmellosenatrium, gelatine, lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Levothyroxine Abdi eruit en wat zit er in een verpakking?

Levothyroxine Abdi 25 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “25” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
Levothyroxine Abdi 50 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “50” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
Levothyroxine Abdi 75 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “75” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
Levothyroxine Abdi 100 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “100” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
Levothyroxine Abdi 125 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “125” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
Levothyroxine Abdi 150 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “150” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
Levothyroxine Abdi 175 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “175” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
Levothyroxine Abdi 200 microgram tabletten zijn ronde en witte tabletten met aan één zijde de inscriptie “200” en met breuklijnen in de vorm van een “+” aan de andere zijde.
De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen van 30, 50, 84, 90 en 100 tabletten in dozen.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Abdi Farma GmbH
Donnersbergstraße 4
64646 Heppenheim, Duitsland

Fabrikant
Interpharma Services Ltd.
43A Cherni Vrach Blvd. 1407- Sofia
Bulgarije

In het register ingeschreven onder:

Levothyroxine Abdi 25 microgram tabletten	RVG 123126
Levothyroxine Abdi 50 microgram tabletten	RVG 123129
Levothyroxine Abdi 75 microgram tabletten	RVG 123130
Levothyroxine Abdi 100 microgram tabletten	RVG 123131
Levothyroxine Abdi 125 microgram tabletten	RVG 123132
Levothyroxine Abdi 150 microgram tabletten	RVG 123133
Levothyroxine Abdi 175 microgram tabletten	RVG 123134
Levothyroxine Abdi 200 microgram tabletten	RVG 123135

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2026.