

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 1 van 12

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten pazopanib

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Pazopanib CF en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Pazopanib CF en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Pazopanib CF is een type medicijn dat een *proteïnekinaseremmer* wordt genoemd. Het werkt door te voorkomen dat eiwitten actief worden die bijdragen aan de groei en de verspreiding van kankercellen.

Pazopanib CF wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van:

- nierkanker die gevorderd is of naar andere organen is uitgezaaid.
- bepaalde vormen van weke-delensarcoom, een vorm van kanker die de ondersteunende weefsels van het lichaam treft. Deze vorm kan zich voordoen in spieren, bloedvaten, vetweefsel of andere weefsels die de organen steunen, omgeven en beschermen.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U **bent allergisch** voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Neem contact op met uw arts als u denkt dat dit voor u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt:

- als u een **hartaandoening** heeft.
- als u een **leveraandoening** heeft.
- als u **hartfalen of een hartaanval** heeft gehad.
- als u eerder last heeft gehad van een **klaplong**.
- als u problemen heeft met **bloedingen, bloedstolsels of een vernauwing van de slagaders**.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 2 van 12

- als u **maag- of darmklachten** heeft gehad, zoals een *perforatie* (gaatje) of *fistels* (afwijkend gevormde verbindingen tussen delen van de darm).
- als u **schildklierklachten** heeft.
- als u **nierklachten** heeft.
- als u een vergroting en verzwakking van een bloedvatwand (**aneurysma**) of een scheur in een bloedvatwand (arteriële dissectie) heeft of heeft gehad.

Vertel het uw arts als een van de hierboven vermelde situaties op u van toepassing is. Uw arts zal beslissen of Pazopanib CF geschikt is voor u. Het kan nodig zijn om **extra tests** uit te voeren om te controleren of uw nieren, hart en lever goed werken.

Hoge bloeddruk en Pazopanib CF

Pazopanib CF kan uw bloeddruk verhogen. Uw bloeddruk zal worden gecontroleerd voordat u Pazopanib CF gebruikt en tijdens het gebruik. Als u een hoge bloeddruk heeft, zult u behandeld worden met medicijnen om de bloeddruk te verlagen.

- **Vertel het uw arts** als u een hoge bloeddruk heeft.

Als u een operatie moet ondergaan

Uw arts zal minstens 7 dagen voor de operatie stoppen met de behandeling met Pazopanib CF, omdat het van invloed kan zijn op de wondgenezing. Uw behandeling zal opnieuw worden gestart als de wond voldoende genezen is.

Aandoeningen waar u op moet letten

Pazopanib CF kan sommige aandoeningen verergeren of ernstige bijwerkingen veroorzaken. U moet bedacht zijn op sommige verschijnselen tijdens het gebruik van Pazopanib CF om het risico op problemen te verkleinen. **Zie rubriek 4.**

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Pazopanib CF wordt niet aanbevolen voor personen jonger dan 18 jaar. Het is nog niet bekend hoe goed het werkt bij deze leeftijdsgroep. Bovendien mag het medicijn uit veiligheidsoverwegingen niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Pazopanib CF nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor kruidenmiddelen en voor medicijnen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft.

Sommige medicijnen kunnen van invloed zijn op hoe Pazopanib CF werkt of de kans op bijwerkingen vergroten. Pazopanib CF kan ook van invloed zijn op hoe sommige andere medicijnen werken. Dit zijn onder meer:

- claritromycine, ketoconazol, itraconazol, rifampicine, telitromycine, voriconazol (gebruikt om **infecties te behandelen**).
- atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (gebruikt om **HIV te behandelen**).
- nefazodon (gebruikt om **depressie te behandelen**).
- simvastatine en mogelijk andere statines (gebruikt voor de **behandeling van een hoog cholesterolgehalte**).
- medicijnen die het **maagzuur verminderen**. Het soort medicijn dat u gebruikt om uw maagzuur te verminderen (bijvoorbeeld protonpompremmers, H₂-antagonisten of antacida) kan van invloed zijn op hoe u Pazopanib CF moet innemen. Vraag uw arts of verpleegkundige om advies.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 3 van 12

Vertel het uw arts of apotheker als u een van deze medicijnen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gebruik Pazopanib CF niet samen met voedsel, omdat dat invloed heeft op de manier waarop het medicijn in uw lichaam wordt opgenomen. Neem het minstens twee uur na een maaltijd of één uur voor een maaltijd in (zie rubriek 3).

Drink geen grapefruitsap tijdens de behandeling met Pazopanib CF, omdat dit de kans op bijwerkingen kan vergroten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het gebruik van Pazopanib CF wordt niet aanbevolen als u zwanger bent. Het effect van Pazopanib CF tijdens de zwangerschap is niet bekend.

- **Vertel het uw arts als u zwanger** bent of van plan bent zwanger te worden.
- **Gebruik een betrouwbare vorm van anticonceptie** tijdens het gebruik van Pazopanib CF en minstens 2 weken daarna, om een zwangerschap te voorkomen.
- **Als u toch zwanger wordt tijdens het gebruik**, vertel het uw arts.

Geef geen borstvoeding als u met Pazopanib CF behandeld wordt. Het is niet bekend of de bestanddelen van Pazopanib CF in de moedermelk terechtkomen. Bespreek dit met uw arts.

Mannelijke patiënten (ook diegenen die een vasectomie (sterilisatie) hebben ondergaan) die een partner hebben die zwanger is of die zwanger kan worden (ook diegenen die andere anticonceptiemethoden gebruiken) moeten condooms gebruiken bij seksuele contacten wanneer ze Pazopanib CF innemen en gedurende minstens 2 weken na de laatste dosis.

De vruchtbaarheid kan worden aangetast door de behandeling met Pazopanib CF. Bespreek dit met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Pazopanib CF kan bijwerkingen geven die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om auto te rijden of om machines te gebruiken.

- Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u zich duizelig voelt, moe of zwak bent, of als u weinig energie heeft.

Pazopanib CF bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen?

Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten

De gebruikelijke dosis is eenmaal per dag vier tabletten Pazopanib CF 200 mg (800 mg pazopanib). Dit is de maximale dosis per dag. Uw arts kan de dosis verlagen als u bijwerkingen krijgt.

Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 4 van 12

De gebruikelijke dosis is eenmaal per dag twee tabletten Pazopanib CF 400 mg (800 mg pazopanib). Dit is de maximale dosis per dag. Uw arts kan de dosis verlagen als u bijwerkingen krijgt.

Wanneer moet u het medicijn innemen?

Neem Pazopanib CF niet in met voedsel. Neem het minstens twee uur na een maaltijd of één uur voor een maaltijd in.

U kunt het bijvoorbeeld twee uur na het ontbijt of één uur voor de lunch innemen. Neem Pazopanib CF elke dag rond dezelfde tijd in.

Slik de tabletten in hun geheel, één voor één, met water door. Breek de tabletten niet en vermaal de tabletten ook niet, omdat dit van invloed is op de manier waarop het medicijn door uw lichaam wordt opgenomen en omdat dit de kans op bijwerkingen kan vergroten.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan **contact op met een arts of apotheker** voor advies. Laat de verpakking of deze bijsluiter zien als dat mogelijk is.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Neem Pazopanib CF net zo lang in als uw arts u heeft aanbevolen. Stop niet met het innemen van dit medicijn tenzij uw arts u dit adviseert.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke ernstige bijwerkingen

Zwelling van de hersenen (omkeerbaar posterieur leuko-encefalopathisch syndroom)

Pazopanib CF kan in zeldzame gevallen zwelling van de hersenen veroorzaken, wat levensbedreigend kan zijn. Verschijnselen zijn onder meer:

- verlies van spraak
- veranderd gezichtsvermogen
- insulten (toevallen)
- verwarring
- hoge bloeddruk

Stop met het gebruik van Pazopanib CF en bel onmiddellijk voor medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt, of als u hoofdpijn krijgt in combinatie met een van deze verschijnselen.

Hypertensieve crisis (plotselinge en ernstige verhoging van de bloeddruk)

Pazopanib CF kan in bepaalde gevallen een plotselinge en ernstige verhoging van de bloeddruk veroorzaken. Dit staat bekend als een hypertensieve crisis. Uw arts zal uw bloeddruk controleren als u Pazopanib CF inneemt. Teken van een hypertensieve crisis kunnen zijn:

- ernstige pijn op de borst
- ernstige hoofdpijn
- wazig zicht

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 5 van 12

- verwarring
- misselijkheid
- overgeven
- ernstige angst
- kortademigheid
- epileptische aanvallen
- flauwvallen

Stop met het innemen van Pazopanib CF en bel onmiddellijk voor medische hulp als u een hypertensieve crisis krijgt.

Hartaandoeningen

Het risico op deze problemen kan groter zijn voor personen met een bestaande hartklacht of personen die andere medicijnen nemen. U zult onderzocht worden op hartklachten als u Pazopanib CF inneemt.

Hartstoornis/hartfalen, hartaanval

Pazopanib CF kan invloed hebben op hoe goed uw hart pompt of kan de kans op het krijgen van een hartaanval verhogen. Tekenen kunnen zijn:

- onregelmatige of snelle hartslag
- snel samentrekken van het hart
- flauwvallen
- pijn of druk op de borst
- pijn in uw armen, rug, nek of kaak
- kortademigheid
- zwellen van de benen

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Veranderingen in het hartritme (QT-verlenging)

Pazopanib CF kan het hartritme beïnvloeden, waardoor bij sommige mensen een mogelijk ernstige hartaandoening kan ontstaan, genaamd torsade de pointes. Dit kan leiden tot een zeer snelle hartslag, wat een plotseling verlies van bewustzijn veroorzaakt.

Vertel het uw arts als u **ongewone veranderingen in uw hartslag** krijgt, zoals een te snelle of te langzame hartslag.

Beroerte

Pazopanib CF kan de kans op een beroerte verhogen. Tekenen van een beroerte kunnen zijn:

- gevoelloosheid of verzwakking aan een kant van uw lichaam
- moeilijk kunnen spreken
- hoofdpijn
- duizeligheid

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Bloeding

Pazopanib CF kan een ernstige bloeding veroorzaken in uw spijsverteringskanaal (zoals maag, slokdarm, endeldarm of darmkanaal) of in de longen, nieren, mond, vagina en de hersenen, hoewel deze zelden voorkomt. Verschijnselen hiervan zijn onder meer:

- bloed in de ontlasting of zwarte ontlasting
- bloed in de urine
- buikpijn
- bloed ophoesten of bloed braken

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 6 van 12

Perforatie en fistels

Pazopanib CF kan een scheur (perforatie) in uw maag of in de darmwand of het ontstaan van een abnormale verbinding tussen twee delen van uw spijsverteringskanaal (een fistel) veroorzaken.

Tekenen kunnen zijn:

- ernstige maagpijn
- misselijkheid en/of overgeven
- koorts
- ontstaan van een gaatje (perforatie) in de maag of in de darm waaruit bloed of vies ruikende etter vrijkomt

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Leverklachten

Pazopanib CF kan leverklachten veroorzaken die ernstig kunnen worden, zoals een slechte werking van de lever en leverfalen, wat dodelijk kan zijn. Uw arts zal uw leverenzymen controleren als u Pazopanib CF inneemt. Tekenen dat uw lever mogelijk niet goed werkt kunnen zijn:

- geel kleuren van uw huid of uw oogwit (geelzucht)
- donkere urine
- vermoeidheid
- misselijkheid
- overgeven
- verlies van eetlust
- pijn aan de rechterkant van uw buik
- gemakkelijk blauwe plekken hebben

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Bloedstolsels

Diepveneuze trombose (DVT) en longembolie

Pazopanib CF kan bloedstolsels veroorzaken in uw aders, vooral in uw benen (diepveneuze trombose of DVT), die ook kunnen verplaatsen naar uw longen (longembolie). Tekenen kunnen zijn:

- scherpe pijn in de borst
- kortademigheid
- snelle ademhaling
- pijn in de benen
- zwelling van uw armen en handen of benen en voeten

Trombotische microangiopathie (TMA)

Pazopanib CF kan bloedstolsels veroorzaken in de kleine bloedvaten in de nieren en in de hersenen, wat gepaard gaat met een vermindering van het aantal rode bloedcellen en cellen die betrokken zijn bij de bloedstolling (trombotische microangiopathie, TMA). Tekenen kunnen zijn:

- gemakkelijk blauwe plekken krijgen
- hoge bloeddruk
- koorts
- verwarring
- slaperigheid
- epileptische aanvallen (toevallen)
- minder urine

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Tumorlyssyndroom

Pazopanib CF kan een snelle afbraak van kankercellen veroorzaken met als gevolg tumorlyssyndroom, dat bij sommige mensen dodelijk kan zijn. Mogelijke verschijnselen zijn:

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 7 van 12

onregelmatige hartslag, toevallen (stuipen), verwarring, spierkrampen of spiertrekkingen of minder urine.

Bel onmiddellijk voor medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Infecties

Infecties die voorkomen terwijl u Pazopanib CF neemt, kunnen ernstig worden. Tekenen van infecties kunnen zijn:

- koorts
- griepachtige verschijnselen zoals hoesten, vermoeidheid en pijn in het lichaam die niet weggaat
- kortademigheid en/of piepende ademhaling
- pijn bij het plassen
- sneetjes, schrammen of wonden die rood, warm, gezwollen of pijnlijk zijn

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Longontsteking

In zeldzame gevallen kan Pazopanib CF longontsteking (interstitiële longaandoening, pneumonitis) veroorzaken. Bij sommige mensen kan dit dodelijk zijn. De verschijnselen kunnen kortademigheid of hoesten zijn, die aanhouden. U zult worden onderzocht op longproblemen als u Pazopanib CF inneemt.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van deze verschijnselen krijgt.

Schildklierklachten

Pazopanib CF kan de hoeveelheid schildklierhormoon, die door uw lichaam wordt geproduceerd, verlagen. Dit kan leiden tot gewichtstoename en vermoeidheid. Het gehalte aan schildklierhormoon in uw bloed zal gecontroleerd worden als u Pazopanib CF inneemt.

Vertel het uw arts als u aanzienlijke gewichtstoename of vermoeidheid opmerkt.

Wazig zien of verminderd gezichtsvermogen

Pazopanib CF kan het loslaten of scheuren van het netvlies (de retina, de bekleding achter in het oog) veroorzaken. Dit kan leiden tot wazig zien of een verminderd gezichtsvermogen.

Vertel het uw arts als u een verandering in uw gezichtsvermogen opmerkt.

Mogelijke bijwerkingen (waaronder mogelijke ernstige bijwerkingen in de betreffende frequentie categorie).

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

- hoge bloeddruk
- diarree
- misselijk zijn of overgeven
- buikpijn
- verminderde eetlust
- gewichtsafname
- veranderde smaak of verlies van smaak
- pijn in de mond
- hoofdpijn
- tumorpijn
- gebrek aan energie, zich zwak of moe voelen
- veranderingen in de haarkleur
- ongewone haaruitval of dunner worden van het haar
- verlies van huidpigment
- huiduitslag, met mogelijk schilferen van de huid
- roodheid en zwelling van de handpalmen of voetzolen

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 8 van 12

Neem contact op met uw arts of apotheker als u van een van deze bijwerkingen veel last krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen die uit uw bloed- of urineonderzoek kunnen blijken:

- toegenomen leverenzymen
- afgenomen albumine in het bloed
- eiwit in de urine
- afname in het aantal bloedplaatjes (cellen die uw bloed helpen stollen)
- afname in het aantal witte bloedcellen

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

- indigestie, opgeblazen gevoel, windrigheid
- bloedneus
- droge mond of zweren in de mond
- infecties
- zich abnormaal suf voelen
- slaapproblemen
- pijn op de borst, kortademigheid, pijn in de benen en opgezwollen benen/voeten. Deze bijwerkingen kunnen een teken zijn van een bloedstolsel in uw lichaam (trombo-embolie). Als het stolsel loskomt, kan het in uw longen terechtkomen en dat kan levensbedreigend of zelfs dodelijk zijn.
- het hart kan minder goed bloed door het lichaam pompen (hartdisfunctie)
- langzame hartslag
- bloeding in de mond, de endeldarm of de long
- duizeligheid
- wazig zien
- opvliegers
- zwelling veroorzaakt door vocht in weefsels van gezicht, handen, enkels, voeten of oogleden
- tinteling, zwakte of gevoelloosheid in handen, armen, benen of voeten
- huidaandoeningen, roodheid, jeuk, droge huid
- nagelafwijkingen
- een brandend, prikkend, jeukend of tintelend gevoel in de huid
- het koud hebben, met rillingen
- overmatig zweten
- uitdroging
- pijn in spieren, gewrichten, pezen of in de borst, spiertrekkingen
- heesheid
- kortademigheid
- hoesten
- bloed ophoesten
- hik
- een klaplong en lucht in de ruimte tussen de long en de borst, wat vaak tot kortademigheid leidt (pneumothorax)

Vertel het uw arts of apotheker als u van een van deze bijwerkingen veel last krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen die uit uw bloed- of urineonderzoek kunnen blijken:

- verminderde werking van de schildklier
- afwijkende werking van de lever
- toegenomen hoeveelheid bilirubine (een stof die wordt aangemaakt door de lever)
- toegenomen hoeveelheid lipase (een enzym dat werkt in de spijsvertering)
- toegenomen hoeveelheid creatinine (een stof die in de spieren wordt aangemaakt)
- veranderingen in de gehalten van andere chemische stoffen/enzymen in uw bloed. Uw arts zal u

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 9 van 12

informereren over de resultaten van de bloedonderzoeken.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij **maximaal 1 op de 100** gebruikers):

- beroerte
- tijdelijke afname in de bloedtoevoer naar de hersenen (transiënte ischemische aanval)
- onderbreking van de bloedtoevoer naar een deel van het hart of hartaanval (myocardinfarct)
- gedeeltelijke onderbreking van de bloedtoevoer naar een deel van het hart (myocardiale ischemie)
- bloedstolsels die samengaan met een afname van rode bloedcellen en van cellen die betrokken zijn bij de bloedstolling (trombotische microangiopathie, TMA). Deze stolsels kunnen schade aanrichten in organen zoals de hersenen en de nieren.
- toename van het aantal rode bloedcellen
- plotselinge kortademigheid, in het bijzonder als het samen gaat met een scherpe pijn in de borst en/of snelle ademhaling (longembolie)
- een ernstige bloeding in het spijsverteringskanaal (zoals maag, slokdarm of darmkanaal) of in de nieren, vagina en de hersenen
- hartritmestoornis (QT-verlenging)
- gat (perforatie) in de maag of darm
- de vorming van afwijkende verbindingen tussen delen van de darmen (fistels)
- zware of onregelmatige menstruatie
- plotselinge ernstige verhoging van de bloeddruk (hypertensieve crisis)
- ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
- ontsteking van de lever of een niet goed werkende of beschadigde lever
- geelverkleuring van de huid of oogwit (geelzucht)
- ontsteking van de bekleding van de buikholte (peritonitis)
- loopneus
- uitslag die kan jeuken of ontstoken kan zijn (platte of opgezette plekken of blaren)
- frequente stoelgang
- verhoogde gevoeligheid van de huid tegen zonlicht
- afgenomen gevoel of gevoeligheid, vooral in de huid
- huidwond die niet geneest (huidzweer)

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij **maximaal 1 op de 1000** gebruikers):

- longontsteking (pneumonitis)
- een dunne en zwakke plek in een bloedvat en het wijder worden van het bloedvat (aneurysma) of een scheur in een bloedvatwand (arteriële dissectie)

Niet bekend (hoe vaak dit voorkomt kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- tumorlyssyndroom als gevolg van een snelle afbraak van kankercellen
- leverfalen

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 10 van 12

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking, de fles en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten:

- De werkzame stof in dit medicijn is pazopanib (als hydrochloride).
Elke filmomhulde tablet bevat 200 mg pazopanib.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K30 (E1201), magnesiumstearaat (E470b).
Tabletomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400 (E1521), rood ijzeroxide (E172), polysorbaat 80 (E433).

Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten:

- De werkzame stof in dit medicijn is pazopanib (als hydrochloride).
Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg pazopanib.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon K30 (E1201), magnesiumstearaat (E470b).
Tabletomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol (E1521), polysorbaat 80 (E433).

Hoe ziet Pazopanib CF eruit en wat zit er in een verpakking?

Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten:

Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten zijn capsulevormige, roze filmomhulde tabletten met aan 1 kant de markering "200", met afmetingen van ongeveer 14,3 mm × 5,7 mm.

Ze worden geleverd in witte flessen (HDPE) met een sluiting die moeilijk te openen is voor kinderen met 30 of 90 filmomhulde tabletten en multiverpakkingen met 90 (3 verpakkingen van 30) filmomhulde tabletten.

Ze worden geleverd in helder/doorzichtige aluminium-PVC/PE/PVDC blisterverpakkingen met 30, 60, multiverpakkingen met 60 (2 verpakkingen van 30), 90, multiverpakkingen met 90 (3 verpakkingen van 30) tabletten.

Ze worden geleverd in geperforeerde helder/doorzichtige aluminium-PVC/PE/PVDC eenheidsblisterverpakkingen met 30×1, 60×1, multiverpakking van 60 x 1 (2 verpakkingen van 30 x 1), 90 x 1, multiverpakking van 90 x 1 (3 verpakkingen van 30 x 1) tabletten.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 11 van 12

Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten:

Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten zijn capsulevormige, witte filmomhulde tabletten met aan 1 kant de markering “400”, met afmetingen van ongeveer 18,0 mm × 7,1 mm.

Ze worden geleverd in witte flessen (HDPE) met een sluiting die moeilijk te openen is voor kinderen met 30 of 60 tabletten.

Ze worden geleverd in helder/doorzichtige aluminium-PVC/PE/PVDC blisterverpakkingen met 30, 60, multiverpakkingen met 60 (2 verpakkingen van 30), 90, multiverpakkingen met 90 (3 verpakkingen van 30) tabletten.

Ze worden geleverd in geperforeerde helder/doorzichtige aluminium-PVC/PE/PVDC eenheidsblisterverpakkingen met 30×1, 60×1, multiverpakking van 60 x 1 (2 verpakkingen van 30 x 1), 90 x 1, multiverpakking van 90 x 1 (3 verpakkingen van 30 x 1) tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Nederland

Fabrikant:

Remedica Ltd
Aharon Street
Limassol Industrial Estate
Limassol 3056
Cyprus

PharOS MT Ltd.
HF62X
Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG3000
Malta

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel
Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 127761 Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten

RVG 127762 Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

België, Frankrijk, Luxemburg	Pazopanib EG
Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Noorwegen, Polen,	Pazopanib STADA

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Pazopanib CF 200 mg, filmomhulde tabletten Pazopanib CF 400 mg, filmomhulde tabletten	HU/H/0728 RVG 127761 RVG 127762	
pazopanib		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 12 van 12

Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden	
Nederland	Pazopanib CF

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2024.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2025-05	Authorisation	CM: MvdA	Rev. 1.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------