

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

**Ondansetron Morningside 4 mg orodispergeerbare tabletten**  
**Ondansetron Morningside 8 mg orodispergeerbare tabletten**

ondansetron

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Ondansetron Morningside en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Ondansetron Morningside en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Ondansetron Morningside behoort tot de groep van geneesmiddelen die anti-emetica heten. Sommige medische behandelingen kunnen veroorzaken dat u misselijk wordt en moet braken. Anti-emetica zorgen ervoor dat misselijkheid en braken worden tegengegaan.

Ondansetron Morningside wordt aan u voorgeschreven om te voorkomen dat u zich na uw behandeling misselijk voelt en moet overgeven.

Bij volwassenen kan Ondansetron Morningside door de arts worden voorgeschreven om:

- misselijkheid en braken tegen te gaan, die kunnen optreden wanneer u chemotherapie (een chemokuur) of bestraling (radiotherapie) krijgt bij de behandeling van kanker
- misselijkheid en braken, die kunnen optreden na een operatie onder algehele narcose, te voorkomen en te behandelen

Bij kinderen ouder dan 6 maanden kan Ondansetron Morningside worden voorgeschreven bij de behandeling van misselijkheid en braken bij chemotherapie.

Neem dit medicijn in zoals uw arts u heeft voorgeschreven. De dosering die u voorgeschreven heeft gekregen, is afhankelijk van uw behandeling. Op het etiket staat vermeld hoeveel u moet

innemen en hoe vaak. Als u hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## 2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

### Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- u gebruikt apomorfine (gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson)
  - u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter
- Als u denkt dat dit op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts **voordat u Ondansetron Morningside gaat gebruiken.**

### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

- als u **allergisch** bent voor geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met Ondansetron Morningside, zoals geneesmiddelen die granisetron of palonosetron bevatten
  - als u ooit **hartproblemen** heeft gehad, zoals een **onregelmatige hartslag (aritmie)**
  - als u **darmproblemen** heeft
  - als uw **lever** niet goed werkt, uw arts kan de dosering Ondansetron Morningside verlagen
- Vertel uw arts als u denkt dat dit op u van toepassing is.

### Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Ondansetron Morningside nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor medicijnen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft.

- **fenytoïne** en **carbamazepine** (medicijnen die worden voorgeschreven bij epilepsie) kunnen de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief beïnvloeden
  - **rifampicine** (medicijn dat wordt voorgeschreven bij jeuk, tuberculose en lepra) kan de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief beïnvloeden
  - het effect van **tramadol** (medicijn dat wordt voorgeschreven bij pijnbestrijding) kan negatief beïnvloed worden door het gelijktijdig gebruik van ondansetron
  - **fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, citalopram, escitalopram** (SSRI's [selectieve serotonineheropnameremmers]) (medicijnen om depressie en/of angst te behandelen) kunnen leiden tot een verandering in uw geestelijke toestand
  - **venlafaxine, duloxetine** (SNRI's [serotonine-radrenalineheropnameremmers]) (medicijnen om depressie en/of angst te behandelen) kunnen leiden tot een verandering in uw geestelijke toestand
  - gelijktijdig gebruik van ondansetron met geneesmiddelen met een effect op het hart (bijvoorbeeld antracyclinen zoals **doxorubicine, daunorubicine of trastuzumab**), antibiotica (zoals **erytromycine of ketoconazol**), antiaritmica (zoals **amiodaron**) en bètablokkers (zoals **atenolol of timolol**) vergroten de kans op hartritmestoornissen
- Vertel het uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

### Zwangerschap en borstvoeding

U mag Ondansetron Morningside niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, want Ondansetron Morningside kan het risico, dat een baby met een hazenlip en/of een gespleten gehemelte (openingen of spleten in de bovenlip en/of de bovenkant van de mond) geboren wordt, licht verhogen.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt. Als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen, kan u worden geadviseerd om een medicijn te gebruiken dat zorgt dat u niet zwanger wordt.

### **Het geven van borstvoeding wordt niet aangeraden tijdens de behandeling met Ondansetron Morningside.**

Onderzoek bij proefdieren heeft aangetoond dat ondansetron kan worden uitgescheiden in de moedermelk. Dit kan invloed hebben op uw baby. Bespreek dit met uw arts.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Ondansetron heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ondansetron Morningside**

Ondansetron Morningside 4 mg bevat 3 mg aspartaam per Orodispergeerbare Tabletten (smelttablet) en Ondansetron Morningside 8 mg bevat 6 mg aspartaam per smelttablet. Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

### **Dosering en frequentie van toediening**

De dosering Ondansetron Morningside die u krijgt is afhankelijk van uw behandeling en zal door uw arts worden bepaald. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Druk de smelttablet niet door de afdekkende folie. Trek de folie van één blisterruimte en haal de Ondansetron Morningside voorzichtig uit de blister.

Leg de Ondansetron Morningside Orodispergeerbare Tabletten smelttablet op de punt van de tong, de tablet zal binnen enkele seconden smelten. Als de tablet is gesmolten kunt u doorslikken.

### **Voordat u Ondansetron Morningside inneemt:**

- Haal de Ondansetron Morningside niet uit de blister totdat u de smelttablet gaat innemen.
- Controleer dat de folie niet is beschadigd.

### **Hoe haalt u de Ondansetron Morningside orodispergeerbare tabletten uit de blister?**

- Ondansetron Morningside smelttabletten moeten altijd voorzichtig uit de stripverpakking worden gehaald. Probeer niet de smelttablet door de folie te drukken, zoals u met een normale tablet doet. De smelttablet is kwetsbaar en kan hierdoor breken.
- Trek één stripruimte van de stripverpakking.
- Trek de folie van de stripverpakking af zoals staat afgebeeld met een pijl op de verpakking.

- Haal de smelttablet voorzichtig uit de strip.
- Leg de Ondansetron Morningside smelttablet op het puntje van de tong. De tablet zal binnen enkele seconden op de tong smelten. Slik vervolgens door.

### **Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?**

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de dosering die op het etiket staat vermeld. Als u of uw kind meer Ondansetron Morningside inneemt dan zou moeten, raadpleeg dan een arts of ga rechtstreeks naar een ziekenhuis. Neem de verpakking van het medicijn mee.

### **Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?**

Als u een dosis bent vergeten in te nemen en u voelt zich misselijk of u moet overgeven, neem dan zo snel mogelijk een dosis in en neem de volgende dosis weer op het normale tijdstip in.

**Neem geen dubbele dosis in** om een vergeten dosering in te halen.

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, maar u bent niet misselijk, neem dan de volgende dosis weer op het normale tijdstip in, zoals vermeld op het etiket.

Neem contact op met uw arts als u niet weet wat u moet doen.

### **Als u stopt met het innemen van dit medicijn**

#### **Stop niet met het gebruik van dit medicijn zonder overleg.**

Gebruik Ondansetron Morningside zolang als uw arts u dit heeft voorgeschreven. Stop niet met het gebruik zonder met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor geneesmiddelen. Als u snel nadat u Ondansetron Morningside heeft ingenomen, een van de volgende klachten krijgt, vertel dit dan **direct aan een arts**.

**Ernstige allergische reacties:** deze zijn zeldzaam bij mensen die Ondansetron Morningside gebruiken. Klachten zijn onder meer:

- een bobbelige huiduitslag of 'galbulten' op het lichaam
- zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen, de mond of de tong (angio-oedeem) wat problemen kan geven met de ademhaling
- collaps

**Myocardischemie:** tekenen zijn onder meer

- Plotselinge pijn op de borst of
- Drukkend gevoel op de borst
- **Neem onmiddellijk contact op met een arts** als u deze klachten krijgt. **Stop met het gebruik** van dit medicijn.

Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen bij gebruik van Ondansetron Morningside:

**Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:**

Deze komen voor bij **meer dan 1 op de 10** gebruikers:

- hoofdpijn

**Vaak voorkomende bijwerkingen:**

Deze komen voor bij **minder dan 1 op de 10** gebruikers:

- warm gevoel of opvliegers
- verstopping (obstipatie)

**Soms voorkomende bijwerkingen:**

Deze komen voor bij **minder dan 1 op de 100** gebruikers:

- toevallen (convulsies)
- bewegingsstoornissen (inclusief aanhoudende samentrekking van spieren en/of herhaalde bewegingen, dystonie)
- abnormale onwillekeurige bewegingen (dyskinesie) of spasmen
- stoornissen in het hartritme (onregelmatig of langzaam; aritmieën, Torsades de Pointes)
- pijn op de borst met en zonder onderdrukking van een bepaald gedeelte van het ElectroCardioGram (ST-segmentonderdrukking)
- starende ooguitdrukking (oculogyrische crisis)
- lage bloeddruk (hypotensie)
- de hik
- toename in stoffen (enzymen) die door de lever worden aangemaakt (kan uit bloedtesten blijken). Deze verschijnselen zijn vaak gemeld bij patiënten die cisplatine (geneesmiddel gebruikt bij chemotherapie) kregen.

**Zelden voorkomende bijwerkingen:**

Deze komen voor bij **minder dan 1 op de 1.000** gebruikers:

- ernstige allergische reacties
- verstoringen van het hartritme (soms leidend tot een plotselinge bewusteloosheid)
- duizeligheid tijdens snelle toediening in een ader (intraveneus of afgekort i.v.)
- voorbijgaande visusstoornissen (zoals wazig of dubbel zien) voornamelijk tijdens i.v. toediening
- diarree en buikpijn

**Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:**

Deze komen voor bij **minder dan 1 op de 10.000** gebruikers:

- ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necolyse; Lyellsyndroom) en ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens- Johnsonsyndroom)
- voorbijgaande blindheid voornamelijk tijdens i.v. toediening  
Bij het merendeel van de gemelde gevallen verdween de blindheid binnen 20 minuten. De meeste patiënten hadden chemotherapeutische middelen gekregen, waaronder cisplatine. Er is in sommige gevallen gemeld dat de voorbijgaande blindheid veroorzaakt werd door een probleem in de hersenen.

**Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen:**

- vochtophoping (oedeem)
- huiduitslag en jeuk

## **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de folie na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. **Gebruik Ondansetron Morningside orodispergeerbare tabletten 4 mg en 8 mg na deze datum niet meer**, maar breng de tabletten in de verpakking terug naar uw apotheek.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

Het kan nodig zijn om deze bijsluiter nog eens door te lezen. Gooi de bijsluiter niet weg totdat u uw behandeling heeft afgemaakt.

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

- De werkzame stof in dit medicijn is ondansetron.
- De andere stoffen in dit middel zijn: Mannitol, Silica, colloïdaal watervrij, Basisch gebutyleerd methacrylaatcopolymeer, Granulair mannitol, Crospovidon, Aspartaam, aardbeiensmaakstof.

### **Hoe ziet Ondansetron Morningside smelttabletten eruit en wat zit er in een verpakking?**

Ondansetron Morningside 4 mg smelttabletten zijn ronde, witte tot gebroken witte, platte tabletten met afgeschuinde randen, glad aan beide oppervlakken, met een aardbeiengeur.

Ondansetron Morningside 8 mg smelttabletten zijn ronde, witte tot gebroken witte, platte tabletten met afgeschuinde randen, effen op één oppervlak en “8” gegraveerd op het andere oppervlak, met aardbeiengeur.

Alu-Alu blisterverpakkingen met verpakkingen van 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112 en 120 tabletten zijn beschikbaar.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Ondansetron Morningside Orodispergeerbare Tabletten 4 mg is in Nederland ingeschreven onder het nummer: RVG 127855

Ondansetron Morningside Orodispergeerbare Tabletten 8 mg is in Nederland ingeschreven onder het nummer: RVG 127864

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

**Vergunninghouder:**

Morningside Healthcare (Malta) Ltd.  
93, Mill Street  
Qormi QRM 3102  
Malta

Fabrikanten:

**Misom Labs Ltd.**

Malta Life Science Park  
LS2.01.06, Industrial Estate,  
San Gwann, SGN 3000, Malta

**QP Lab - Pharma Services, Lda**

Tec Labs - Centro de Inovação da FCUL,  
Campo Grande, 1749-019 Lisboa,  
Portugal

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2024.**

Meer informatie over dit medicijn kunt u vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland: [www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl).