

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract

Droog extract van heemstwortel

Droog extract van lindebloesem

Droog extract van smalle weegbree

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar voor de symptomatische behandeling van keelirritatie en droge hoest, geassocieerd met verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Worden de klachten na 7 dagen niet minder, houden ze aan of worden ze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u overgevoelig (allergisch) bent voor de werkzame bestanddelen of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als:

- u kortademig bent (dyspneu heeft)

- u een hoge temperatuur (koorts) heeft
- uw slijm geelgroen of bruin van kleur is (purulent sputum)

Vertel het uw arts als uw klachten erger worden of aanhouden nadat u dit middel 7 dagen heeft gebruikt.

In theorie kan dit geneesmiddel de absorptie vertragen van andere geneesmiddelen die op hetzelfde moment worden ingenomen. Neem, als voorzorgsmaatregel, dit middel niet in de 30 minuten tot 1 uur vóór of na het innemen van andere geneesmiddelen.

Kinderen

Het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar is niet vastgesteld vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De werkzame stof lindebloesem kan sufheid veroorzaken. Daarom kan dit middel de sufheid versterken die veroorzaakt wordt door andere geneesmiddelen zoals antihistaminica (geneesmiddelen die de werking van histamine blokkeren en worden gebruikt voor de behandeling van allergische reacties en verkoudheid), antidepressiva (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van depressie) of andere sedativa (kalmerende middelen of geneesmiddelen om angst te verminderen).

In theorie kunnen de stoffen die in alle drie de werkzame stoffen zitten, de absorptie van andere geneesmiddelen vertragen die op hetzelfde moment ingenomen worden.

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract met eten, drinken en alcohol

Vanwege de manier waarop dit middel werkt (gedeeltelijk lichamelijk en plaatselijk) kunt u het beste niets drinken in de 30 minuten tot 1 uur na toediening.

De effecten van dit geneesmiddel kunnen versterkt worden door alcohol. Het gebruik van alcohol dient daarom vermeden te worden tijdens het gebruik van dit middel.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik gedurende de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, voordat u dit middel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan sufheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u hiervan last heeft.

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract bevat xylitol

Dit geneesmiddel bevat 11,04 g xylitol (calorische waarde is 2,4 kcal/g xylitol, overeenkomend met 26,5 kcal) in de maximale dagelijkse dosis (60 ml). Het kan daarom een laxerende werking hebben.

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract bevat methyl-parahydroxybenzoaat en propyl-parahydroxybenzoaat

Dit geneesmiddel bevat methyl-parahydroxybenzoaat en propyl-parahydroxybenzoaat. Deze conserveringsmiddelen kunnen, wellicht vertraagd, overgevoelighedsreacties (allergische reacties) veroorzaken.

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract bevat propyleenglycol

Dit geneesmiddel bevat 13,6 mg propyleenglycol per 15 ml.

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract bevat benzylalcohol

Dit geneesmiddel bevat 0,0018 mg benzylalcohol per 15 ml. Benzylalcohol kan allergische reacties veroorzaken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u een lever- of nierziekte heeft. Grote hoeveelheden benzylalcohol kunnen zich namelijk ophopen in uw lichaam en bijwerkingen veroorzaken (dit wordt 'metabole acidose' genoemd).

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit middel altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Voor oraal gebruik (onverdund), met behulp van de bijgeleverde maatbeker.

Vanwege de manier waarop dit middel werkt (gedeeltelijk lichamelijk en plaatselijk) kunt u het beste niets drinken in de 30 minuten tot 1 uur na toediening.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:

15 ml per keer, zonodig maximaal 4 keer per dag; de maximale dagdosering is 60 ml in 24 uur. De laatste dosis vlak voor het slapengaan innemen.

Kinderen jonger dan 12 jaar:

Het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt niet aanbevolen. Alleen voor oraal gebruik gedurende een korte periode.

GEBRUIK NIET MEER DAN DE VERMELDE DOSIS.

Worden de klachten na 7 dagen gebruik niet minder, houden ze aan of worden ze zelfs erger? Neem dan contact op met een arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er zijn geen gevallen van overdosering gemeld. Bekende effecten kunnen wel intenser zijn als u een aanzienlijke overdosis van dit middel heeft genomen. Raadpleeg in dat geval direct een arts of apotheker, en neem deze bijsluiter en fles mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit middel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Als bijwerkingen optreden dient contact opgenomen te worden met een arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C; na opening te gebruiken binnen 4 weken.
Houd de verpakking goed gesloten na gebruik.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en op het etiket van de fles na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn:

Elke 15 ml (= 16,3 g) drank bevat:

- 187,5 mg droog extract van *Althaea officinalis* L., radix (heemstwortel), overeenkomend met 1313-1688 mg gedroogde heemstwortel. Extractiemiddel: water
- 136,4 mg droog extract van *Tilia cordata* Miller, *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia x vulgaris* Heyne, *Tilia x europaea* L. of mengsels ervan, flos (lindebloesem), overeenkomend met 409-1091 mg gedroogde lindebloesem. Extractiemiddel: water
- 150,0 mg droog extract van *Plantago lanceolata* L., folium (blad van smalle weegbree), overeenkomend met 600-900 mg gedroogd blad van smalle weegbree. Extractiemiddel: water

- De andere stoffen in dit middel zijn:

- Xylitol (E967)
- Maltodextrine
- Glycerol
- Xanthaangom
- Citroenzuurmonohydraat
- Aardbeiensmaak (bevat propyleenglycol (E1520) en benzylalcohol)
- Methyl-parahydroxybenzoaat (E218)
- Siliciumdioxide, colloïdaal watervrij
- Propyl-parahydroxybenzoaat (E216)
- Gezuiverd water

Hoe ziet Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract eruit en wat zit er in een verpakking?

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract is een bruine ondoorzichtige drank in een bruine glazen fles met een tuitje en plastic schroefdop in een kartonnen doos. Een plastic bekertje met een schaal van 2,5 ml tot 20 ml wordt meegeleverd zodat de dosering afgemeten kan worden.

Bronchostop Hoestdrank heemstwortel- lindebloesem- en weegbreebladextract is beschikbaar in verpakkingsgrootten van 120 ml, 200 ml en 240 ml. Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Wenen
Oostenrijk

Dit geneesmiddel staat in het register ingeschreven onder
RVG 112810

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (<http://www.cbg-meb.nl>).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2022