

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Alprazolam Grindeks 0,25 mg tabletten

Alprazolam Grindeks 0,5 mg tabletten

Alprazolam Grindeks 1 mg tabletten

Alprazolam

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Alprazolam Grindeks en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Alprazolam Grindeks en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Alprazolam Grindeks is een medicijn dat u rustig maakt (sedativum) en behoort tot de groep van benzodiazepinen.

Alprazolam Grindeks wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van angstsymptomen die ernstig of invaliderend zijn of die de patiënt veel pijn en verdriet bezorgen. Dit medicijn is alleen bedoeld voor kort gebruik.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor alprazolam, voor andere benzodiazepinen, of voor een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U lijdt aan een ziekte met de naam 'myasthenia gravis', die gekenmerkt wordt door zwakke en vermoeide spieren.
- U heeft ernstige long- of ademhalingsproblemen (bijv. chronische bronchitis of emfyseem).
- U heeft 'slaapapneu' - dit is een aandoening waarbij uw ademhaling onregelmatig wordt of zelfs voor korte perioden onderbroken wordt tijdens uw slaap.
- U heeft ernstige leverproblemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt:

- als u alcohol, drugs of medicijnen misbruikt of in het verleden heeft misbruikt
- als u langdurig alprazolam heeft gebruikt, aangezien de werking kan afnemen
- als u een slechte algemene conditie heeft
- als u problemen heeft met uw longen, nieren of lever

- als u andere medicijnen gebruikt voor een psychische ziekte.

Afhankelijkheid

U kunt lichamelijk en geestelijk afhankelijk worden van het medicijn.

Hoe langer u het medicijn gebruikt en hoe hoger de dosis, hoe groter het risico op afhankelijkheid. Daarom moet de duur van de behandeling zo kort mogelijk zijn. Volg de dosisaanbevelingen van uw arts (zie rubriek 3). U merkt geestelijke afhankelijkheid doordat u niet wilt stoppen met het gebruik van het medicijn. Lichamelijke afhankelijkheid betekent dat er ontweningsverschijnselen optreden wanneer de behandeling met dit medicijn plotseling wordt gestopt. Het risico is ook groter bij patiënten die alcohol of medicijnen misbruiken of hebben misbruikt (zie ook rubriek 3 “Als u stopt met het gebruik van dit medicijn”). Medicijnmisbruik is een bekend risico bij Alprazolam Grindeks. Als dit medicijn verkeerd wordt gebruikt kan dit leiden tot overdosering en overlijden. Volg altijd de dosisaanbevelingen van uw arts. Mensen die voorgeschreven medicijnen misbruiken kunnen op zoek zijn naar dit medicijn. Daarom moet dit medicijn buiten bereik van andere mensen worden bewaard.

Geheugenproblemen

Tijdens de behandeling met alprazolam kan uw geheugen wat minder goed zijn. Dit gebeurt meestal enkele uren nadat het medicijn is ingenomen. Neem contact op met uw arts als u dit opmerkt. Om het risico hierop te beperken moet u ervoor zorgen dat u een hele nacht (7 tot 8 uur) kunt slapen nadat u dit medicijn heeft ingenomen.

Psychische aandoening (psychose)

Alprazolam Grindeks is niet geschikt voor u als u lijdt aan psychose. Dit is een ernstige psychische aandoening die uw gedrag, handelingen en zelfbeheersing verstoort.

Invloed op de stemming

Het gebruik van alprazolam kan de kans op manie (u bent veel te vrolijk en heeft te veel energie en episodes van hypomanie (lichte vorm van manie) vergroten bij patiënten met depressie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u verschijnselen van hypomanie of manie krijgt.

Depressie, gedachten over zelfbeschadiging of zelfdoding

De behandeling met alprazolam kan de kans op gedachten over zelfbeschadiging of zelfdoding vergroten als u aan depressie lijdt. Vraag uw arts hiernaar voordat u met de behandeling met alprazolam begint.

Als behandeling met alprazolam noodzakelijk is en als u depressief bent of ooit gedacht heeft aan zelfbeschadiging of zelfdoding, zal uw arts u goed in de gaten houden. Als u gedachten krijgt over zelfbeschadiging of zelfdoding, neem dan **onmiddellijk** contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis.

Ouderen

Wees vooral voorzichtig met het gebruik van alprazolam als u op leeftijd bent, aangezien het medicijn tot meer vermoeidheid en/of spierzwakte kan leiden, waardoor de kans dat u valt groter wordt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit medicijn niet aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, aangezien de veiligheid en werkzaamheid voor hen niet zijn vastgesteld.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Alprazolam Grindeks nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het effect van de behandeling kan negatief worden beïnvloed als Alprazolam Grindeks samen met andere medicijnen wordt gebruikt. Uw arts moet misschien uw dosering aanpassen als u medicijnen gebruikt tegen de volgende aandoeningen:

- mentale problemen (antipsychotica, bijv. clozapine)
- slaapproblemen (slaappillen)
- allergieën of hooikoorts (bepaalde antihistaminen)
- als u een grote operatie ondergaat (anesthetica)
- hevige pijn (narcotische analgetica, bijv. dextropropoxyfeen)
- therapie tegen drugsverslaving (substitutie therapie)
- problemen zoals angst of depressie, waaronder bepaalde antidepressiva die fluoxetine, fluvoxamine, nefazodon of imipramine bevatten
- hartfalen (digoxine)
- infecties (antibiotica die erytromycine, claritromycine of telitromycine bevatten)
- schimmelinfecties (itraconazol, fluconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol)
- medicijnen voor de behandeling van angina pectoris en hoge bloeddruk, zoals diltiazem
- HIV en AIDS (genaamd HIV-proteaseremmers, zoals ritonavir)
- brandend maagzuur en maagzweer, zoals cimetidine of omeprazol
- astma en bronchitis, zoals theofylline
- epilepsie, zoals carbamazepine
- spierverslappende medicijnen. Wanneer deze samen met alprazolam worden gebruikt, kan het spierverslappende effect sterker zijn en is er een risico op vallen.

Gelijktijdig gebruik van Alprazolam Grindeks en opioïden (sterke pijnstillers, medicijnen voor substitutietherapie en bepaalde middelen tegen hoest) vergroot de kans op sufheid, ademhalingsproblemen (respiratoire depressie), coma, en kan levensbedreigend zijn. Daarom mag gelijktijdig gebruik alleen overwogen worden wanneer andere behandelingsopties niet mogelijk zijn. Als uw arts toch Alprazolam Grindeks samen met opioïden voorschrijft, moet uw arts de dosis en de duur van de gelijktijdige behandeling beperken.

Vertel uw arts over alle kalmerende medicijnen (opioïden) die u gebruikt, en volg de dosisaanbeveling van uw arts precies op. Het kan handig zijn uw vrienden en familie te vertellen over bovengenoemde tekenen en symptomen. Neem contact op met uw arts zodra u last krijgt van deze symptomen.

Het effect van de behandeling met alprazolam kan ook negatief worden beïnvloed door gelijktijdige behandeling met een van de volgende medicijnen: de pil, rifampicine (voor infecties) of sint-janskruid (kruidenmiddel).

Waarop moet u letten met alcohol?

Tijdens de behandeling met Alprazolam Grindeks mag u geen alcohol drinken, aangezien alcohol het effect van Alprazolam Grindeks op onvoorspelbare wijze kan veranderen en versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts onmiddellijk als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Onderzoeken bij de mens hebben aangetoond dat alprazolam schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind (verhoogde kans op misvorming (gespleten verhemelte)). Tijdens de zwangerschap mag alprazolam alleen worden gebruikt als de arts heeft vastgesteld dat de voordelen van behandeling groter zijn dan de risico's voor het ongeboren kind en dat het medicijn geschikt is voor u.

Als u Alprazolam Grindeks tot aan de bevalling gebruikt, vertel dit dan aan uw arts, aangezien uw pasgeboren baby na de geboorte ontwenningsverschijnselen kan krijgen.

Borstvoeding

U mag Alprazolam Grindeks niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Alprazolam komt terecht in de moedermelk. Als uw arts heeft besloten dat u dit medicijn moet gebruiken, moet u stoppen met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ook bij goed gebruik kan Alprazolam Grindeks het reactievermogen zodanig verminderen dat de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen negatief wordt beïnvloed. Dit risico is extra groot aan het begin van de behandeling, wanneer de dosis wordt verhoogd, als u niet genoeg slaap krijgt of als u alcohol of andere middelen gebruikt die op het centrale zenuwstelsel inwerken. Daarom mag u helemaal geen voertuig besturen, machines gebruiken of andere risicovolle activiteiten uitvoeren, of in ieder geval niet tijdens de eerste paar dagen van de behandeling. De behandelend arts beslist dit per geval.

Alprazolam Grindeks bevat lactose, natrium en natriumbenzoaat (E211)

Lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.
Natrium: Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.
Natriumbenzoaat: Dit middel bevat 0,12 mg natriumbenzoaat in elke tablet.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij de arts anders voorschrijft, zijn de volgende dosisrichtlijnen van toepassing

Begindosering: over het algemeen is de dosis aan het begin van de behandeling 3 keer per dag 0,25 tot 0,5 mg alprazolam.

Onderhoudsdosering: als het nodig is voor uw gezondheid kan uw arts uw dosis verhogen tot 3 mg tot 4 mg. Dit gebeurt in kleine stappen. U neemt deze hoeveelheid verdeeld over meerdere doses in.

Oudere en gevoelige patiënten of verzwakte patiënten

Als u een oudere en gevoelige patiënt bent en een lagere dosis nodig heeft, zult u normaal gesproken beginnen met een dosis van 0,25 mg 2 tot 3 keer per dag. Deze dosis kan langzaam worden verhoogd indien nodig en als u geen bijwerkingen krijgt.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Als u een nier- of leveraandoening heeft, zal uw arts uw dosis aanpassen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen Alprazolam Grindeks niet gebruiken.

Wijze van toediening

U neemt Alprazolam Grindeks in via de mond. Neem de tabletten in met wat vloeistof (bijv. een half glas water).

De tabletten hebben een breukstreep en kunnen worden verdeeld in gelijke doses.

Duur van de behandeling

Hoe langer u het medicijn gebruikt en hoe hoger de dosis, hoe groter het risico op afhankelijkheid. Uw arts zal daarom de laagste effectieve dosis en de kortst mogelijke behandelingsduur voorschrijven en regelmatig nagaan of de behandeling nog moet worden voortgezet.

De behandeling mag niet langer dan 2-4 weken duren. Een langdurige behandeling wordt niet aanbevolen. De werking van het medicijn kan afnemen als het langer dan een paar weken wordt gebruikt.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Neem direct contact op met uw arts of met een plaatselijk ziekenhuis als u te veel van dit medicijn heeft ingenomen.

Tekenen van (lichte) overdosering kunnen zijn: slaperigheid, licht gevoel in het hoofd, stoornissen van het gezichtsvermogen, onduidelijke spraak, daling van de bloeddruk, wankel lopen/instabiele bewegingen en spierzwakte. In geval van ernstige vergiftiging kunnen diepe slaap en zelfs bewusteloosheid, ademhalingsproblemen en hypovolemische shock (te weinig vocht of bloed in uw bloedvaten) optreden. Het is erg belangrijk dat u op de intensive care goed in de gaten gehouden wordt.

De arts moet de mate van vergiftiging beoordelen en moet de maatregelen bepalen om deze te behandelen.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis bent vergeten in te nemen, sla de gemiste dosis dan over en ga door met het innemen van Alprazolam Grindeks zoals uw arts u dat heeft voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn, aangezien de dosering langzaam moet worden verlaagd. Als u stopt met het gebruik van de tabletten of de dosis plotseling verlaagt, kunt u een 'rebound'-effect krijgen. Hierdoor wordt u tijdelijk angstiger of onrustiger of heeft u moeite met slapen. Sommige mensen kunnen ook ontwenningsverschijnselen krijgen (zie rubriek 4. 'Afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen'). Deze verschijnselen zullen verdwijnen naarmate uw lichaam zich weer aanpast. Als u zich zorgen maakt, kan uw arts u hier meer over vertellen. Daarom zal uw arts de dosering langzaam verlagen wanneer de behandeling wordt beëindigd. Verlaging van de dosering wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie, aangezien langzaam stoppen van een aantal factoren afhangt (bijv. de duur van de behandeling en uw dagelijkse dosis). Vraag uw arts hoe u de dosis langzaam kunt verlagen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Redenen om onmiddellijk contact op te nemen met uw arts

Krijgt u last van deze klachten? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, aangezien de behandeling dan moet worden stopgezet. Uw arts zal dan bepalen hoe de behandeling zal worden stopgezet.

- Behandeling met alprazolam kan ernstige effecten op het gedrag of psychische effecten hebben, bijv. agitatie (zenuwachtig, opgewonden of onrustig zijn), rusteloosheid, agressie, prikkelbaarheid, gewelddadige woede, waanideeën, nachtmerries en hallucinaties (u ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn) of ander ongepast gedrag.
- Plotselinge kortademigheid, moeite met slikken of ademen, zwelling van oogleden, gezicht of lippen, huiduitslag of jeuk (met name over het hele lichaam).

Redenen om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw arts

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u de volgende symptomen krijgt, omdat uw dosis of de behandeling mogelijk moet worden aangepast:

- Geheugenverlies (amnesie).
- Geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht).

Afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen

Het is mogelijk om van medicijnen zoals alprazolam afhankelijk te worden. Dit vergroot de kans op ontwenningsverschijnselen als u stopt met de behandeling. Ontwenningsverschijnselen komen vaker voor als u:

- plotseling stopt met de behandeling
- hoge doses heeft gebruikt
- dit medicijn lange tijd heeft gebruikt
- een voorgeschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik heeft.

Dit kan de volgende klachten veroorzaken: hoofdpijnen, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid, stemmingswisselingen, slaapproblemen en prikkelbaarheid.

In ernstige gevallen van ontwenning kunt u ook de volgende symptomen krijgen: misselijkheid, braken, zweten, maagkrampen, spierkrampen, een gevoel dat dingen niet echt zijn of een gevoel van onthechting van uw omgeving, overgevoeligheid voor geluid, licht of lichamelijk contact, gevoelloosheid of tintelen van de voeten en handen, hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn, terwijl u wakker bent), trillen of epileptische aanvallen. Vertel het uw arts als u ontwenningsverschijnselen heeft die erger worden of niet ophouden.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

- Depressie
- Slaperigheid en sufheid
- Schokkerige, ongecoördineerde bewegingen
- Sommige dingen niet kunnen onthouden
- Onduidelijke spraak
- Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd
- Hoofdpijnen
- Verstopping
- Droge mond
- Vermoeidheid
- Prikkelbaarheid.

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

- Verlies van eetlust
- Verwardheid en desoriëntatie (u bent in de war en weet niet hoe laat het is, waar u bent of herkent mensen niet meer)
- Veranderingen in zin in seks (mannen en vrouwen)
- Zenuwachtig of angstig of onrustig voelen
- Niet kunnen slapen of een onderbroken slaap hebben
- Problemen met evenwicht, en wankelheid (alsof u dronken bent), met name overdag
- Verlies van alertheid of concentratie
- Niet wakker kunnen blijven, futloos zijn
- Beven of trillen
- Dubbel of wazig zien
- Misselijkheid

- Huidreacties
- Veranderingen in uw gewicht.

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers

- Opgetogen of overdreven opgewonden gevoel, dat ongewoon gedrag veroorzaakt
- Hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn)
- Geïrriteerd of boos voelen
- Braken
- Spierspasmen of -zwakte
- Moeite met het ophouden van uw poep of plas (incontinentie)
- Krampen in de onderrug en dijen, wat kan duiden op problemen met uw menstruatie
- Verslaafd raken aan het medicijn
- Ontwenningssverschijnselen na stoppen met het medicijn

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

- Bij vrouwen, onregelmatige menstruatie of aanmaak van te veel prolactine (het hormoon dat de melkproductie stimuleert)
- Vijandig of agressief voelen
- Vreemde gedachten
- Draaiende of schokkerige bewegingen
- Overactief zijn
- Maagklachten
- Problemen met de leverfunctie (dit blijkt uit bloedonderzoek), ontsteking van de lever (hepatitis)
- Disbalans in zenuwstelsel. De symptomen kunnen zijn: snelle hartslag en instabiele bloeddruk (duizelig of licht in het hoofd voelen of flauwvallen)
- Ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt
- Zwelling van de enkels, voeten of vingers
- Huidreactie veroorzaakt door gevoeligheid voor zonlicht
- Moeite met plassen of plas niet goed kunnen ophouden
- Verhoogde druk in de ogen, die ook uw zicht negatief kan beïnvloeden
- Misbruik van medicijnen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het nationale meldsysteem

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is alprazolam.

- Alprazolam Grindeks 0,25 mg tabletten
Elke tablet bevat 0,25 mg alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 0,5 mg tabletten:
Elke tablet bevat 0,5 mg alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 1 mg tabletten:
Elke tablet bevat 1 mg alprazolam.

De andere stoffen in dit medicijn zijn lactosemonohydraat; microkristallijne cellulose (E460); gepregelatiniseerd maïszetmeel; docusaatsodium; natriumbenzoaat (E211); magnesiumstearaat (E572); colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), ijzeroxide rood (E172) (*alleen 0,5 mg tabletten*); indigotine (E132) (*alleen 1 mg tabletten*).

Hoe ziet Alprazolam Grindeks eruit en wat zit er in een verpakking?

Alprazolam Grindeks 0,25 mg is een witte of bijna witte, ovale (10 mm x 5 mm) tablet met een breukstreep aan de ene zijde en gegraveerd met “0.25” aan de andere zijde.

Alprazolam Grindeks 0,5 mg is een lichtroze tot roze ovale (10 mm x 5 mm) tablet met een breukstreep aan de ene zijde en gegraveerd met “0.5” aan de andere zijde.

Alprazolam Grindeks 1 mg is een lichtblauwe tot blauwe ovale (10 mm x 5 mm) tablet met een breukstreep aan de ene zijde en gegraveerd met “1” aan de andere zijde.

Alprazolam Grindeks tabletten zijn beschikbaar in OPA/Alu/PVC//Alu blisterverpakkingen met daarin 10, 20, 30, 50, 60 of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

AS GRINDEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Letland

Tel.: +371 67083205

E-mail: grindeks@grindeks.com

In het register ingeschreven onder:

Alprazolam Grindeks 0,25 mg tabletten: RVG 129168

Alprazolam Grindeks 0,5 mg tabletten: RVG 129169

Alprazolam Grindeks 1 mg tabletten: RVG 129170

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Duitsland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Oostenrijk	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten

België	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimés
Bulgarije	Алпразолам България 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg България
	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Kroatië	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Tsjechië	Alprazolam Grindeks
Denemarken	Alprazolam Grindeks
Estland	Ixhalanex
Finland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
Frankrijk	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg comprimé sécable
Griekenland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Hongarije	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletta
Ierland	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Italië	Alprazolam Grindeks
Letland	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletes
Litouwen	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Luxemburg	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pëllen
Nederland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Polen	Alprazolam Grindeks
Portugal	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Roemenië	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Slowakije	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Slovenië	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Spanje	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Zweden	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2024.