

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt
Streptuss klimop siroop, stroop
droog extract van klimopblad

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met u arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Streptuss klimop siroop is en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Streptuss klimop siroop is en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Streptuss klimop siroop is een kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt als slijmoplossend medicijn bij productieve hoest.

Streptuss klimop siroop is geïndiceerd bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 2 jaar.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

U bent allergisch bent voor klimop, voor andere planten van de familie Araliaceae (klimop) of voor een van de andere bestanddelen van dit medicijn (vermeld in rubriek 6).

- Geef Streptuss klimop siroop niet aan kinderen jonger dan 2 jaar omdat bij deze groep patiënten de ademhalingsymptomen (bijv. kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, hoesten of piepende ademhaling) kunnen verergeren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

- als u last heeft van een ontsteking van de maagwand (gastritis) of een last heeft van een maagzweer.
- als u last heeft van kortademigheid, koorts of groen slijm ophoest (purulent sputum) voor of tijdens het gebruik van dit medicijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik bij patiënten met een verminderde nier- en/of leverfunctie

Als u lijdt aan nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Streptuss klimop siroop gebruikt. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor doseringsaanbevelingen bij deze patiënten.

Kinderen

Dit medicijn mag niet worden gebruikt voor kinderen jonger dan 2 jaar. Zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”

Als kinderen tussen 2 en 4 jaar last hebben van aanhoudende of terugkerende hoest moet vóór behandeling een medische diagnose worden gesteld.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Streptuss klimop siroop nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn echter geen interacties met andere medicijnen gemeld. Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd. Om deze reden kan niet worden uitgesloten dat het effect van andere medicijnen wordt versterkt of verminderd.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

De veiligheid tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap niet aanbevolen.

Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof of de metabolieten ervan in de moedermelk worden uitgescheiden. Een risico voor de pasgeborene/zuigeling die borstvoeding krijgt, kan niet worden uitgesloten. Streptuss klimop siroop mag daarom niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht naar het effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Streptuss klimop siroop bevat sorbitol

Dit medicijn bevat maximaal 469 mg sorbitol per 1 ml stroop.

Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft verteld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie (HFI) is vastgesteld, een zeldzame genetische aandoening waarbij iemand fructose niet kan afbreken, neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit medicijn gebruikt (geeft).

Sorbitol kan maagdarm klachten veroorzaken en een licht laxerende werking hebben bij kinderen.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:

6 ml siroop tweemaal per dag

Kinderen van 6 tot 11 jaar:

4 ml siroop tweemaal per dag

Kinderen van 2 tot 5 jaar

2 ml siroop tweemaal per dag).

Streptuss klimop siroop wordt via de mond ingenomen. De verpakking bevat een maatlepel om de juiste dosering mee af te meten.

Voor een dosis van 6 ml een volle maatlepel (4 ml) en daarna een halve maatlepel (2 ml) innemen

Schud de fles goed voor gebruik.

Er zijn onvoldoende gegevens om specifieke doseringsaanbevelingen te doen bij een verstoorde werking van de nieren of lever

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met u arts.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Inname van een grotere dosis dan aanbevolen kan misselijkheid, braken, diarree en opwinding veroorzaken. Raadpleeg een arts of apotheker wanneer u te veel Streptuss klimop siroop heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de behandeling met Streptuss klimop siroop:

Frequentie niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Maagdarmreacties zoals misselijkheid, braken en diarree

- Overgevoelighedsreacties zoals netelroos, huiduitslag, kortademigheid of anafylactische reactie zijn gemeld. Symptomen die wijzen op het begin van een anafylactische reactie zijn onder meer: jeuk aan de huid, huiduitslag (zoals netelroos), blozen, zwelling van de lippen, keel, tong, handen en voeten, piepende ademhaling, heesheid, misselijkheid, braken, buikkrampen en in sommige gevallen bewustzijnsverlies.

Als u merkt dat u symptomen van overgevoeligheid vertoont, moet u met het gebruik van Streptuss klimop siroop stoppen en naar uw arts gaan. Bij een ernstige overgevoelighedsreactie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u meer informatie geven over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Beneden 25°C bewaren na eerste opening.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket van de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit medicijn mag niet langer dan 3 maanden na de eerste opening van de fles worden gebruikt. Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is droog extract van klimopblad. Elke ml van het product bevat 8,25 mg extract (als droog extract) van *Hedera helix* L., folium (klimopblad) overeenkomend met 33 tot 66 mg klimopblad.
Extractiemiddel: ethanol 30% m/m.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: sorbitol vloeibaar (niet-kristalliserend) (E420), kaliumsorbaat (E202), xanthaangom (E415), citroenzuur (E330), gezuiverd water.

Hoe ziet Streptuss klimop siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Streptuss klimop siroop is een bruine, doorzichtige vloeistof met een zoete smaak en mogelijk licht bezinksel.

De siroop wordt afgevuld in een bruine glazen fles met een witte plastic (polyethyleen) schroefdop. De fles is verder verpakt in een vouwdoos samen met een maatlepel (gemaakt van polypropyleen, met schaalverdeling van 2 ml en 4 ml).

Verpakkingsgrootte: 100 ml, 200 ml

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp
Nederland

Fabrikant

Phytopharm Kłeka S.A.
Kłeka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polen

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 130335

Dit medicijn is geregistreerd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Oostenrijk	StrepHustan Efeu Hustenlöser 8,25 mg/ml Sirup
Estland	Starkspept
Letland	Starkspept
Litouwen	Starkspept
België	Streptuss klimop siroop Streptuss lierre grim pant sirop Streptuss Efeu Sirup
Bulgarije	StrepTuss Active Naturals Ivy 8.25 mg/ml syrup СтрепТус Актив Нечъралс Бръшлян 8.25 mg/ml сироп
Kroatië	Streptusan bršljan sirup
Tsjechië	Strevox s brečťanem
Denemarken	StrepHost Muco
Frankrijk	STREPSILS EXPECTORANT LIERRE 8,25 mg/ml, sirop
Duitsland	StrepCough Ivy
Griekenland	StrepCough Plantain 30 mg/ml σιρόπι
Hongarije	StrepTuss borostyán 8,25 mg/ml szirup
IJsland	StrepHost Muco
Italië	Benactuss Tosse Grassa
Nederland	Streptuss klimop siroop
Noorwegen	Strepmuco
Polen	Strepsils Natur kaszel mokry
Portugal	Streptosse Active Naturals Tosse Produtiva, xarope
Roemenië	StrepTuss iederă 8,25 mg/ml sirop
Slovakije	Strevox s brečťanom
Slovenië	Bršljan Streptusan sirup
Spanje	STREPTOS HIEDRA 8,25 MG/ML JARABE
Zweden	Strepmuco

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2024.