

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Beclometason/Formoterol Allgen 200/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing Beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Beclometason/Formoterol Allgen en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Beclometason/Formoterol Allgen en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Beclometason/Formoterol Allgen is een vloeistof die u moet inademen. Deze vloeistof staat onder druk. Er zitten twee werkzame stoffen in dit medicijn. Deze moet u inademen via uw mond zodat ze meteen in uw longen komen.

De twee werkzame stoffen zijn beclometasondipropionaat en formoterolfumaraatdihydraat.

Beclometasondipropionaat hoort bij een groep van medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken (corticosteroïden). Hierdoor wordt de zwelling en irritatie in uw longen minder.

Formoterolfumaraatdihydraat hoort bij een groep van medicijnen die een deel van de longen (bronchiën) voor lange tijd wijder maken (langwerkende bronchusverwijders). Ze ontspannen de spieren in uw luchtwegen. Hierdoor kunt u makkelijker ademen.

Deze werkzame stoffen zorgen er samen voor dat u makkelijker kunt ademen. Ze zorgen ervoor dat klachten zoals kortademig zijn, een piepende ademhaling en hoesten minder worden bij patiënten met astma of COPD (chronisch obstructieve longziekte). Ze kunnen er ook voor zorgen dat patiënten geen astmaklachten krijgen.

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van astma bij volwassen patiënten.

Is dit medicijn aan u voorgeschreven? Dan

- is uw astma niet goed onder controle met medicijnen die u inademt die ontstekingen en

allergische reacties minder erg maken (inhalatiecorticosteroïden). U gebruikt ook medicijnen die een deel van uw longen (bronchiën) voor korte tijd wijder maken (kortwerkende bronchusverwijders) als u dat nodig heeft.

- reageert uw astma goed op behandeling met medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken (corticosteroïden) en medicijnen die een deel van de longen (bronchiën) voor lange tijd wijder maken (langwerkende bronchusverwijders).

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat of een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit medicijn gebruikt:

- als u hartproblemen heeft. Zoals een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris), hartfalen, smaller worden van de slagaders rond uw hart, ziekte aan uw hartklep, een andere bekende ziekte aan uw hart.
- als u een hoge bloeddruk heeft of als u weet dat u een dunne en zwakke plek in een slagader heeft en uw slagader wijder wordt (aneurysma).
- als u hartritmestoornissen heeft. Zoals een hogere of onregelmatige hartslag, een snelle hartslag of hartkloppingen, of als u is verteld dat uw hartfilmpje niet normaal is.
- als uw schildklier te hard werkt.
- als u minder kalium in uw bloed heeft.
- als u een ziekte in uw lever of nieren heeft.
- als u suikerziekte heeft (diabetes). Als u hoge doseringen formoterol inademt, kunt u meer suiker in uw bloed krijgen. U krijgt daarom misschien een paar extra bloedonderzoeken als u deze inhalator voor het eerst gaat gebruiken en af en toe tijdens de behandeling. De hoeveelheid suiker in uw bloed wordt dan gecontroleerd.
- als u een tumor van de bijnier heeft (feochromocytoom).
- als u weet dat u een medicijn krijgt om te verdoven (anestheticum). U moet misschien minimaal 12 uur voor de verdoving stoppen met het gebruik van Beclometason/Formoterol Allgen. Dit hangt af van het soort medicijn om te verdoven.
- als u wordt behandeld of ooit behandeld bent voor tuberculose (tbc). Tbc is een ziekte door een bacterie. Of als u een infectie door een virus of schimmel in uw borst heeft.
- als u geen alcohol mag drinken. Het maakt niet uit waarom u dit niet mag.

Geldt een van bovenstaande punten voor u? Vertel dat dan altijd aan uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Heeft u medische problemen of allergieën of heeft u deze gehad? Of weet u niet zeker of u dit medicijn kunt gebruiken? Neem contact op met uw arts, astmaverpleegkundige of apotheker voordat u de inhalator gebruikt.

Heeft u hele erge astma? Dan kan uw arts soms de hoeveelheid kalium in uw bloed willen controleren. Zoals veel medicijnen die een deel van uw longen (bronchiën) wijder maken (bronchusverwijders), kan Beclometason/Formoterol Allgen de hoeveelheid kalium in uw bloed heel

erg verminderen (hypokaliëmie). Dit komt doordat te weinig zuurstof in uw bloed samen met sommige andere medicijnen die u misschien samen met Beclometason/Formoterol Allgen gebruikt, de hoeveelheid kalium nog veel erger kan verminderen.

Gebruikt u hoge doseringen inhalatiecorticosteroiden voor lange tijd? Dan heeft u misschien meer corticosteroiden nodig als uw lichaam stress heeft. Voorbeelden van stress zijn: opname in het ziekenhuis na een ongeluk, heel erg gewond raken of voor een operatie. Uw arts beslist of u meer corticosteroiden moet krijgen. Uw arts zal u misschien tabletten of een injectie met steroïden geven.

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Vergeet dan niet om al uw medicijnen en inhalatoren mee te nemen. Neem Beclometason/Formoterol Allgen ook mee. Neem ook alle andere medicijnen of tabletten die zonder recept verkrijgbaar zijn mee. Neem ze mee in hun originele verpakking als dat mogelijk is.

Ziet u wazig of heeft u andere problemen met zien? Neem contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit medicijn mag niet gebruikt worden door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Beclometason/Formoterol Allgen nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts. Vertel het ook als u medicijnen zonder recept gebruikt. Beclometason/Formoterol Allgen kan invloed hebben op hoe goed sommige andere medicijnen werken. Sommige medicijnen kunnen ook invloed hebben op hoe goed Beclometason/Formoterol Allgen werkt.

Vertel het vooral aan uw arts, apotheker of verpleegkundige als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

- Sommige medicijnen zorgen ervoor dat Beclometason/Formoterol Allgen beter werkt. Uw arts wilt u misschien heel goed in de gaten houden als u deze medicijnen gebruikt. Bijvoorbeeld een paar medicijnen voor de behandeling van hiv. Zoals ritonavir en cobicistat. Hiv is het virus waar u aids van kunt krijgen.
- Bètablokkers. Dit zijn medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van veel ziekten. Zoals hartproblemen, hoge bloeddruk en een soort staar waarbij de druk in de ogen hoger is (glaucoom). Moet u een bètablokker gebruiken, waaronder oogdruppels? Dan kan formoterol minder goed werken of zelfs helemaal niet werken.
- Het gebruik van medicijnen die op dezelfde manier werken als formoterol (bèta-adrenerge medicijnen) kunnen juist zorgen dat formoterol beter werkt.
- Medicijnen voor de behandeling van een afwijkend hartritme (kinidine, disopyramide, procaïnamide).
- Medicijnen voor de behandeling van allergische reacties (antihistaminica).
- Medicijnen voor de behandeling van klachten van depressie of psychische ziekten. Zoals monoamino-oxidaseremmers (bijvoorbeeld fenelzine en isocarboxazide), tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld amitriptyline en imipramine) en fenothiazinen.
- Medicijnen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (L-dopa).
- Medicijnen voor de behandeling van een schildklier die niet goed werkt (L-thyroxine).
- Medicijnen met oxytocine (die zorgen voor het samentrekken van de baarmoeder).
- Medicijnen voor de behandeling van psychische ziekten. Zoals monoamino-oxidaseremmers

(MAO-remmers). Dit geldt ook voor medicijnen met vergelijkbare eigenschappen. Zoals furazolidon en procabazine.

- Medicijnen voor de behandeling van hartziekten (digoxine).
- Andere medicijnen voor de behandeling van astma (theofylline, aminofylline of steroïden).
- Plasmiddelen (diuretica).

Krijgt u medicijnen om u helemaal te verdoven voor een operatie of tandheelkundige behandeling (volledige narcose)? Vertel het aan uw arts.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Er zijn geen klinische gegevens bekend over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Gebruik dit medicijn dan niet. Gebruik het alleen als uw arts u adviseert dit wel te doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn heeft waarschijnlijk geen invloed op hoe goed u kunt rijden of machines kunt bedienen.

Dit medicijn bevat alcohol

Dit medicijn bevat 9 mg alcohol (ethanol) in elke inademing (inhalatie). Dit is gelijk aan 0,25 mg/kg per dosis van twee inhalaties. De hoeveelheid ervan in dit medicijn is gelijk aan minder dan 1 ml bier of 1 ml wijn. U zult niks merken van deze kleine hoeveelheid alcohol.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat u de beste dosering van dit medicijn gebruikt. Uw arts zal uw dosering aanpassen tot de laagste dosering waarmee uw klachten goed onder controle blijven.

Dosering:

Volwassenen en ouderen:

De aanbevolen dosering van dit medicijn is 2 keer per dag 2 inhalaties.

De maximale dagelijkse dosering is 4 inhalaties.

Vergeet niet om uw inhalator die snel werkt voor het verminderen van klachten altijd bij u te hebben. Hiermee kunt u astmaklachten die erger worden of plotselinge astma-aanvallen behandelen.

Risicopatiënten:

De dosis hoeft niet te worden aangepast voor oudere patiënten. Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik van dit medicijn door mensen met problemen met hun lever of nieren.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen dit medicijn NIET gebruiken.

Dit medicijn werkt goed voor de behandeling van astma met een dosering beclometasondipropionaat die lager kan zijn dan bij sommige andere inhalatoren met beclometasondipropionaat. Heeft u eerder een andere inhalator met beclometasondipropionaat gebruikt? Dan zal uw arts u vertellen welke precieze dosis van dit medicijn u moet nemen voor uw astma.

Verhoog de dosis niet

Denkt u dat het medicijn niet erg goed werkt? Overleg altijd met uw arts voordat u de dosis verhoogt.

Wordt uw astma erger?

Worden uw klachten erger? Of zijn ze moeilijk onder controle te houden (bijvoorbeeld als u vaker uw losse inhalator gebruikt voor het verminderen van klachten)? Of worden uw klachten niet minder als u uw losse inhalator gebruikt? Neem dan meteen contact op met uw arts. Uw astma wordt dan mogelijk erger. Uw arts moet dan misschien uw dosis van dit medicijn aanpassen of een andere behandeling voorschrijven.

Gebruiksaanwijzing:

Dit medicijn moet worden ingeademd (gebruik via inhalatie).

Dit medicijn zit in een spuitbus onder druk. De spuitbus zit in een plastic verpakking met een mondstuk. Er is een dosisteller voor de verpakking van 120 inhalaties en een dosisindicator voor de verpakking van 180 inhalaties op de achterkant van de inhalator. Op de dosisteller en dosisindicator staat hoeveel inhalaties er nog in de inhalator zitten.


Voor de verpakking van 120 inhalaties: Iedere keer als u de inhalator indrukt, komt er een puffje met medicijn vrij. De dosisteller telt elke inhalatie en telt af. Zorg dat u de inhalator niet laat vallen. De teller kan hierdoor aftellen.

Voor de verpakking van 180 inhalaties: Op de dosisindicator staat hoeveel inhalaties er ongeveer nog in de inhalator zitten. Op het schermpje staat in hoeveelheden van 20 hoeveel inhalaties er nog over zijn (bijvoorbeeld 180, 160, 140, 120, 100, 80 enzovoorts). Zijn er nog 20 inhalaties over? Dan staat het getal 20 op het schermpje. Dit geeft aan dat de inhalator bijna leeg is. Zijn er 180 inhalaties gebruikt? Dan staat het getal 0 op het schermpje. De dosisindicator stopt met tellen bij 0.

Testen van uw inhalator

Gebruikt u de inhalator voor de eerste keer? Of heeft u de inhalator 14 dagen of langer niet gebruikt? Dan moet u de inhalator testen om te kijken of de inhalator nog goed werkt.


1. Verwijder de beschermkap van het mondstuk.
2. Houd de inhalator rechtop met het mondstuk aan de onderkant.
3. Richt het mondstuk van u af. Druk de inhalator stevig in om een dosis af te geven.
4. Heeft u de inhalator 14 dagen of langer niet gebruikt? Druk de inhalator 1 keer stevig in om 1 inhalatie vrij te laten.
5. Controleer de dosisteller bij de inhalator voor 120 doses: Als u de inhalator voor de eerste keer heeft getest moet deze 120 aangeven.
6. Controleer de dosisindicator bij de inhalator voor 180 doses: Als u de inhalator voor de eerste keer heeft getest moet deze 180 aangeven.



Hoe moet u uw inhalator gebruiken?

Ga staan of rechtop zitten bij het inademen als dat kan.

Controleer uw dosisteller of dosisindicator voordat u begint met inademen. Kijk hoeveel inhalaties er nog over zijn. Staat het getal 0 op de dosisteller of dosisindicator? Dan zijn er geen inhalaties meer over. Gooi uw inhalator weg en haal een nieuwe inhalator.



1. Verwijder de beschermkap van het mondstuk. Controleer of het mondstuk schoon is. Controleer ook of er geen stof, vuil of andere vreemde voorwerpen in zitten (afbeelding 1).
2. Adem zo langzaam en diep mogelijk uit (afbeelding 2).
3. Houd de inhalator rechtop met het mondstuk aan de onderkant. Doe uw lippen om het mondstuk. Niet op het mondstuk bijten (afbeelding 3).
4. Adem langzaam en diep door uw mond in. Druk net nadat u bent begonnen met inademen stevig op de bovenkant van de inhalator om een dosis af te geven. Heeft u weinig kracht in uw handen? Dan is het misschien makkelijker om de inhalator met beide handen vast te houden. Houd de bovenkant van de inhalator met beide wijsvingers vast. Houd de onderkant met beide duimen vast (afbeelding 4).
5. Houd uw adem zo lang mogelijk in. Haal het mondstuk uit uw mond en adem langzaam uit. Adem niet uit in de inhalator (afbeelding 5).

Moet u nog een inhalatie nemen? Houd de inhalator dan ongeveer een halve minuut rechtop. Herhaal daarna stap 2 tot en met 5.

Belangrijk: Doe de stappen 2 tot en met 5 niet te snel.

Plaats de beschermkap weer terug na gebruik. Controleer de dosisteller voor de verpakking van 120 inhalaties en de dosisindicator voor de verpakking van 180 doseringen.

Spoel uw mond met water, spoel uw keel met water (gorgelen) of poets uw tanden iedere keer nadat u uw inhalator gebruikt. Dit verkleint de kans op een schimmelinfectie in uw mond en keel.

Wanneer moet u uw inhalator vervangen?

Haal een nieuwe inhalator als de dosisteller of dosisindicator op het getal 20 staat. Gebruik de inhalator niet meer als de dosisteller of dosisindicator op 0 staat. Inhalaties die dan nog in de inhalator zitten, kunnen te weinig zijn voor het afgeven van een complete dosis. Begin met het gebruik van een nieuwe inhalator.

Komt er nevel uit de bovenkant van de inhalator of uit uw mondhoeken? Dan komt dit medicijn niet in uw longen zoals de bedoeling is. Neem opnieuw een inhalatie volgens de gebruiksaanwijzing hierboven. Begin vanaf stap 2.

Denkt u dat dit medicijn te goed of niet goed genoeg werkt? Vertel het aan uw arts of apotheker.

Vind u het lastig om tegelijk de inhalator in te drukken en in te ademen? Dan kunt u de AeroChamber Plus voorzetkamer gebruiken. Vraag uw arts, apotheker of een verpleegkundige naar deze voorzetkamer. Het is belangrijk dat u de bijsluiter van de AeroChamber Plus voorzetkamer goed leest. U moet de aanwijzingen over het gebruik en het schoonmaken van de AeroChamber Plus voorzetkamer heel goed volgen.

Schoonmaken

U moet de inhalator 1 keer per week schoonmaken. **Haal het spuitbusje niet uit de plastic houder. Gebruik geen water of andere vloeistoffen.**

De stappen om uw inhalator schoon te maken:

1. Verwijder het beschermkapje door deze van het mondstuk los te trekken.
2. Maak de binnenkant en buitenkant van het mondstuk en de inhalator schoon. Doe dit met een schone, droge doek of tissue.
3. Doe het beschermkapje weer op het mondstuk.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

- Heeft u meer formoterol gebruikt dan u zou moeten? Dan kunt u last krijgen van: misselijk zijn, overgeven, snelle hartslag, hartkloppingen, hartritmestoornissen, een aantal veranderingen in uw hartfilmpje, hoofdpijn, trillen, slaperig zijn, te veel zuur in het bloed, weinig kalium in uw bloed of veel suiker (glucose) in uw bloed. Uw arts wil misschien uw bloed onderzoeken om te kijken hoeveel kalium en glucose erin zit.
- Heeft u te veel beclometasondipropionaat gebruikt? Dan kan dit zorgen voor problemen met uw bijniere voor korte tijd. Dit zal binnen een paar dagen beter worden. Uw arts moet misschien de hoeveelheid cortisol in uw bloed controleren.

Heeft u een van deze klachten? Vertel het uw arts.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem het medicijn in zodra u eraan denkt. Is het bijna tijd voor de volgende dosis? Gebruik dan niet meer de dosis die u vergeten bent. Neem de volgende dosis gewoon op het normale tijdstip. **Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.**

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

U mag ook niet stoppen of de dosis verlagen als u zich beter voelt. Overleg met uw arts als u dit wilt doen. Het is heel belangrijk dat u dit medicijn regelmatig gebruikt. Ook als u geen klachten heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Er is een kans dat u kortademiger wordt en een piepende ademhaling krijgt vlak na het gebruik van dit medicijn. Dit kan ook gebeuren bij andere inhalatiemedicijnen. Dit heet paradoxale bronchospasmen. Gebeurt dit? **Dan moet u meteen stoppen met het gebruik van dit medicijn. Gebruik meteen uw inhalator om uw klachten te verminderen die snel werkt** om het kortademig zijn en de piepende ademhaling te behandelen. U moet meteen contact opnemen met uw arts.

Krijgt u klachten van overgevoeligheid? **Vertel het uw arts meteen.** Dit kunnen klachten zijn zoals huidallergieën, jeukende huid, rood worden van de huid, of zwelling van de huid of slijmvliesen, vooral van de ogen, het gezicht, de lippen en de keel.

Andere mogelijke bijwerkingen staan hieronder. Ze staan op volgorde van het aantal keer dat ze voorkomen.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

- infecties veroorzaakt door een schimmel (van de mond en keel)
- hoofdpijn
- heesheid
- zere keel.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

- hartkloppingen, niet normaal snelle hartslag en hartritmestoornissen
- sommige veranderingen in uw hartfilmpje
- stijging van de bloeddruk
- klachten die lijken op griep
- ontsteking van de neusbijholten
- verstopte neus of loopneus (rhinitis)
- ontsteking van uw oren
- irritatie in uw keel
- hoesten en slijm ophoesten
- astma-aanval
- infecties van de vagina veroorzaakt door een schimmel
- misselijk zijn
- niet normaal of slecht smaken proeven
- brandend gevoel van de lippen
- droge mond
- problemen met slikken
- problemen met uw spijsvertering
- maagklachten

- diarree
- spierpijn en spierkrampen
- rode kleur van uw gezicht en keel
- er stroomt meer bloed naar sommige weefsels in het lichaam
- heel veel zweten
- trillen
- rusteloos zijn
- duizelig zijn
- uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos of galbulten)
- veranderingen van sommige onderdelen van uw bloed:
 - minder witte bloedcellen
 - meer bloedplaatjes
 - minder kalium in uw bloed
 - meer suiker (glucose) in uw bloed
 - meer insuline, vrije vetzuren en ketonen in uw bloed.

De volgende bijwerkingen zijn soms gemeld bij patiënten met COPD (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

- longontsteking. Krijgt u last van een van de volgende klachten tijdens gebruik van dit medicijn? Vertel het uw arts: meer aanmaak van slijm, verandering van de kleur van het slijm, koorts, vaker hoesten of meer problemen met ademen.
- minder cortisol in uw bloed. Dit komt door het effect van corticosteroïden op uw bijniere.
- onregelmatige hartslag.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

- benauwd zijn
- uw hart slaat een slag over. Dit komt doordat de hartkamers te vroeg samentrekken.
- daling van de bloeddruk
- ontsteking van uw nieren
- zwelling van de huid en slijmvlies die een paar dagen blijft.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

- kortademig zijn
- erger worden van de astma
- minder bloedplaatjes
- zwelling van de handen en voeten.

Het gebruik van hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden voor lange tijd kan in zeer zeldzame gevallen zorgen voor klachten in uw hele lichaam (systemische effecten).

Zoals:

- uw bijniere werken minder goed (bijniersuppressie)
- dunner worden van de botten (lagere botmineraaldichtheid)
- vertraagde groei bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
- verhoogde oogdruk (glaucoom)
- staar.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- problemen met slapen

- depressie of angst
- nerveus zijn
- erg opgewonden of geïrriteerd zijn.

Deze klachten komen vaker voor bij kinderen, maar het is niet bekend hoe vaak.

- wazig zien.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Verpakking met 1 inhalator voor 120 inhalaties of 180 inhalaties

Voor de apotheker:

Bewaren in de koelkast bewaren (2 tot 8°C) voor maximaal 18 maanden.

Vul de datum van uitgifte aan de patiënt in op het stickertje op de verpakking. Plak het stickertje op de inhalator. Zorg ervoor dat er een periode van minimaal 3 maanden is tussen de uitgiftedatum en de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Voor patiënten:

De inhalator bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit medicijn niet langer dan 3 maanden na de datum waarop u de inhalator van uw apotheker heeft gekregen. Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en het etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Verpakkingen met 2 of 3 inhalatoren voor 120 inhalaties

Voor gebruik: in de koelkast bewaren (bij 2 tot 8°C).

Na het eerste gebruik: bewaren beneden 25°C voor maximaal 3 maanden.

Elke keer dat u een inhalator gaat gebruiken, vult u de datum van eerste gebruik in op het stickertje op de verpakking. U plakt dit stickertje op de inhalator die u gebruikt. Gebruik de inhalator niet na 3 maanden vanaf het eerste gebruik en gebruik deze nooit meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het doosje en het etiket achter 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet in de vriezer bewaren.

Is de inhalator in hele erge koude temperaturen bewaard? Warm hem dan een paar minuten voor gebruik in uw handen op. Nooit opwarmen met onnatuurlijke middelen.

Waarschuwing: de inhalator bevat een vloeistof onder druk. Deze mag niet in temperaturen hoger dan 50 °C komen. De inhalator niet doorboren.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn: beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Elke inhalatie uit de inhalator bevat 200 microgram beclometasondipropionaat en 6 microgram formoterolfumaraatdihydraat. Dit is gelijk aan een dosis van 177,7 microgram beclometasondipropionaat en 5,1 microgram formoterolfumaraatdihydraat die uit het mondstuk vrijkomt.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: norfluraan (HFA 134-a), watervrij ethanol, geconcentreerd zoutzuur.

Dit medicijn bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Elke inhalator voor 120 inhalaties bevat 10,35 g HFA-134a. Dit is gelijk aan 0,015 ton CO₂-equivalent (global warming potential GWP = 1.430).

Elke inhalator voor 180 inhalaties bevat 14,24 g HFA-134a. Dit is gelijk aan 0,020 ton CO₂-equivalent (global warming potential GWP = 1.430).

Hoe ziet Beclometason/Formoterol Allgen eruit en wat zit er in een verpakking?

Dit medicijn is een oplossing onder druk. Het zit in een aluminium spuitbus met een doseerklep. Het spuitbusje past in een witte plastic houder met een dosisteller (met 120 doseringen) of een dosisindicator (met 180 doseringen) met een groene plastic beschermkap.

Elke verpakking bevat:

- 1 inhalator (voor 120 inhalaties), of
- 2 inhalatoren (voor elk 120 inhalaties), of
- 3 inhalatoren (voor elk 120 inhalaties), of
- 1 inhalator (voor 180 inhalaties).

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

All-Gen Pharmaceuticals & Generics B.V.

Rouboslaan 32

2252 TR Voorschoten

Nederland

Fabrikant
Genetic S.p.A.
Contrada Canfora
84084 Fisciano
Italië

In het register ingeschreven onder:
RVG 130453

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

België	Beclometasone/Formoterol Genetic 200/6 microgram/dosis aërosol, oplossing
Bulgarije	Беклометазон формотерол Genetic 200 микрограма /6 микрограма/ доза,разтвор под налягане за инхалация
Cyprus	Beclometasone formoterol Genetic 200 microgram/6 microgram per actuation pressurized inhalation solution
Duitsland	Beclometason/Formoterol Genetic 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung
Estland	Beclametasone/Formoterol Genetic
Frankrijk	BÉCLOMÉTASONE/FORMOTÉROL BIOGARAN 200 microgrammes /6 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé
Griekenland	BREAIR
Hongarije	Beclometasone formoterol Genetic 200 mcg /6 mcg túlnyomásos inhalációs oldat
Ierland	Beclometasone/formoterol 200 microgram/60 microgram per actuation pressurised inhalation solution
Italië	Beclometasone e Formoterolo Genetic
Kroatië	Beklometazondipropionat/formoterolfumarat dihidrath Genetic 200 mikrograma /6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina
Lithouwen	Beclometasone/Formoterol Genetic 200 mikrogrami/6 mikrogrami izsmidzinājuma aerosols inhalācijām, zem spiediena, šķīdums
Letland	Beclometasone/Formoterol Genetic 200 mikrogramų /6 mikrogramai spūsnyje suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas
Luxemburg	Beclometasone/Formoterol Genetic 200 microgrammes /6 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé
Malta	Beclometasone formoterol Genetic 200 microgram/6 microgram per actuation pressurized inhalation solution
Nederland	Beclometason/Formoterol Allgen 200/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing
Oostenrijk	Beclometason/Formoterol Genetic 200 mikrogramm /6 mikrogramm/Sprühstoß Druckgasinhalation, Lösung
Polen	AEROX
Portugal	Beclometasona Formoterol Genetic 200 mcg/6 mcg Solução pressurizada para inalação
Roemenië	Beclometazonă /Formoterol Genetic 200 micrograme /6 micrograme pe doză, soluție de inhalat presurizată

Slovenië	Beklometazon/formoterol Genetic 200 mikrogramov /6 mikrogramov na potisk inhalacijska raztopina pod tlakom
Slowakije	Beklometasón-formoterol Genetic 200 mikrogramov /12 mikrogramov/dávka
Spanje	Beclometasona Formoterol Genetic 200 microgramos/6 microgramos/pulsación Solución para inhalación en envase a presión
Tsjechië	Beklometason/Formoterol Genetic

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2025.